


0.5 · KE 1314

RF1344



POR ORDEN DESVCON . 71500 o int water

TASSA.

O Francisco Martinez escriuano de Camara de su Magestad, y vio de los que en su Consejo residen, certifico, y doy se, que por los seños es del dicho Consejo su tassado un libro, intitulado Regimiento de nase-gacion, compuesto por el Licenciado Andres Garcia de Cespedes, Cosmogra-fo mayor de su Magestad, a cinco marauedis el pliego, y que a este precio y no mas mandaron que se venda el dicho libro: y que esta se de tassa se ponga en la primera hoja de cada albro, para que se se precio del, y que no se venda sin estar puesta en el principio de la primera hoja de cada volume como dicho es, so pena que el que lo imprimiere y vendiere sin la poner, caya, e incurra en las penas contenidas en las seyes y prematicas destos Reynos, que sobre la impressió de los dichos libros disponen. Y para que dello conste de pedimiento del dicho Licenciado Andres Garcia de Cespedes, y de mandamiento de los dichos señores del Consejo, di esta se en Valladolid a diez dias del mes de Hebrero de mil y seyscientos y seys años:

Francisco Martinez.

APROVACION.

Por mandado de los señores del Cosejo Real he visto dos libros, el vno intitu lado Regimiento de nauegacion, y el otro Hydrografia, compuestos de Andres de Cespedes Cosmografo mayor de las Indias de su Magestad, que por contener entrambos dotrina muy buena, y platica, que será de singular aprouechamiento para el seruicio destos Reynos, digo que merece, no solo que se le de la licencia que pide pará imprimirlos, mas aun que se le haga merced, y se le de premio de tan virtuoso trabajo. Fecha en Valladolid ocho de Hebrero. 1602:

Catedratico de Matematicas de su Magestad.

ERRATAS.

Polio. 21. linea. 1 vomiento, diga monimiento, fol. 841 buelta coluna. 7. Mar, diga Mai, fol. 81. linea. 14. coluna 19.18. diga 17. fol. 118. linea. 4. 0, diga no.

El Licenciado Murcia de la Llana.

ELREY.

IS Presidente y juezes, oficiales de la casa de la Contratacion de Seuilla, la carta q me escreuistes en treinta de Diziembre del año passado se recibio en mi Cosejo Real de las Indias, y auiendose juntamente visto la relacion que con ella embiastes, de lo que auiades resuelto, despues de auer hecho las diligencias que os embie a mandar, cerca de la enmienda de los padrones, y instrumentos de la nauegacion, se me consulto por los del dicho mi Consejo, y porque me a parecido que conuiene, se ponga en execucion lo acordado, conforme a la dicha relació. e ordenado a Andres Garcia de Cespedes miCosmografo mayor de las Indias, vaya a ello, y lleue consigo a Luys Iorge de la Barbu da Cosmografo, para que ayude en lo que ordenare, y le he mandado dar copia de la dicha relacion, y juntamente instrucion, para que mejor y con mas claridad pueda proceder en lo que es de su profession, os en cargo, que para el cumplimimiento de todo lo que lleua a cargo, le deis fauor, calor, y assistencia necessaria, or denandole, que vn dia dè cada semana os de cuenta de lo q se fue rehaziendo, para que quando conuiniere, o se ofreciere alguna duda sobre que se aya de platicar, hagais juta de las personas mas inteligentes que huuiere en aquella facultad, y en vuestra presen cia se confiera y determine, y proucereis, que el que sirue el oficio de Piloto mayor, y el Cosmografo de essa casa, acuda al dicho An dres Garcia de Cespedes, siempre que los llamare para qualquier cosa tocante a la dicha enmienda, y que lo mesmo hagan los de la vniuersidad de Maestres y Pilotos de la carrera de las Indias, y a la continua me yreis auisando de lo que fueredes haziendo. Fecha en Toledo a treze de Iunio de mil y quinientos y nouenta y seis

YOELREY.

Por mandado del Rey nuestro Señor.

18 lolonistamon cuib . on loan de Tharra.

ELREY.

IS Presidente y juezes, oficiales de la casa de la Contratación de Seuilla, ya sabeis, que auiendose entendido que auia algunos errores en las carras de marear de la carrera de las Indias, y en los demas instrumentos, y vsos de la nauegación: vltimamente fue a essa ciudad el Licenciado Andres Garcia de Cespedes, Cosmographo Mayor de las Indias a tratar de la enmienda dellos con vuestra assistencia, y la de algunos Cosmographos, Pilotos, y personas platicas, conforme a la orden que se le dio: y despues de auer assistido a ello algunos dias, ha traydo hecha vna carta de marear nueua, reformada en muchas colas, y tambien algunos instrumentos, y auiendose visto por orden del mi Consejo Real de las Indias lo vno, y lo otro en mi Corte por personas, doctas, y de experiencia, ha parecido que pues en el padron de la dicha carta estan enmendados los que se han hecho hasta agora, y mejor declarado todo por la diligencia que se ha puesto en aueriguarlo, se deue mandar que las cartas se hagan de aqui adelante conforme al dicho padron, y que se imprima, y vse del regimiento que para el vío, y gouierno de la carta ha hecho el dicho Andres Garcia de Cespedes, reduziendo lo necessario para los Pilotos aparte, y que se impr ma de porfi, y que lo demas tambien se imprima, para que con mas facilidad saquen los Pilotos prouecho dello, obligandoles a lleuar el dicho regimiento pratico, y que es bien que lleuen el Aguja con los hierros mouibles, aunque lleuen otra con hierros fixos: y que assimesmo se deue mandar vsar del instrumento. para tomar la variacion del Aguja, por ser bueno, y de la ballestilla que ha hecho el dicho Cosmographo Mayor por estar bien fabricada, y el instrumento de las guardas del Norte, y del Sur, que son vtiles para con la ballestilla, y que el vsar de los demas instrumentos que ha hecho el dicho Andres Garcia de Cespedes se dexea la elecion de quien quisiere vsar dellos. Y porque conuiene, y es mi vo luntad que se vse en la manera que dicha es de los dichos instrumentos de la nauegacion, y que se ponga en execucion, os mandamos que deis orden en que assi se haga, y que en el examen de los Pilotos, y en todo lo demas que conuiniere en la nauegacion de la carrera de las Indias se preuenga esto. Y por la presente doy licencia para que se puedan imprimir los dichos regimientos, ycarta general que ha hecho, y reformado el dicho Andres Garcia de Cespedes. Fecha en Vallado. lid, a tres dias del mes de Mayo, de mil y quinientos, y nouenta y nueue años.

YOEL REY.

Por mandado del Rey nuestro señor.

Ioan de Ybarra.

ELREY.

OR Quanto por parte de vos el Liceciado Andres Garcia de Cespedes, nuelcro Cosmografo mayor, nos fue fecha relacion, que eniades escrito en lengua Castellana los libros de Matematica figuientes. Vn regimiento de nauegacion que os auiamos mandado hazer, vna Hydrografia general, donde se demostraua, como los Portugueses auian peruertido los Mapas, por poner dentro de su demarcacion las islas de la especeria: vn Islario general, dode se trataua la historia de todas las islas del mundo q hasta agora se sabian, y se ponia la figura y sitio dellas: vnas Teoricas de Plane tas, donde se declaraua la dotrina de Copernico, y de Ptolomeo, y se ponian muchas observaciones que en este tiempo teniades sechas, por las quales se aueriguavan muchos errores que se hallauan, assi en la vna dorrina como en la otra: vn libro donde se ponia la Teorica, pratica, y vío del Astrolabio, y otras muchas cosas curiosas de Geometria, pra tica, y especulativa vtil y necessaria para pintores, escultores, architectos, e ingenieros; va libro de Mecaninas, con Teorica, practica para ingenieros, y todo genero de gente: y atento que los dichos libros eran vtiles, y de mucho beneficio para la republica, nos pedistes y suplicastes os mandassemos dar licecia para los imprimir,o como la nuestra mer cedfuesse, lo qual visto por los del nuestro Consejo, y como por nuestro mandado se hizieron las diligencias que manda la prematica por nos vltimamente fecha, sobre la impression de los libros fue acordado, q deuiamos madar dar esta nuestra cana para vos en la dicharazon, y nos tunimoslo por bien, por la qunl vos damos licencia y facultad, para que por tiempo y espacio de diez años cumplidos primeros figuientes, que corran y se quenté delde el dia de la fecha delta nuestra carta en adelate, vos o la persona q para ello vuestro poder ouiere, y no otra alguna, podais imprimir y vender los dichos libros q de suso se haze meció, y por la presente damos licecia y facultad a qualquier impressor destos nuestros Reynos q vos nobraredes, para q durante el dicho tiepo los pueda imprimie por los originales q en el nuestro Consejo se vieron, q van rubricados cada plana, y firma do al fin dellos de Fracisco Martinez nuestro escriuano de Camara, y vno de los q en el nueltro Colejo relidé, con q antes q le vendá los trayga ante ellos, juntaméte con los di-chos originales, para q le vea li la dicha impressio ella coforme a ellos, y traygais fee en publica forma, como por corrector por nos nobrado le vio y corrigio la dicha impressio có el original: ymadamos al impressor q assi imprimiere los dichos libros, no imprima el principio y primer pliego dellos, ni entregue mas de vno folo de cada vno de los dichos libros por el original al autor, o persona a cuya costa se imprimiere, para el efeto de la di cha correció y tasta, hasta q antes y primero esten corregidos, y tastados por del nuestro Colejo, y estado fecho, y no de otra manera pueda imprimir el diche principio y primer pliego, en el qual leguidamete se poga esta nuestra licécia y privilegio, y la aprovació, tas sa y erratas y no los podais veder ni vedais, vos ni otra persona alguna, hasta q esten los dichos libros en la forma fuso dicha, sopena de caer e incurrir en las penas cotenidas en la dicha prematica, y leyes deltos Reynos, q fobre ello dispone, y madamos q durante el di cho tiepo persona alguna sin vuestra licecia no los pueda imprimit, ni veder, sopena q el q̃ los imprimiere y vediere, ay, ã perdido y pierda qualefquier libros, moldes y aparejos q dellos tuniere, y mas incurra en pena de cincueta mil maranedis por cada vez q̃ lo còtrario hiziere, de la qual dicha pena sea la tercera parte para la nuestra Camara, y la otra tercera parte para el juez qlo fenteciare, y la otra para el qlo denuciare, y mandamos a los del nuestro Cósejo, Presidere, Oydores delas nuestras audiécias, Alcaldes, alguaziles de la nuestra casa y Corte, y Chacillerias, y a otras qualesquier justicias de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y señorios, acada uno en su juridició, assi a los q agora son, como a los q será de aqui adelate, q os guarde y cuplan esta nuestra cedu la y merced q assi os hazemos, y cótra ella no vos vayan, ni pasten ni cofientan yr ni pas far en manera alguna, sopena de la nuestra merced, y de diez mil marauedis para la nuestra Camara, Dada en S. Iuan de Ortega a diez y seys dias del mes de Iunio de mil y seisa cientos y tres años.

Y O E L REY.

Por mandado del Rey nuestro señor.

Inan de Amezqueta.

Señor.



RES Instrumetos principales tiene necessidadel Piloto para hazer sunauegacion, que son, carta, aguja, astrolabio: la carta le ensena la disposicion que tienen entre si los puertos, islas, baxos, bancos, y otros inconuenientes que se ofrecen en la nauegacion, y los caminos que ay de vnas

partes à otras. La aguja les enseña como han de guardar los tales caminos que esta descriptos en la carta. El astrolabio les sirue para conocer la altura de polo, que es lo mismo que lo que estan apartados de la equinocial: lo qual sabido, se sabe en que parte del camino que lleua, esta su naujo, como no se nauegue de leste o este, que entonces lo juzga la fantasia. Con estos tres instrumentos suelen lleuar otro que llaman ballestilla, con el qual toman la altura del polo siendo de noche. Todos estos inf trumentos en los regimientos de nauegacion que hasta aora se han v (ado, estan defetuo sos: porque la carta de nauegación tuuo necessidad de emienda, assien longitud, como en que faltauan deponer algunos baxos, y en la figura de las costas, como severa en nuestra hidrografia: la aguja se enmedo en poner los hierros mouibles, y se hiziero algunos instrumetos, para se saber la variacion que tiene, que llaman Nordestear, o Noroef tear, y es de tanta importancia saber esta variación, que por ignoralla, se pierden cada dia muchos nauios. Et astrolabio tu uo necessidad de emienda, assi en la fabrica, como en hazer nueuas tablas de declinacion, porque mediante la declinacion del Sol, y su altura meridiana, se sabe la altura del polo. La ba llestilla (e emendo, haziendola algo mayor de lo q comunmen te se tenia, y poniendo nueuo modo de gradualla para que fues se mas cierta: porque mediante la altura que con la ballestilla setoma de la estrella polar, estando la guarda delatera en alguno de los 8. rumbos principales, se sabe la altura dei polo, sue necessario hazer nueua tabla de lo que la estrella polar estaua mas alta, o mas baxa que el polo, estando la guarda delantera

tera en alguno de los celo rumbos principales, porque la que hasta aqui se tiene, alguna vez tenia de error medio grado. Todos estos instrumentos se enmendaron, como por la cedula Real de V.M. se me mando, en la instrució que se me dio. Demas desto hize otros instrumentos, que me parecio serian de prouecho para la buena nauegacion, como en el discurso deste libro se puede ver: aunque para regimiento de nauegacion parece que contiene algunas cosas superfluas, no lo son, porq los Pilotos no tienen para que embaraçarse en las observaciones, ni demostraciones, que estas folo se pusieron para los Matema ticos, porque se entienda, que todo esta hecho con fundamento, sino solo en la pratica de lo que a ellos les toca, y esta se les tiene de enseñar quando oyen la Catedra. Demas de los iustrumentos se hizo una cosa bien importante en la carta, que es hazer troncos de leguas, para diferentes alturas de polo: como se tiene de vsar destos troncos. se dize en su lugar, y la razon porque se hizieron, y en cumplimieto de lo que U.M. memãdò, y su Consejo Real de las Indias puse la diligencia, queen cosa tan importante se requeria guarde Dios a U.M.muchos años.

Al Lector.

S cosamuy ordinaria, quado algú autor saca a luz algu libro, en qualquiera facultad q sea, ante todas cosas preuenirse cotra los detractores (q por bien que escriua no hã de faltar) dedicadole algu Principe, a cuya autoridad se tenga algu respeto, y demas desto hazen vna prefacion, dado cuenta de lo q contiene el libro, y el trabajo, y estudio que tuuo en escreuirle, y las vtilidades q tiene la lecció del , y pidiendo con humildad corrijan y enmienden las faltas que en el se hallaré. Desta preuencion tengo mas necessidad q nadie, lo vno por auerme mandado su Magestad, el Rey nuestro Señor, hazer este libro, lo otro, por ser el sujeto de lo q en el se trata tan dificultoso, q por vigilante que sea vn hobre, no puede dexar de caer en algun descuydo. El trabajo que a sido necessario tomar, para aueriguar lo que conuenia, para q esta obra se hiziesse con perfeció, no lo puede saber, sino es quie a passado por ello, q aunq aqui no se pone, sino algunas observaciones, fueron muchas las q se hiziero, y por muchos años, y confiriédo vnas có otras, fe eligiero las q aqui estan puestas, por auerlas hallado, ser mas precisas, y q conformauan con las q en este tiempo han hecho otros diligétes observadores, en diferétes partes de España. No pongo aqui, por no acrecentar maseste libro, lo q toca a la fabrica de la carta de nauegar, en nuestra Hydrografia se trata della, y de otras cosas tocantes a la nauegación, q para el qfuere curiolo de laber la razó de la descripció de la carta de nauegar, lo hallarà alli tratado, que hasta aora nadie lo tiene escrito. Bien se q ha de auer muchos, que han de dezir, que para hazer estas reglas, que no era necessario hazer tantas observaciones, ni tanta precisió, porque en mas que esso se verran los Pilotos. A esto se les responde, que el que haze las reglas, tiene obligacion de darfelas ciertas y justas, que si los Pilotos se erraren en tomar sus alturas, esto no lo puede remediar el que les da las reglas, 4 y peor

Al Lector.

y peor feria lleuar las reglas falfas, que era añadir errora error, y de no hazer caudal destas colas, se suelen perder algunos naujos. Otros suelen dezir, que las naos Dios las lleua, y Dios las trae, queriendo dar a entender, o que los Pilotos son ignorantes, o que no importa que lleuen buenos o malos instrumentos. Tambien vemos cada dia, que vn ciego anda por todas las calles de vna ciudad, y acierta con las puertas, donde a de rezar sus oraciones, pero algu na vez le mete en vn barranco, y otras topa con las ancas de vn cauallo, y esto con lleuar la sonda en la mano. Pues lo mismo acontece al nauio, que lleua el Piloto ignorate, o que lleua malos instrumentos, que puede ser, que vna y dos vezes venga en saluamento, y otra vez se encalle, o q dè contra vna roca, que se haze pedaços. Por tanto se deuria poner mucho cuydado, en que el Piloto sea muy diligente, y lleuar muy buenos instrumetos, y no se contentar con las cosas a poco mas o menos, porque en este negocio no va menosque las vidas, y mucha hazienda.

Muchos y muy varios instrumentos son, con los que se hazen observaciones, assi del Sol, como de la Luna, pero con solostres es bastante cosa, para hazer todas las observaciones que se pueden ofrecer, con vn quadrante de la fabrica que adelante diremos, vn radio que tega diez palmos de largo, y que en la observacion se disponga, y vse del, como diremos en nuestras Teoricas, y vnas armilas, que para observar las estrellas sixas son muy a proposito, aunque sin ellas se pueden observar, pero es con algun ro deo, los demas instrumentos son mas por curios dad que por necessidad. Para observar cometas puedese añadir al quadrante vn orizonte, como enseñaremos en nuestras

Teoricas.



SIGVESE VNA BREVE INTRODVCCION DE LA ESFERA.

PORQVE EN EL ARTE DE NAVEGAR fe tratan muchas cosas, que sin tener noticia de la Esfera no se pueden bien entender, me parecio poner una breue introducion della, la qual qualquiera Marinero tiene obligacion de saber para mejor hazer su oficio.


Difinicion de la Esfera.

A ESFER A Es vn cuerpo redondo, contenido debaxo de vna superficie; en medio del qual està vn punto, y si deste a la superficie se tiraren lineas rectas, todas sentro de la Esfera. Vna linea recta que passa por el cétro y se aplica de vna y otra parte a la superficie, acerca de la qual linea se rebuelue toda la Esfera, se dize exe de la Esfera. Los dos puntos que terminan el exe, se dizen Polos de la Esfera.

Diuision de la Esfera.

L A Esfera se diuide en dos maneras, segun sustancia, y segun accidente. Segun sustancia, en diezes seras, ò A orbes,

orbes, que contando de aqui para el cielo estrellado, el primero es de la Luna, el segundo es de Mercurio, el tercero es de Venus, el quarto del Sol, el quinto de Marte, el sexto de Iupiter, el septimo de Saturno, el octauo el cielo estrellado que llaman Firmamento, el noueno el cielo cristalino: el decimo, que contiene dentro de si todos los demas, se llama el primer mobil: y esta es la disposicion de los os bes celes ses, segun la comun opinion, que es como se sigue en la figura figuiente.



En el concauo de la Luna estan los quatro elementos, que el primero junto al concauo de la Luna es el fuego, como mas liuiano: y luego se sigue el ayre: y despues el agua: y la tierra como mas graue està en el cetro, haziendo agua y tierra vn globo redondo. Segun accidente, se diuide la Esfera en recta y obliqua. Estera recta se dize, quando ninguno de los Polos se leuanta sobre sobre el Orizonte. Essera obliqua es, quando alguno de los polos se leuanta sobre el Orizonte. Quando se trata-

re del Orizonte, se entendera esto mejor.

Los orbes celestes tienen dos mouimientos, excepto el primero mobil; el vno es accidental, y el otro es propio: el accidental, es causado del primero mobil, el qual en espacio de. 24. horas se mueue de Oriente para Occidente, passando por el Mediodia, y buelue para Oriente, lleuando configo todos los demas Orbes que contiene dentro de si: los qualestienen su mouimié to propio, de Occidente para Oriente, contrario al del primero mobil, pero vnos se mueuen mas tarde que otros. Lanona Esfera se mueue segun Ptolomeo, en 100.años vn grado, por cuya virtud, la octaua Esfera fe mueue otro tanto. El mouimiento propio de la octaua Esfera, es el de trepidacion, que se haze, de Septentrion para Mediodia, y al contrario. Deste mouimieto se tratarà en las Teoricas. Saturno, en 30. años da vna buelta por todo el Zodiaco. Iupiter en,12. años. Marte en. 2. El Solen.365.dias.5.horas.49.minutos de hora. Venus y Mercurio, segun su medio mouimiento, son como el Sol. De las diferencias que estos Planetas tienen en sus mouimientos, se tratarà mas particularmente en nuestras Theoricas, que para esta introducion esto basta, que es lo que comunmente se trata.

No quiero detenerme, en prouar como el cielo es redondo, y sus mouimientos circulares, y que la tierra y agua hazen vn globo, y que està en el medio de toda esta machina del mundo, y que la tierra es como punto respeto de la grandeza del cielo, y que las observaciones que se haze en la superficie della, son como si se hiziessen en el centro: lo vno, porque no es deste lugar; y lo otro, porque en otros muchos lugares està largamente disputada a sessi se appendiente de superiori de s

tado, y assi se quedarà esto como cosa aueriguada.

 $A \sim CAP$.

Regimiento de CAPITVLO PRIMERO, QVE TRATA de los circulos de la Esfera.


o S Circulos de que se compone la Essera material, por la qual se ha de imaginar la celeste, son. 10. los quales se han de considerar en la superficie conuexa del prime ro mobil, y assi el sugeto de la Essera es el primero mobil, como el sugeto de las Theoricas son los demas orbes. Entre estos circulos, vnos ay mayores, y otros menores: circulo mayor se dize, que descrito en la superficie de la Essera, la diuide en dos partes yguales; y esta diuisson necessariamente ha de passar por el centro. Circulo menor se dize, que descrito en la superficie de la Essera, la diuide en dos partes des yguales. Pues de cada vno destos circulos se dirà breuemente en particular.

De la Equinocial.

A Equinocial, es circulo mayor en la Esfera, y la diuide en dos partes yguales: dista ygualmente de cada vna de sus partes, del vno y otro Polo del mundo. Dizese Equinocial, porque quando el Sol llega aeste circulo, que es dos vezes en el año, es Equinocio en todalatierra, que son yguales los diasa las noches, q en estetiempo acontece en.21 de Março, y en.23. de Setiembre Pues descriuamos la Esfera en la figura siguiéte, para que sirua de exemplo, en la qual se imagine, que el circulo, ab c d, es el cuerpo redondo : y el centro el punto, e: y el exe de la Esfera, a e c: y los puntos, a, c, los Polos del mundo: pues poniendo el circulo, be d, y gualméte apartado de los Polos,a c, este serà la Equinocial: y assi los arcos, b a, a c, cada vno es quadrante de circulo: y lo mesmo los arcos, b c, c d. Del

Del Zodiaco.

L Zodiaco, es circulo mayor en la Esfera, y se cortacó la Equinocial en dos partes y guales, quedando la vna mitad a la parte del Polo Septentrional: y la otra mitad al Polo Meridional, como representa la linea, K e g, q imaginando que escirculo, la mitad,



e g, se inclina al Polo, a, que aqui pongamos que es el polo Septentrional: y la otra mitad, e h, se inclina al polo, c, q es el Meridional. Este Zodiaco se diuide en. 12. partes yguales, que cada vna llaman Signo, tiene nombre de algun animal: despues cada Signo se diuide en. 30. partes, q llaman grados, y cada grado se parte en. 60 minutos, cada minuto en. 60. segudos, y assi se va proce die do, por esta sexagenaria diuision, hasta que quieren.

Los nobres de los signos son, Aries, Tauro, Gemini, Cacer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricor nio, Aquario, Pisces. Comiéçase a cotar desde Aries, q es d'la seció, o corte q haze la Equinocial co el Zodiaco. Se malase los signos co estos caracteres, VAries, VTauro, TGemini, Cancer, o Leo, Virgo, Libra, MEscorpio, X Sagitario, Capricornio, Aquario, X Pisces. Suese dar a este Zodiaco, doze grados de anchura: y la linea que va por medio, dexando seys grados de vna parte, y seys de otra, se llama linea Ecliptica, porque no se puede hazer eclypse de Sol, ni Luna, sino estando el Sot y la luna en esta linea, o bié cerca. El Sol jamas se aparta desta linea: la luna dos vezes està en ella en cada lunacion.

Regimiento de Delos Coluros.

Y Otros dos circulos mayores en la Esfera, que llama Coluros, cuyo oficio esdistinguir los Solsticios y Equinocios. El Coluro q distingue los Solsticios, passa por los polos del mundo, y del Zodiaco: y las maximas declinaciones del Sol, que es por el principio de Cancer, y Capricorno, como en la figura passada:el circulo,a b c d, passa por los polos del mundo, a,c, y por los puntos, g,h, que son las maximas declinaciones del Sol, porque entonces està el Sol lo mas apartado de la Equinocial, que en el tiempo de aora son. 23. grad. 28. minutos, segun nuestras observaciones. Dizese el princi pio de Cancer, punto del Solsticio estiual: y el principio de Capricorno, punto del Solsticio yemal. El Coluro de los Equinocios, passa por los polos del mundo, y por los primeros grados de Aries, y Libra. Estos dos Coluros se cortan en angulos rectos en los polos del mundo, que en la figura passada se puede dezir, q la linea recta, a e c, es el Coluro de los Equinocios. La como sel afin esqueb

Del Meridiano.

L Meridiano es vn circulo mayor, que passa por los polos del mundo, y por el Zenit de qualquiera hombre. El Zenit es vn punto en el cielo, que cae perpendicular sobre la cabeça de qualquiera hombre: y assi se puede dezir, que ay tantos Zenides como hombres: pero porque en toda vna ciudad no es sensible lo que puede auer de vn Zenit a otro, no se dira que ay mas de vn Zenit en vna ciudad, pues quando el Sol llegare a este circulo, que passa por los polos del mundo, y por el Zeniz, es medio dia.

Del

Del Orizonte.

L Orizote es circulo mayor, y diuidiedo la Esfera en dos partes yguales; la vna mitad queda descubierta a qualquiera hombre, y assi donde tiene los pies, se puede dezir centro del Orizonte, y el Zenit el polo de aquel Orizote. Este Orizote es en dos maneras, recto, y obliquo. Orizonte recto se dize el quiene los quiuen debaxo de la Equinocial, y entonces el Orizonte passa por los polos del mudo, como en la figura passa da: teniendo el Zenit en el punto, d, el Orizonte serà, a c, y estos tienen Esfera recta. Orizote obliquo se dize, quado el vno de los polos se leuata sobre el Orizonte, q es a todos los quabitare fuera de la Equinocial: como si vno tuviesse el Zenit en el punto, r, su Orizonte serà, p q, y el polo, a se leuata sobre el Orizonte el arco, a p, que es tanto como lo que dista su Zenit, r, de la Equinocial.

De los Tropicos.

Os Tropicos son circulos menores, los quales se imaginan desta manera, q estando el Solen el puto del Solsticio estiual, q es en el punto, g, y arrebatadole el primero mobil, en espacio de. 24. horas le haze dar vna buelta, en la qual el centro del Sol dexá descrita vna circunferecia al rededor de la Essera, que es paralela ala Equinocial como la linea, g f, y a esta llaman Tropico de Cancer, o Estiual. De la mesma manera, estado el Sol en principio de Capricorno, en el punto, h, descriue la linea, h K, y se dize Tropico de Capricorno.

Del circulo Artico, y Antartico.

Omo el Zodiaco se aparta de la Equinocial, tambié sus Polos se apartan de los Polos de la Equinocial, A 4 porque

porque qualquiera Polo se aparta de su circulo por vn quadrante: de manera que siendo, dg, 23. grados. 28. minutos, el Polo del Zodiaco ha de estar apartado del Polo, a, otro tanto, que serà el arco, a l, y el Polo opuesto serà el punto, o, tan distante del Polo, e, como, l, de, a. Pues mouiendose la Essera circularmente sobre los Polos, a, c, estos puntos, l, o, se imagina que dexaràn descritas vnas circunferencias al rededor de los Polos del mundo, como muestran las lineas, l m, no. La linea, l m, se dize circulo Artico, porque està descrito cerca del Polo Artico: y la linea, no, se dize circulo Antartico, porque està descrito cerca del Polo Antartico. Otros tatos circulos como auemos imaginado en la superficie connexa del primero mobil, se tienen de imaginar en la superficie de la tierra.

De las cinco Zonas.

Zonas, o cintasen el cielo, y en la tierra les corresponden otras tantas. La Zona qestà entre los dos Tropicos, llamaron los antiguos, Torrida, o Tostada, y pensaron que era inhabitable, por el gran calor que cósideraron que alli haze, por la continuacion del Sol sobre ella. Las dos Zonas colateralesa esta, que estan entre los Tropicos, y circulo Aartico, y Antartico, son templa das, porque el Sol, ni se les allega, ni aparta mucho. Las otras dos Zonas, que estan comprehendidas de los circulos Artico, y Antartico, al rededor de los Polos, son frias, porque el Solanda siempre lexos dellas.

De las Ascensiones de los signos.

A Ntes que se trate de las ascensiones de los signos, es necessario enteder, que cosa es ascension. Para esto se ha

5

fe ha de imaginar, que como toda la Esfera fe rebuelue sobre el exe del mundo, de Oriente para Poniente, que por el Orizonte arriba van subiendo los circulos de la Esfera de que se ha hablado, y passan por el Meridiano, y descienden por el Poniente Pues este subir que hazen por el Orizonte, y passar por el Meridiano, se llama Ascension, o Subida: y Descension, ponerse por el Orizonte. Las Ascensiones de que aqui se trata, es de la que haze la Equinocial, y el Zodiaco: la Ascensió de la Equinocial siempre es vniforme, que en tiempos yguales suben arcos yguales : pero la del Zodiaco es desygual, porque en tiempos y guales suben arcos desyguales. Pues el intento destas Ascensiones, es saber en qualquiera tiempo, y en qualquiera orizonte, que parte de Zodiaco asciende por el Orizonte, o Meridiano: y la medida desto ha deser la Equinocial, por ser su Alcension regular. Por lo qual diremos, que Ascensioneno es otra cosa, sino saber con vn cierto arco de Zociaco, que tanto arco de Equinocialasciende juntamente con el, por el Orizonte, o Meridiano. 10 Novida la

Estas Ascensiones son en dos maneras, o en Estera recta, o en obliqua: las que se hazen en Estera recta, se dizen Ascensiones rectas: las que se hazen en Estera obliqua, se dizen Ascensiones obliquas.

Demas desto, assi en las Ascensiones que se hazen en Essera recta, como en las que se hazen en Essera obli qua, ay Ascensiones rectas, y obliquas. Dizese que vos signo asciende rectamente, quando juntamente con el asciende mayor parte de Equinocial que de Zodiaco. Y dizese que vo signo asciende obliquamente, quando asciende mayor parte de Zodiaco que de Equinocial. Para mayor claridad, sea en la figura siguiente, ab c d, el Meridiano, el centro del mundo, e, y los Polos, a, c, la Equinocial, b m d, el Zodiaco,

f, n, g, principio de Aries, n, fea el Orizonte de alguna region, h l m K, el qual corta a la Equinocial en, m, y al Zodiaco en, l, y diremos, que el arco de Zodiaco, n l, asciende con el arco de Equinocial, n m, y assi la ascension del arco, n l, es el arco de Equinocial, n m, que si el circulo, h l m K, suera Meridiano, el arco en, n m, se dixera ascension recta, del arco, n l, pero siendo el circulo, h l m K. Orizonte obliquo, se dira el arco de Equinocial, n m, ascension obliqua del arco de Zodiaco, n l.

Demas desto, si el arco de Equinocial, n m, fuere mayor que el arco de Zodiaco, n l, se dira, que el arco de Zodiaco, n l, asciéde rectamente: pero si el arco, n m, suere menor q el arco de Zodiaco, n l, se dira que el sarco de Zodiaco, n l, asciéde obliquamente, aorasea el circulo, h l m K, Orizó.

te obliquo, aora sea Merⁱdiano, que es lo mismo que Orizonte: pues si se diere el arco de Equinocial, n m, se sabra quanto es el arco de Zodiaco, n l, q asciende junto con el. Y al contrario, si se diere el arco de Zodiaco, n l, se sabra quanto es el arco de Equinocial, n m. En otra parte enseñaremos, como se hazen lastablas de ascensiones.

De los dias naturales.

Ia natutal, es vna reuolucion de la Equinocial, con tanta parte de la misma Equinocial, quanta respode al mouimiento que el Solhizo en el Zodiaco, en el tiempo que tardò en boluer al punto del Meridiano donde partio. De suerte, que podemos dezir, que el dia dia natural tiene. 24. horas y vna decimaquinta parte de hora, alguna minima cosa mas y menos, porque no son yguales. En nuestras Teoricas se dira destos dias mas largo.

De los dias artificiales.

la artificial, es todo el tiempo que el Sol està encima del Orizonte. Y noche artificial, todo el tiempo que el Sol està debaxo: de donde se sigue, que el dia y noche artificial hazen vn dia natural. Estos dias y noches artificiales, se varian segun las eleuaciones de Polo: debaxo de la Equinocial son siempre de doze horas: apartandose de alli, vnos mesmos dias vá siendo mayores a los que viuen a la parte donde el Sol tiene su declinacion. Esto se entendera mejor en la figura siguiente;

en la qual el Meridiano,
a b c d, los polos del mundo,a c.la Equinocial, b d,
fean los tropicos, f g, h K;
las otras lineas intermedias los paralelos q el Sol
haze, tirefe el Orizonte,
l m, y cortara al Tropico,
f g, en, n, y al Tropico, h K,
en, o. Quado el Sol deferiue el Tropico, f g, la parte,

n g, es el dia artificial: y la parte, n f, es la noche. Y quando el Sol descriue el Tropico, h K la parte, h o, es la noche: y la parte, K o, es el dia: pues euidente cosa es, que quando el Sol està en el Tropico, f g, que mayor es el dia que la noche: y quando està en el Tropico, h K, que es mayor la noche que el dia. Quando el Sol està en la Equinocial, b d, es y gual la parte, b e, que es la noche, a la parte, d e, que es el dia. Pues desde que el Sol passa de

la

la Equinocial al Polo que se descubre, van creciendo los dias, y menguando las noches: y al contrario, quando el Sol passa de la Equinocial a la parte del Polo que està debaxo del Orizonte, hasta que llega al Tropico, van creciendo las noches, y menguando los dias, como se vee claro en la figura.

Tambien si pusieremos el Orizonte, p q, en menos altura de polo, vnos mesmos dias seran menores en este Orizonte q no en el Orizonte, l m, andando el Sol a la parte del Polo, a. Y al contrario, quando el anduuiere a la parte del polo, c, lo qual se vee claro en el corte que

hazen los Orizontes en los paralelos del Sol.

El Orizonte, Im, corta al paralelo, f g, en, n: y el orizonte, p q, corta al mismo paralelo en, r: pues claro està que es mayor, g n, que, gr, por lo qual serà mayor el mismo dia en el orizonte, l m, que en el orizonte, p q, y esto mismo es en todos los paralelos que ay del Tropico hasta la Equinocial, donde son yguales los dias a las noches, en qualquiera eleuacion de polo. Pero en passando el Sol de la Equinocial, en menor eleuacion de polo son mayores los dias, como lo muestra el orizonte, p q, que corta al paralelo, h K, en, s, y elorizonte, l m, corta al mismo paralelo en, o. Pues es cosa clara, que es mayor, K s, que, K o, por lo qual será mayor el mesmo dia en el orizonte, p q, que en el orizonte, l m: y esto mesmo serà en todos los paralelos que ay del Tropico, h K, hasta la Equinocial.

De los Paralelos en la carta de nauegar.

Odas las lineas que van de Leste deste en la carta de nauegar, se dizen por otro nombre Paralelos, que es lo mesmo q lineas equidistantes a la Equinocial, porq por qualquiera parte dellas está ygualmete aparta-

Nauegacion. I

apartadas della: y quando se dize que nauegan de Lesté, Oeste, es lo mesmo que dezir, que nauegan por Paralelo. Las lineas que en la carta de nauegar van de Norte Sur, son Meridianos: los Marineros las llaman, la linea derecha, bien impropiamente, como hazen otras muchas cosas.

De los Paralelos en Cosmografia.

Laman Paralelos en Cosmografia, las lineas equi-distantes a la Equinocial, pero han de estar des-critas con tal orden, que de la vna a la otra, el mayor dia del año de cada vna dellas, se exceda por media hora de tiempo: como fi en vn Paralelo el mavor dia del año fuesse de. 13. horas, en donde el mesmo dia fuesse de. 13. horas y media, seria otro Paralelo: y assi suelen poner, de la Equinocial al circulo Artico. 24. Paralelos, porque en la Equinocial, es el dia de doze horas: y en el circulo Artico, el mayor dia es de. 24. horas, que excede al dia de la Equinocial en. 24. medias horas, y por esto ponen, de la Equinocial al circulo

Artico. 24. Paralelos. Otros tantos ay del Equinocial al circulo Antartico.

CAP. II. En que se demuestra, que siguiendo los Pilotos las reglas ds los regimientos que en este tiempo vsan, no toman la verdadera altura del Polo.

TAR I

O Primero, tratemos de la altura del Polo que se toma por el Sol. Tienen los Pilotos en sus regimietos vnas tablas que les enseñan la declinacion que tiene el Sol cada dia, mediante la qual, y la altura del Sol sobre el Orizonte al Mediodia, saben la altura del Polo. Luego si la declinacion del Sol esturiere errada, no serà verdadera la altura

del Polo que han tomado. Por tres causas está errada la declinacion del Sol que los Pilotos tienen en sus regimietos: la vna es, porque las tablas de declinacion del Sol, estan hechas para quando la mayor era. 23. grad. 30.minutos, y en el tiempo de aora, la mayor declinación del Sol, es. 23. grad. 28. minu. aunque esta diferencia es tan poca que se pudiera sufrir, pero juntada con otras, es de consideración. Ay otra causa porque la declinacion del Sol està errada en los regimientos, y es, que las tablas de declinacion estan hechas segun el monimiento del Sol, que dan lastablas Alfonsinas, el qual no concuerda con las observaciones que en este tiepo fe han hecho, assi por las que tengo hechas, como por las de otros Matematicos muy diligentes: y quando las tablas estudiera hechas por la dotrina de Copernico, tambien discreparan de la verdad, y aun con mayor error, segun q las observaciones deste tiepo muestran Porque se entieda mejor, pongamos vn exemplo: En este año de. 1594, en dos de Hebrero al medio dia, en el Meridiano de Lisboa, segun la dotrina de Copernico, estaua el Sol en. 13. grados. 4. minutos. 25. segun. de Aquario, a los quales les responden de declinacion. 16. grados 41. minutos. 37. segudos : y segun nuestras observaciones, el mismo año y dia, al medio dia, estuno el Sol segun su verdadero monimiento, en. 13. grados, y. 30. minutos. 18. fegundos de Aquario, a los quales responden de declinació. 16. grados. 47. minutos. 21. segundos: la qual declinacion, es menor que la que se hallô por Copernico. 7. minutos. 4. segundos, y tantos auria de error, si las tablas de declinacion estuniessen hechas segun la dorrina de Corpenico.

Tambien segun la dotrina de don Alonso, el verdadero lugar del Sol, en el mesmo dia y año, al medio dia, es. 13. grados. 51. minu. de Aquario, a los quales les responden de declinacion. 16. grados. 41. minutos. 37. segundos: la qual es menor que la que hallamos segun nuestra observacion. 6. minutos. 44. segundos; y tantos auria de error, tomando la altura del Polo el dia que està dicho, si las tablas de declinació estuuiessen

hechas por la dotrina de don Alonfo.

La tercera causa, porque las tablas de declinación que los Pilotos lleuan en sus regimientos estan erradas, es, porque el Sol no buelue a cabo de los quatro años, a los lugares que tuuo en los quatro años precedentes, como si el año de. 1588. El primero dia de Enero, estuuo en va cierto lugar del Zodiaco, el año de. 1592. el primero dia de Enero, no boluera al mesmo lugar. Luego el año de. 1592, no tendra la mesma declinacion, que tuu o el año de. 1588, como lo tienen los Pilotos en las tablas de sus regimientos: y aunque en. 20. ô en. 30. años no seria mu y sensible este error, pero en muchos años se podria sentir, como lo haze en las tablas que aora traen los Pilotos, que ha muchos años que se hizieron.

La causa porque el Sol no buelue a cabo de los quatro años al lugar donde estuno, es, porque dado acabo de los quatro años yn dia de visiesto:y con esto dan mas tiempo de lo q realmête contiene los quatro años folares, cerca de 44. minutos de hora: y lo q el Solanda en estos. 44. minutos, passa mas adeláte en el Zodiaco, como si el año de. 1588. el primero de Enero a medio dia, estuviesse el Sol en. 10. grados. 24. mivutos. 46. fegudos de Capricorno en el Meridiano de Lisboa, el año de. 1592, en el mismo dia, y mes, y en el mismo Meridiano vendra a estar el Solen. 10. grados.26.minutos.38.fegundos.6.terceros:porq en los.44.minutos de hora q fe dieron a estos años, anduno el Sol. 1. minuto. 52. segudos. 6. terceros, q anadidos a los. 10. gra. 24. min. 46. fegun. que fue el lugar del Sol en q estuno el primero de Enero, de. 1588. al medio dia sera los 10. grad. 26. min. 38. feg. 6. terceros: y este mesmo crecimiento haze en todos los demas dias del año. De manera q en. 8. años visestiles q se hazen en. 22. años, auria de diferencia en el lugar del Sol. 14 min. 56 feg. 48 terceros. Por lo qual, fi las tablas de declinación estunieren hechas para el año de 1588. la declinacion q estuniere puesta frontero de cada dia, no será la q claño de 1620 tiene en los milmos dias, porque este año està el Sol mas adelante, en cada vn dia. 14, minutos. 56, segundos. 48, terceros, de lo que estuno el año de. 1588. de manera, q las tablas de declinación que lleuan los Pilotos, no fon fino para yn breue tiempo, y para los que no fe apartã mucho del Meridiano para adonde estan hechas.

Ay otro error, que se puede juntar a los que auemos dicho. Las tablas de la declinacion del Sol, que los Pilotos lleuan en su regimiento, estan hechas para vn cierto Meridiano, para el qual cuentan el lugar del Sol: luego estando en otro Meridiano diferente de aquel para donde està cótado el lugar del Sol,no tendra el lugar del Zodiaco q tiene aquel mismo dia en el medio dia, en el Meridiano para dode estan hechas las tablas de declinacion; luego no tendra la mesma declinacion. Por lo qual vsando los Pilotos entodos los Meridianos de vinas mesmas tablas de declinacion, sin hazer equación, ha de auer error en la declinación, quanto responde al monimiento q el Sol hizo en la diferencia de tiepo que ay entre los dos meridianos. Como fi las tablas de declinacion estuniessen hechas para el Meridiano de Lisboa, el que nauegasse para la India, y se hallasse. 120. grados de longitud, apartado del Meridiano de Lisboa : entre estos dos meridianos ay. 8 horas de diferecia de tiepo, en las quales anda el Sol. 20. min. de Zodiaco: pues la declinació q respondiesse a estos. 20. min.auria de error en las tablas, q algunas vezes ferã.8.min. De manera, que por no estar hechas las tablas segu el verdadero lugar del Sol, ay vn error: y por estar hechas para vn Meridiano, y vsar dellas en todos, es otro error: y de no estar hechas segun la mayor declinacion del Sol,

es otro, que juntandose todos, puede ser mas de medio grado de error en tomar la altura del Polo.

Otra causa ay, que tambien les puede causar algun error en tomar la altura del Polo, aunque serà poco, que es la diversidad de aspecto: y porque el error que de aqui se puede causar, es de poca consideració, y mucho el embaraço para Pilotos, la dexo para los Matematicos.

Si los Pilotos fueran diestros en el vío de calculación de tablas, tuuiera por mejor, que supiessen la declinación del Sol por el lugar que cada dia tiene en el Zodiaco, el qual se sabe por tabla que para ello està hecha: y sabido el lugar del Sol, por otra tabla se sabe su declinación.

Aunque es verdad, que no se puede hazer tablatan general, que en muchos años no haga alguna diferencia, pero alomenos para vna edad podria servir sin error sensible, que en otro tiempo vendran otros Matematicos, que en mienden el defeto que hallaren, haziendo sus obferuaciones, como aora se han hecho: las quales pondre aqui, y el instrumento con que se hizieron, para que se entienda el fundamento con que se procede en este regimiento, y tambien para que sea dotrina para hazer otro quando sea necessario.

CAP. 111. Como se hallara la distancia que ay entre los dos Tropicos.



RESO quatro dias antes y despues de los Solsticios, se vayan tomando las alturas Meridianas del Sol con mucho cuydado, y guardese la mayor que se hallò en cada Solsticio, despues se reste la menor de la mayor, y lo que que dare es la distancia entre los Tropicos; que partida por me-

dio, cada mitad es la maxima declinació del Sol, que es lo que cada Tropico está apartado de la Equinocial. Esta regla sirue, para quando el Sol en cada vna de las alturas que tuuo en los Solsticios, estuuo del Zenit para el Mediodia, o para el Septentrion: pero si el Sol estuuo en la vna altura del Zenit a la parte de Mediodia, y en la otra del Zenit a la parte del Septentrion, entonces se junten las dos alturas, y la suma de entrambas se reste de 180, que lo que quedare es la distancia entre los Tropicos.


Es de tanta importancia conocer la distancia entre los Tropicos, que sin saberla, no se puede proceder a ninguna cosa de Astronomia, y assi esta es el basis, y fundamento, para venir en conocimiento de todas las cosas tocantes al primero mobil, y movimiento de Planetas: y finalmente de toda la Astronomia. Por lo qual me parecio tratar muy particularmente el modo como se fabra con mucha precision, para lo qual enseñare la fabrica de vn quadrante, como hize en Lisboa, con el qual, a mi parecer, se podra observar mejor que con los que hasta aqui se han hecho. Dize Ptolomeo, suan de Monterregio, y Copernico, que se haga vn quadrate, cuya superficie se ponga en la linea Meridiana, muy anivelado de todas partes al Orizonte, y el centro del quadrante buelto a la parte del Sol: en el cetro se ponga vna coluna muy redoda, cuyo gruesso

Nauegacion. 7

fea del Diametro de vn real de a ocho, y al tiempo que el Sol llegare al Meridiano, se vea donde la sombra de la coluna corta a la circhnferencia del quadrante, que tomando el medio de la sombra, alli se vera la altura que Sol tuuo. El quadrante ha de ser tan grande, que cada grado se pueda dividir en. 60. partes, para que la altura se pueda tomancon precision. Aun que este modo de tomar la altura del Sol, es bueno, pero tiene algunos inconuenientes, por qua sombra del estilo no corta en el plano del quadrate, de manera que se semente se pueda determinar los estremos della, por donde no se tomarà muy precisamente el medio de la sombra trambie en la aniuelació del quadrate puede auer algun engaso. Demas desto, quado el Solllega al Meridiano, si có mucha presteza no se toman los estremos de la sombra, luego passa el Sol, y la sombra del estilo no puede cortar en la circunferencia del quadrante.

Si en lugar de la colunilla se pone alidada, tambien tiene sus inconuenientes, por que fiendo la alidada algo grande, es discultos o de ponerla derecha: y tambié si en llegando el Sol al Meridiano no se tomare con mucha presteza la altura, no se podra tomar, por que passando el Sol del Meridiano, sus rayos no entrara por los agugeros de las pinulas. Pues para euitar algunos destos inconuenientes, se hizo el quadrante que se sigue.

Hagase de quatro palos bien labrados el quadrante, a b c d, bien encaxados vnos co otros, y sobre el cetro, a, se harala quarta parte de vn circulo con la anchura necessaria para la graduació, como muestra la quar? ta,b d, que tambien será de la mesma madera y bié ajustada con los palos, abcd. Para la firmeza del quadrante se le pondran las barras, af. Kf. g.f. todo ello muy bien ajustado y encaxado. El semidiamerro del quadrarte,b d, que es la distancia,a b, por lo menos tedra ocho palmos para auer de dividir cada grado en.60, minutos. Para q la división se haga mas precifa, se ha de aforrar la quarta, b d, con vna chapa de laton : y si quifieren que el quadrante sea muy fixo, se cubriran los superficies de todos los palos de chapas de laton. La graduación y numeración de los grados en teros, se puede hazer por los circulos interiores de la quarta, b, d: y la gra duacion y numeracion de los minutos, por los circulos exteriores. En los puntos, m n, fe le pondran dos pinulas, y en ellas fe le haran dos agugeros como los suelen traer en las alidadas de los Astrolabios, y ha se de tener gran cuenta, con que estos agugeros se hagan ygualmente les uantados del lado del quadrante, y en vua linea que vaya paralela; o equidistante de la linea, ab. Del centro, a, tiene de salir ve hilo, que para este menester es muy bueno de hilo de hierro, o de laton de lo muy delgado, como aquello que se pone en los monacordios. Deste hilo se colgarà vna pesa de plomo redonda, que pese mas de vna libra. porque estè bien tirante el hilo, y mas segura de mouerla el ayre. Demas desto se hara vn pie, en que se ha de sustentar este quadrante : pues hagase vna coluna, p q, tan alta como la mitad de la diagonal del quadrante : en la parte de, q, se le ponga vn pie sobre que assiente la coluna, de manera que pueda sustentar el quadrante bien fixo : y en la parte de, p, se pondra vna cabeça de madera bien quadrada, como muestra, Kl: y por la parte de,p, se le hara vn agugero, por donde entre



vna espiga de la coluna, p q, de tal manera, que la cabeça, K I, pueda andar al rededor, sin bacilar. A esta cabeça se le hara vn agugero por el punto, o, quanto vn dedo de gruesso. En la barra, à f, del quadrante, se hara otro agugero del mesmo tamaño: por estos agugeros entrara vn perno, que junte el quadrante con la cabeça, K I: a este perno se le pondra vn tornillo por la parte contraria de , K I, con que se apriete el quadrante contra la cabeça quando suere necessario.

El agugero que se haze en la barra, a f, serà en el punto, e, que es cen-

tro del quadrante.

Preparado el quadrante como se ha dicho, se vsará del en esta manera. Quando se huniere de hazer observacion de tomar la altura del Sol, se tendra descrita vna linea Meridiana, y en ella puesto vn estilo muy perpendicular al Orizonte: y antes del Mediodia, quando se viere que la sombra del estilo se va acercando a la linea Meridiana, se ponga el quadrante con su pie, donde libremente le pueda dar el Sol vin poco antes y despues de Mediodia: y buelto el centro del quadrante a la parte del Sol, se leuante, o abaxe, reboluiendose sobre el perno que passa por el agugero, e, y trayendole al rededor sobre la espiga de la coluna, se yran poniendo las pinulas frontero del Sol, de manera que entrando sus rayos por el agugero de la pinula alta, den en el agugero de la pinula baxa, y entonces se vera en la graduacion de la quarta los grados, y minutos, donde corta el hilo que viene del centro, a. Pues desta manera se yrà preparando el quadrante, hasta que la sombra del estilo passe justamente por la linea Meridiana, que entonces cortarà el hilo la mayor altura que

el Sol puede tener en aquel dia. Si cayendo el hilo del centro, a, no vinies fe muy equidistante a la superficie del quadrante, sino que se arrimasse,o apartasse della, se sazonará el pie de manera, que el perpediculo cuelgue libremente lo mas apegado que pudiere ser a la superficie del quadrate. Comiençale a tomar la altura del Sol, vn poco antes del Mediodia, porque se vaya preparando el instrumento para quando llegue el Sol al Meridiano, que este dispuesto de manera, que no aya en que tropeçar.

Pues quando se huuiere de hazer observacion de la entrada del Sol en los Equinocios, o en algun otro figno, se tomaran las alturas Meridia: nas del Sol, algunos dias antes, y despues, para que de conformidad de las vnas y las otras, se sepa la mas cierta. El año de 1587, obserue en Lisboa, 4 obsensables con vn quadrate hecho por la fabrica q tengo dicho, la mayor altura Me bollaguales de de ma ridiana del Sol en el Solfticio estival, y hechas observaciones antes y des espa no ante una pues del Solfticio, fue la mayor altura Meridiana aparête del Sol.74. gra 2012 en el 201 dos, y. 48. minutos. Y añadida la Paralaxis q aquel dia tenia el Sol, que era la masina. O de l 47. legundos, ferà su verdadera altura. 74 grados. 48. minutos. 47. segun. neris. 23.28. dos. En el mesmo año obserue la mayor altura aparente del Sol, en el Solfticio yemal, y fue. 27. grados. 50. minutos: y añadida la Parafaxis que aquel dia tuuo el Sol, que fue 2. minutos. 37. segundos: serà sur altura verdadera.27.grados. 52.minutos. 37.fegundos. Pues fi restaremos. 27. grados.52.minutos.37.legundos, que fue la menor altura Meridiana que el Sol tuuo sobre el Orizonte, de la mayor altura que fue. 74. grados. 48. minutos. 47. segundos, quedaran. 47. grados. 56. minutos. 10. segundos: y esta es la distancia que ay entre los dos Tropicos, y la mirad della, que son.23.grados.28.minutos.5.segundos, es lo que la Equinocial està apare tada de cada Tropico, que es lo mesmo que la maxima declinacion del D. Budelona dela Sol. Esta mesma distancia entre los Tropicos, algunos segundos poco Esta resaura la sur la s mas, hallô don Bartolome de la Gasca en la ciudad de Valladolid, por vn nomon que tenia ciento y veynte pies de alto, el qual estaua fabricado con la industria que en tal caso se requiere : en compañía del qual se hallò en todas las observaciones, el Licenciado Caravallido, buen Matema» tico, y diligente en observar. La misma distancia hallò el Doctor Iusepe Sobrino, Capellan del Rey, con vn quadrante de laton, que cada grado estaua diuidido en.60. minutos; el qual era muy diestro en hazer observa ciones, y en todo genero de Matematicas. Esta mesma distancia hallô Pedro de Retes, buen Matematico en las Indias, en el nuevo Reyno en la ciudad de Santa Fè de Bogotà, que està tres grados y medio de latitud Septentrional. Por lo qual la menor altura del Sol sobre el Orizonte, es de.63. grados.2. minutos, donde no puede auer refracion de los rayos del Sol: y assi por vnas y otras observaciones se puede inferir, que no ay refracion de los rayos del Sol, y que la distancia entre los Tropicos es la que auemos dicho.

No se deue admitir lo que dize Antonio Magino en el libro quarto de sus triangulos, en la proposicion. 6. donde dize, que las alturas Meridianas del Sol, que se han de corregir y enmendar, por razon de la refracion de los rayos del Sol, que acontece por los vapores que suben de la tierra. Si Antonio Magino huuiera hecho muchas observaciones, y en

1862

diferen-

diferentes tiempos, no diera credito a lo que dize Ticho Brahe, el quella tuniera tan exquisitos instrumentos como aca tenemos, y en diferentes años hiziera observaciones, no hallara que la refracion de los rayos del Sol causaua diferentes alturas Meridianas: lo qual experimeramos muchas vezes, y siempre hallamos, que en todos los años, el dia de los Solfticios tuuo vna mesma altura Meridiana; lo qual no pudiera ser, si huuie ra refracion de rayos, porque no todos los años auian de estar los vapores de vna mesma manera, para que hiziessen vna misma refracion. Quãto mas que no se ha de creer, que teniendo el Sol cerca de. 75. grados de altura sobre el Orizonte, que alli huuiesse vapores que causassen refracion:ni tampoco quando està. 28 grados, como nos lo muestra claro la experiencia, porque la distancia que aqui auemos hallado entre los Tro picos, esta mesma han hallado otros diligentes observadores, en diferetes tiempos y lugares, que es bastante argumeto, que los vapores en estas alturas Meridianas del Sol, no causan refracion.

Aunque esta es suficiente prueua, para entender que no ay esta refracion de rayos, que dizen Magino, y Ticho Brahe, pero para mayor fatiffacion demostraremos como si huuiesse la tal refracion de rayos, antes auria menos distancia entre los Tropicos, que la que se halla por el ravo directo del Sol, y no mayor, como estos Matematicos quieren. Sea en la figura figuiente, el Orizonte, a b, y el Zenit, d, y la altura del Sol en, f, sean was los vapores en el ayre, m, n, claro esta, que tambien puede aner vapores a la parte del punto,n, como a la parte del punto,m: pues porque no di-

remos, que el rayo refracto del Sol, es, my a 45 em nl, y que la altura del Sol, es, bl, mayor que, bo, que es la que el rayo directo nos muestra? De la misma manera, dan. do el rayo del Solen el vapor, m, el ravo refracto es, m q, y seria la altura del Sol,b q, menor que,b o, que es la altura del rayo directo. Tambien pueden eftos vapores, que dizen hazen la refracion, no en el Vertical, donde verdaderamente està el Sol, sino en otra qualquiera parte; porque si ay refracion, ha se de causar en el vapor mas gruesso, y

. ii was Joz

mosereno que yte el

este puede estar en qualquiera parte, y no en el Vertical del Sol: y siedo assi, tengo por dificultoso, q se pueda saber la refracion, por no se poder faber el verdadero Vertical del Sol, y fi se diesse q ay refracion. Tambié el rayo reflexo puede hazer otra segunda refracion, lo qual seria causa que estando el Sol en vn mesmo grado de Zodiaco, tendria diferentes alturas en vn mismo Orizonte, lo qual no se halla por observació, pues puede acontecer, que estando el Solen el Tropico yemal, su rayorefracto fuesse causado del vapor, n, y entonces se tomana mayor altura q la verdadera. Y al contrario, quando el Sol està en el Tropico estimal, que el rayo refracto fuesse causado del vapor, m, y entonces daria menor altura que la verdadera, como se vee claro en la figura , por lo qual la distancia entre los Tropicos seria menor, que la que se halla por el rayo directo, y no mayor, como dize Magino, y Ticho Brahe. Pues fegü esto se sigue, que la altura del Sol que se tomare, es la verdadera, sin hazer caudal de refració de rayos, fino folo de la paralaxis que el Sol puede tener, segun su altura, lo demas es chimera: porque si huviesse esta refracion de rayos en vn mismo tiempo, se hallaria mayor y menor distã: cia entre los Tropicos, como consta de lo que se ha dicho en esta figura. En esto de la refració de los rayos del Sol, en otra parte trataremos mas largo, donde demostraremos, que la diafanidad de los cielos no puede fer causa de impedir el rayo directo del Sol, ni tampoco los vaporesque ay en el ayre, como quieren algunos : y la dificultad que ay en saber esta Jo youy grade di refracion, en caso que la huuiesse.

Pues de aqui se colige la altura del Polo de Lisboa, porque si de. 74: " " " " de cuisea de grados. 48. minutos. 47. segundos que tuuo el Sol de verdadera altura, me el sol de verdadera de ver quitaremos. 23. grados. 28. minutos. 5. segundos que tiene de declinacion, quedaràn. 51. grados. 20. minutos 42. segundos, y esto tiene de eleuacion la Equinocial fobre el Orizonte, cuyo compleméto para. 90. es lo que dista el Zenit de la Equinocial, que son 38. grados. 39. minutos: Altura de yolo de

18. segundos: y otro tanto es la altura del Polo,

Es de aduertir, que en el pueblo donde se huvieren de hazer observa. ciones, la altura del Polo se tome en los Solsticios, porque entonces la variación de la declinación del Sol, no es fenfible de yn dia para otro.

Puedense poner en la circunferencia del quadrante, las lineas diago. nales que enseñamos adelante en el capitulo. 29. y como alli dezimos que vayan de grado en grado, se pueden descriuir de cinco minutos en vinco minutos; y sean tan largas las diagonales, que cada vna se pueda 🎢 diuidir en. 60. partes, segun que en otra parte enseñamos. Muchos instru mentos obferuatorios para la altura del Sol, y de estrellas, se pudieran poner, como son la sexta parte, o tercia de vn quadrate; pero no se puede fiar tambien dellos, como deste quadrante, como lo tengo experime tado, assien el vso de los tales instrumentos, como por la dificultad de la fabrica:porque por mi propia mano los tengo fabricados en laton, có la curiofidad y bien labrados, que el mas diligête artifice los puede labrar, porque la grandeza de los tales instrumentos, trae consigo alguna dificultad, assi en labrallos como en medillos : que por auer labrado instrumentos, se los incouenientes q tienen en las fabricas, y en el v so: y en es to puedo tener voto, porque ha mas de quarenta y quatro años que no gasto el tiempo en otra cosa. El como an

CAP. 1111. En que se enseña como se hara la tabia de declinacion de las partes del Zodiaco, segun que la mayor es.23. grades.28. minutos.



VES Por las observaciones que auemos dicho, auemos conocido, que la maxima declinacion del Sol en este tiempo, es. 23. grados. 28. minutos: la qual declinación han hallado otros dili-

Iisboa 38 39


Ga 8 4 . 12 18 . 2 4

gentes observadores, con algunos segundos mas, de los quales por ser ta pocos, no haremos caudal en la fabrica de la tabla. Demuestra Iuan de Monteregio, y otros autores, esta proposicion.

El seno todo al seno recto de la maxima declinación, tiene la misma proporción, que el seno recto de qualquier arco de ecliptica, al seno re-

to de su declinacion.

Destas quatro cantidades estan conocidas las tres, que son el seno todo, y el seno recto de la maxima declinación, y el seno recto del arco de Ecliptica, cuya declinación queremos faber: pues figuiendo la regla de proporcion, vendremos en conocimiento de la declinació de qualquiera arco de la Ecliptica. Aunque muchos autores han demostrado la precea dente proposicion, la pondre aqui, demostrada por diferente modo que los demas. Sea en la Esfera la linea, a d, la comú fecion del plano de la Écli prica, y el de la Equinocial: y el centro de la Esfera el punto, e, fobre el qual se descriva el circulo, a K d B, q representa la Ecliptica: y sea la Equi nocial, a bu d A H. los principios de Aries, y Libra, a d: y el principio de Cancer, K.y el de Capricorno, B, apartados de los putos, a, d, por vn quadrate. Sean los Polos del mudo, E, F, por los quales y los Polos de la Ecliprica, K B, se descriua el coluro de los Solsticios, E K F B. Pues serà la linea, a d, la comu seció del plano de la Ecliptica, y la Equinocial y la linea. K B, la comun seció del plano del coluro de los Solsticios, y la belipueas y la linea, b A, la comun secion del Coluro, y de la Equinocial. Pues el cir culo, EKFB, passando por los Polos del mundo, EF, y principio de Cãcer, corta a la Equinocial en; biluego ferà el arco de coluro, Krb, la maxa ma declinacion del Sol. Tomese en la Ecliptica el arco, a h, de 30 grados, y,d g,de otros tantos;tirefe,h g, q cortarà la linea, B K, en, m, sobre el pus to, m, se descriua el circulo, br g D, paralelo a la Equinocial, el qual corttarà a la Ecliptica en los puntos, h, g, y ferà la linea, h,g, la comun secion del plano del paralelo, h r g D, y el de la Ecliptica : la qual linea ; h g, sena paralela de,a d,por la. 16. del. 11. de Euclides. Pues que el arco,d g, que el paralelo, hKg D, cortò de la Ecliptica fueron 30 grados y elarco, Kr. bs de.23.grados.28.minutos, que es la maxima declinació, tomele, bl, y gual de, K b, y tirefe, K l, que cortarà à la linea, b A, en, n, fobre el qual punto de hara el semicirculo, K pl. Pues la linea, A b p, está en el plano del circula; AKbB, y tâbien la linea, Kb: luego la linea recta, Kn l, estara en el mismo plano; por lo qual tambien el ferricirculo, Kpl. Demas desto, el paralelo de la Equinocial, hr g D, corta el coloro, A K b B, en los puntos, r D, y sa comun secio, es la linea, r D, la qual corta al semicirculo, k pa, en x, y por la. 16.del. 11. de Eucli: la linea, r D, sera paralela de, A b, y cortarà a la linea Kl, en, o, y a la linea, h g, en, m, y al femicirculo, K pl, en, x, tirefe, x t, perpendicular sobre, np, y, g R, sobre, a d. Por la. 2. del. 6. de Eucli, la proporcion de, Km, con, me, es como la de, Ko, con, on, y componiendo como fea, Ke, con, me, asi fea, Kn, con, on, y permutantando como fea, Ke, con, K n.assi sea, m e, con, o n: luego como sea el semidiametro, K e, co el femidiametro, Knjassi, me, seno recto del arco, g deconson feno recto del arco, x p:por lo qual el arco, g d, es semejate al arco, x p:y sitomamos el arco, g d de. 30. grados, tambien el arco, x p, serà de orros, 30. Luego el parale-



paralelo, h r g D, corta lemejantes arcos en la Ecliptica, y en el femicira culo, K p l, y la linea, x o D, es comun fecion del Paralelo y el Meridiano.

De lo dicho se colige, que como se ha el seno todo, al seno recto de la maxima declinació, assi se ha el seno recto de qualquiera arco de la Ecliprica, al seno recto de su declinacion. Por los Polos del mundo, EF, y por el puto, g, se descriva el circulo maximo, Eg FH, y corrarà a la Equi nocial en los puntos, u H: y la linea, u H, serà la comun secion de la Equinocial:y el circulo, Eg u F H, y el arco, g u, deste circulo, es la declinació del arco de Ecliptica, d g y el arco, u g, es y gual del arco, b r por la. 10. del fegundo de Teodosio, porque la Equinocial corta a los circulos maximos, Er F A, Eg u F H, en los puntos, b, u; los quales circulos passan por los polos de la Equinocial, y el paralelo, h r g D. los corta en los puntos, r,g,donde queda yguales los arcos,u g,r biy la linea,b c,es seno recto del arco, b r:luego tambien lo ferà del arco, u g. Teniamos prouado, que el feno todo, Ke, al seno recto de la maxima declinació, Kn, era como, gR, que es ygual de, me, seno recto del arco de Ecliptica, d g, al seno recto, b c,que por lo que està prouado, es seno rectó del arco, u g, el qual arco es la declinación del arco de Ecliptica, d g. Luego queda demostrado, q el feno todo al feno recto de la maxima declinacion del Sol, es como el

feno recto de qualquier arco de Ecliptica, al feno recto de su declina-

Es de aduertir, que en la descricion de la figura vsamos de Ellypses Moen lugar de circulos, para demostrar mejor la perspectiua de la Essera: y assi se vera, que todos los circulos se cortan en los mesmos lugares, como si se descriuieran en la Essera natural. Por esta figura se pudieran demostrar otras muchas cosas, pero por no ser desse lugar, se dexan de

dezir; hallarse han en la fabrica de nuestro Astrolabio.

Pongamos vn exemplo de la dotrina precedente, quiero saber la declinacion de. 20. grados. 20. minutos de Tauro, pongo el seno todo. 100000. y serà el seno de. 23. grados. 28. minu. que es la maxima declinacion. 39821. y el seno de. 20. grados de Tauro. 20. minutos, contado de principio de Aries, que son. 50. grados. 20. minutos, es. 76977. Pues cocomo se hã. 100000. que es seno todo con. 39821. que es seno de la maxima declinacion, asís se hã. 76977. que es seno de vn arco de Zodiaco de 50. grados. 20. minutos, con su declinacion, multiplicando. 76977. por 39821. serà el producto. 3065301117. el qual numero partido por. 100000. que se hara quitando. 5. letras de la mano derecha, quedaràn 30653. que seran seno de la declinacion del arco de. 50. grados. 20. minutos, que en la tabla de senos se responden. 17. grados. 51. minutos. 1. se gundo. Pues por este orden se podra saber precisamente la declinacion de qualquiera arco de Zodiaco, y hazer las tablas de declinacion, por grados, y minutos. En la tabla siguiente van de diez en diez mi

nutos, quien la quifiere hazer mas menudamente,

por la dotrina que està dada la

podra hazer.

and the first of the control of the

er geller i de green geleer geleer de green g

Tabla


		. (/	4
Tabla	del	a dec	linacion	del Sol.

	Labla de la declinación del Sol.	13
	IN EIR WIT XII	
0	G M S G M S G M S 1	
	0 0 0 0 0 11 29 5 10 10 15 30 30 10 1 7 58 11 36 7 20 14 38 40	
	30 11 57 11 39 37 20 16 44 30 40 1 15 55 11 43 7 20 18 49 20	
	1 13 54 11 46 37 20 20 53 10 1	
I	10 27 52 11 53 35 10 15 00 50 29	
	30 35 49 12 00 32 20 29 5 30	
	50 +3 +7 12 7 28 10 33 7 10 1	
2	10 51 45 12 14 13 120 37 6 50 20	
	30 42 12 21 16 20 41 3 30	
	50 1 7 40 12 28 8 6 44 58 10	
3	3	
	30 1 1 23 35 12 41 48 20 152 +0 130 1	
	501 1 131 132 1 10 1 +8 130 120 130 127 130 1	
4	10 1 39 29 11 55 12 21 0 11 50 20	
	30 1 47 26 13 , 2 7 21 3 54 501	
	50 1 55 22 13 8 51 21 7 33 10	
5	5 1 50 20 13 11 11 11 9 21 15 1 1	
	30 2 13 14 12 22 14 21 14 43 30	
1	50 -2 19 10 13 28 53 31 18 14 10	
6	10 2 17 6 13 35 30 21 11 43 150	
	30 2 35 2 13 42 6 21 25 9 30	
	50 2 42 57 112 48 41 21 128 32 101	
7	10 2 50 52 13 55 14 121 31 53 50 2	3
	30 2 54 46 14 1 56 21 35 12 30 1	
1-	TOP × XX]

T 2

700	
9	18
-4	Sout.

-	IN TIA WITH	-
	G M S G M S G M S I	
	20 6 2 41 16 27 8 12 39 37 40 30 6 6 33 16 30 3 12 40 37 30	
	40 6 10 24 16 32 57 22 41 41 10	
16	16 6 18 6 16 38 44 22 43 48 14 1	4
	20 6 25 48 116 144 129 123 145 151 1491	4
	130 1 6 129 139 116 147 121 122 146 152 130	
17	50 6 37 19 16 53 4 12 48 51 10	
17	10 6 44 59 16 58 46 22 50 48 50	3
	10 6 48 49 17 1 36 12 51 45 +0 30 6 51 39 17 4 25 12 51 41 30	
	40 6 6 6 28 17 7 13 12 53 37 10 50 7 0 17 17 10 1 22 54 31 10	
18	18 7 4 6 17 12 48 22 55 27 12 1 10 7 7 55 17 15 35 22 56 21 50 1	2
	10 7 11 44 17 18 11 21 57 14 40 30 7 15 31 17 21 7 22 58 6 30	
	40 7 19 21 17 23 53 22 58 57 20	
19	19 7 16 57 17 29 23 23 0 38 11	I
	101 71 30 145 117 32 7 23 1 27 50	-
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
20	50 7 45 53 17 42 59 23 4 37 10	
	10 7 53 26 17 48 21 23 6 7 50 1	0
4	10 7 57 12 17 51 1 23 6 51 40 30 8 0 58 17 53 41 23 7 34 30	
	40 8 4 44 17 56 11 13 8 16 10 50 8 8 30 17 59 00 23 8 58 10	
21	21 8 12 16 18 1 39 23 9 39 9 10 8 16 1 18 4 17 23 10 19 50	9
	20 8 19 46 18 6 55 27 10 58 40 30 8 27 31 18 9 32 23 11 37 20	
	40 8 17 16 18 12 8 23 12 15 120	
22	22 8 34 45 18 17 18 23 13 29 5	8
	20 8 42 13 18 22 26 23 14 40 40	
	40 8 49 29 18 27 32 22 15 14 30	
1 - 1	50 1 81 53 22 1 18 30 5 23 1 16 21 10 1	
	122 5 124 55 X 135 X 1	



Vso de la tabla precedente.

Ara faber la declinación de qualquiera parte del Zodiaco, se romarà el signo en la cabeça, o pie de la tabla: si se hallare en la cabeça, los gra dos y minutos fe tomarã en la primera coluna de la mano yzquierda: y fi el signo se hallare en el pie de la tabla, los grados y minutos se tomara en la primera coluna de la mano derecha: y en el angulo comun fe hallara la declinació. Y porq los minutos van de voien 16 podra acontecer no fer justos los diezes en los minutos co que se entra en la tabla a buscas la declinacion en tal caso se podra tomar la parte proporcional, de la diferécia que huuiere entre los dos numeros mas cercanos a los minutos con q entro a buscar la declinacion. Exemplo, quierese saber la declinacion de 13. grados, y. 15. minutos de Tauro; hallase el figno de Tauro en la cabeça de la tabla, por lo qual fe bufcaran los minútos en la coluna de la mano yz quierda: y porq los. 15. minutos no los ay en la tabla, tomare la declinacion q està enfrente de los. 10. minutos despues de los. 13. grados, que es 15. gra. 48. minu. 31. fegund. y la declinación de. 20. minu. es. 15. grad. 51. min. 32. segund. Pues destas dos declinaciones tomo la diferencia, que es restando la menor de la mayor, y quedaran. 3, thin. 1. segun. destos tomare la parte proporcional q cabe a los.5. min. que eran mas q. 10. fi los minfueran 10. mas que los. 13. gra de Tauro, la declinación fuera 15. gra 48. min. 31. feg. y fi fueran. 13. gra. 20. min. suera la declinació. 15. gra. 51. min. 32 leg. y la diferencia entre. 10. y. 20. min. fon. 3. min. 1. leg. de los quales dare a los. 5. min. la parte proporcional, diziendo, Si a. io. min. le caben. 3. min. 1. seg. a. 5. min. le cabran la mitad de los. 3. minu. 1. seg. que es vn minuto. 30. legundos; que añadidos a los. 15. gra. 48. min. 31. legund. que refponden a los.13. gra.10. min. seran.15. gra.50. min.i. segundo: y tanta sera la declinación de 13. grados 13. minutos de Tauro.

Para saber esta declinación, se supone, que se ha de saber el grado del Sol el dia que quiero saber la déclinacion: y porque en la nauegacion es muy necestario saber la declinación del Sol, por que diante ella se sabe la altura del Polo, y por las observaciones deste tiempo, se halla que el lugar del Sol no responde al que esta en las tablas, assi por la dotrina de do Alonfo, como por la de Copernico: por las observaciones siguientes se aueriguo el verdadero lugar del Sol de cada dia, y se hizieron para ello nueuas tablas, como se vera en este discurso. Hizierose estas observaciones en Lisboa, donde es la elevación del Polo. 38. grados. 39. min. 20. fe- Liberta Pol gundos, por lo qual la eleuacion de la Equinocial lerà 31. grados. 20. mi-

nutos.40. segundos, como atras queda dicho.

El año de. 1587, en. 23. de Septiembre fue la eleuacion del Sol aparenté estando en el Meridiano. 51. grados. 22. minutos. 50. segundos : y añadida la paralaxis que aquel dia tuuo el Sol, fue la altura verdadera. 51. grados. 24. minutos. 41. fegundos, de los quales si restaremos la eleuacion de la Equinocial, quedan. 4. minutos. 1. fegundo, que sera la declinacion que tenia el Sol a la parte de Septentrion : y por lo que se ha dicho arras, sera su lugar en el Zodiaco. 29. grados. 50. minutos. 2. segundos de Virgo, que para llegar al principio de Libra,

6 misada es el fri co orferuada en Listo for liferance 1897 a 23 de 7 bu sel sol con 2 mere aunfils es Malid

Regimiento de

la faltan de andar. 9. minutos. 58. fegundos, los quales los tarda en andar el Col. 4. horas: y afsi diremos, que entró el Sol en principio de Libra, en 23. de Setiembre, a las. 4. horas despues de medio dia, segun el tiempo aparente; pero segun el tiempo y gual, sue a los. 23. dias. 3. horas. 46. minu-

tos.20. segundos, despues de medio dia.

En este mismo año, en. 7. dias de Nouiembre, tuuo el Sol de altura aparente Meridiana. 35. grados. 4. minutos. 16. segundos: pero añadida la Paralaxis sue la altura verdadera. 35. grados. 6. minutos. 42. segundos; los quales si los restaremos de la eleuacion de la Equinocial, quedaràn 16. grados. 13. minutos. 58. segundos, que es la declinacion del Sol, segu la qual, su lugar en el Zodiaco es. 14. grados. 35. minutos de Escorpió, que para llegar a los. 15. seltan. 25. minutos; los quales andará el Sol en. 10. horas: y assi entrará el Sol en. 15. de Escorpion, a los. 7. dias de Nouiembre, y. 10. horas despues de medio dia, segun el tiempo aparente: pero segun el tiempo ygual, entrarà a los. 7. dias. 9. horas. 37. min. 45. segund.

El año de 1588. en 20. dias de Março, fue la altura del Sol aparente en el Meridiano. 51. grados. 20. minutos: pero la verdadera. 51. grados. 21. minutos. 52. fegundos, por lo qual fue la declinacion. 11. minuto. 12. fegundos, a la parte de Septentrion: de donde se sigue, que el Sol esta ua en 3. minutos de Aries, y assi sue la entrada del Sol en principio de Aries, a los. 19. dias de Março, y 22. horas, y 48. minutos, segun el tiempo aparente: y hecha ygualacion de los dias naturales, fue la entrada del Sol en Aries, a los. 19. dias. 22. horas. 48. minutos. 55. segundos

despues de medio dia.


Pues segun estas observaciones, tardô el Sol desde que entrò en principio de Libra, haste que llegô a los. 15. grados de Escorpion. 45. dias.5. horas.51. minutos de hora, y mas. 25. segundos : y desde que entrô en. 15. grados de Escorpion, hasta que llegò al principio de Aries, tardò. 133.

dias. 13. horas. 11. minutos de hora, y mas 10. fegundos.

Pues por el mouimiento que hizo el Sol en estos dos internalos de tiempo, vendremos en conocimiento del Auge del Sol, y que tanta es su Eccetricidad. Descrivase el circulo, Klnp, el qual represente el Zodiaco: sea el centro del mundo, f, y el principio de Libra, l, y principio de Aries, p, y los. 15. grados de Escorpion el punto, q, sea, a m b g, el circulo Eccentrico por donde anda el Sol. Por la observacion que se hizo, tardò el Sol del punto, l, al punto, q, 45. dias.5. horas.51. minutos. 25. segundos de hora, en el qual tiempo passo el Sol de su Eccentrico, el arco, bc, que fegun su medio mouimiento, es. 44. grados. 35. minutos. 38. segundos. Pues tirando vna linea del punto, q, por el centro del mundo,f,cortarà al Eccentrico en, c, y en, d, tirefe la linea, l f p, y cortarà al Eccentrico en, ba, juntese, ca. Tambien por la observacion se hallò que en el arco de Zodiaco, q n p, tardò el Sol.133. dias-13. horas.11. minutos.10. legundos de hora, en el qual tiempo passo el arco de Eccentrico, e g a: que segun su medio mouimiéto, es. 131. grados. 37. minutos. 52. fegundos. Pues conocida la circunferencia, b c, que fegun la obferuacion es.44.grad.35.minu.38.segun serà otro tanto el angulo, bac, segun que dos angulos rectos fon.360 grados El angulo, lfq, es el mouimieto aparente

Langina Lijlana Che 1588 alog 19 Musio 22 y 48 cm Lod Jol in Y rente del Sol, que fueron. 45, grad. legun que quatro angulos rectos son. 360, gra. pero legú q dos rectos son. 360, gra. fera. 90, gra. por lo qual será el angulo, a fc, 270, gr. segun q dos rectos son. 360, teniamos q el angulo, b a c, era. 44. grad. 35. min. 38; seg. luego quedarà el angulo, a c d, de. 45. grad. 24. min. 22. segundos. Todo el arco, b c a, es. 176. grad. 13. min. 30.

fegundos: del qual quitado el arco, b c, quedara el arco, c g a, de
131 grad.37 min.52. fegundos, al
qual fi le añadimos el arco, a d, ferà, c g a d. 177. grad. 2. minut. 14.
fegund. Pues cada vno de los arcos, b c a, c a d, es menor q medio
circulo, el centro del circulo,
b am, no estará en ninguno de
ellos. Pues sea el punto, e, el cétro
del circulo, b a m, y por el púto, e,
fe tire, h e f g n, y serà el púto, h, el
Apogeo, o Auge del Eccentrico;
y el púto, n, el Perigeo, o opuesto
del Auge, tirese, e K, perpendicu-



lar sobre, cfd. Pues estan conocidos los angulos del Trigulo, afc, tedremos conocidos los lados, segun el Diametro que circunscrine el triangulo. Tenemos conocido el arco, c g a, luego por la tabla de senos conoceremos su cuerda, ca, que es. 182446. de las partes que el Semidiametro, em, tiene. 100000. teniamos conocidos los lados, fc, a c, fegun que eran cuerdas del circulo que circunscrine el triangulo, af c, lugo conoceremos el lado, fc, en la razon que, ca, es cuerda del arco, c g a, que Iera. 97905. Pues està conocido el arco, cad, conocerse ha su cuerda, c d, que fera. 199930 por lo qual su mirad, que es, c K, sera. 90965. estaua cocido el lado, c f, q era. 9790 5. partes, de las quales el Semidiamerro, em, tiene.100000. pues restando el lado, e f, de, e K, quedaran. 2060. partes, y tanto es la linea, f.K. Por el centro, e, se tire, r e s, paralela de, q f d, pues el arco, ca d, es menor que medio circulo.2.grad.57.min.46.segun. sera el arco, du,1.grad.28.min.53. segundos, por lo qual su seno, e K, sera. 2088. partes. En el triangulo rectangulo, e K f, estan conocidos los lados, e K, fK, que comprehenden el angulo recto: luego por la 47. del primero de Euel, conocersea el lado, e f, el qual sera. 3312. partes de las q el Semediametro, e m, es. 100000. y tanto es la eccentricidad del Sol. Quando, fe, es 3312.e K, eran. 2088. pero haziendo, fe. Semidiametro, fera, e K, feno del angulo, e fK, que en la tabla de senos le responden. 51. gra-23. minu. y el angulo, pfr,era.45.grados, luego todo el angulo, hfp,es.96.gra-23. min. Pusose el punto, p, principio de Aries, luego el punto, h, esta en. 6. grad. 23. minutos de Cancer, donde esta el Auge del Sol.

Esta demostración se ha hecho por las observaciones que hizo el Dochor Sobrino, Capellan del Rey, con un quadrante que su circunferecia tenia por Semidiametro, mas de seys palos de vara, y cada grado estava dividido en.60. minutos.

Con Madrid

En estos mesmos años y dias, y con la mesma diligencia, tome la entrada del Sol en los mesmos tres puntos, y segun esta mi observacion, hi-

ze la figuiente demostracion.

El año de. 1587. fue la entrada del Sol en Libra, en. 23. días de Setiembre.4 horas despues de medio dia, segun el tiempo aparente: pero hecha ygualacion de los dias naturales fue a las. 3. horas. 46. minutos despues de medio dia.

En el mismo año sue la entrada del Sol en. 15. grados de Escorpion, en 7. dias de Nouiembre, a las. 9. horas. 16. minutos, despues de medio dia,

Tegun el tiempo ygual.

The miente y Lety

a tingile de fu cabe?

h rediciano an injoo


while is objection als

L' dire Vudad

El año de. 1588. fue la entrada del Sol en Aries, en.19. dias de Março. 22.horas. 40. minutos despues de medio dia, segun el tiempo aparente: pero segun el tiempo y gual, a las. 22. horas. 40. minutos. 55. segundos.

nia peoina apheedil Pues segun estas observaciones, repitamos la figura precedente. De del Colochours cafe la entrada del Sol en Libra, que es el punto, l, hasta los. 15. grados de Es-Les de pay a fair corpion, que es el punto, q, tardò el Sol. 45. dias. 5. horas. 30. minutos de hora: el mouimiento ygual que hizo en este tiempo, sue. 44, grados. 36. hora: el mouimiento ygual que hizo en este tiempo, sue. 44. grados. 36.
mille Ed Life L minutos. 7. segundos: y tanto es el arco, b c. Desde que el Sol entró en 15. grados de Escorpion, hasta que llego al principio de Aries, tardô 1330 nevidius finis 28 dias. 13. horas. 44. minutos de hora, en el qual tiepo, segon su medio mouimiento, passo de su Eccentrico. 131: grados. 36. min. 11. segund. y tanto es el arco,c g a Pues el arco,b c,es.44. gra. 36. min. 7. legud. serà otro tato elangulo, bac, de los q. 360. gra. son dos rectos. El angulo, lf q, es. 45. gr. que es monimiento aparente del Sol, de los que 360. son 4. rectos: pero de los que 360. grad. son dos rectos, sera el angulo, lfq, 90. grad. y el angulo, afc, 270. de los mismos. Teniamos conocido el angulo, bac, qera 44.gra. 36.min. 7. segu. segu que 360. son dos rectos, luego sera el angulo, d c a, 45. gra. 23. min. 53. feg. Todo el arco, c g a, es, 13 1. grad. 36. minu. 11. feg.y añadiédole el arco, a d, q es, 45. gra. 23. min. 53. feg. ferá el arco, c a d, 177. gra. 00.4. seg. Pues los sementos de circulo, bea, cad, cada vno de ellos es menor que medio circulo; el centro del circulo, mbga, estarà fuera de entrambos: pongamos que fea el punto, e, por el qual, y el punto f, se tire la linea, h e f n, sera el punto, h, el Auge del Sol, y el punto, n, el opuesto del Auge: y la linea, e filo que el centro del Eccentrico está apar tado del centro del mundo. Pues para conocer el angulo, h fp, que es lo q el Auge del Sol està apartado del punto, p, q es principio de Aries, y tabien para conocer la linea, fe, se procedera desta manera. Pues estan conocidos los angulos del triangulo, a fc, estaran conocidos los lados, segu que son cuerdas de vn circulo que circunscriue el triangulo: y sera, ca, 141420.y,cf,75890.fegű que el Diametro del circulo es, 200000. luego fegun que, ca, es 182424. Siendo cuerda del arco, c ga, sera, cf, 97893. de las mesmas partes que son las del q el Semidiametro, e m, tiene, 100000. Tambien pues està conocido el arco, c a d, serà conocida su cuerda, c d, q ferà,199928.tirando,e K, perpendicular sobre, c d, sera, c K, la mitad de, c d, pues estando conocida, c d, sera conocida, c K, que sera 99964. pues restando, c f, de, c K, quedara, f K, que será 2071. El arco, ca d, es. 177. 00.4. segundos: falca para medio circulo.2. grados.59. minu.56. segund.

que la mitad es vn grado, 29. minutos, 58. fegundos, y tanto es el arco, du, cuyo feno es, e K, que por la tabla de fenos es, 2617. par tes de las que el feno todo es 100000. En el triangulo rectangulo, e K f, estan conocidos los dos lados, que comprehenden el angulo recto. Por la 47. del primero, fe conocerà el lado, fe, q fera 3337. partes de las q el femidiametro, e m, del Ecentrico tie ne, 100000. y tanto es la ecetricidad del Sol.



Resta conocer el angulo, h f p, pues quando, e f, ses 3337, e K, es 2617. Quando, e f, sucre semidiametro, se ra, e K, seno del angulo, e f K: y poniendo, e f, 100000. partes, sera, e K, 78423. a las quales responden en la tabla de senos, 51. grad. 39. minut. y el angulo, t f p, era de 45. grad. Luego todo el angulo, h f p, sera de 96. grad. 39. min. era el punto, p, principio de Aries: luego el puto, h, que es donde está el Auge del Sol, estará en 6. grad. 39. min. del signo de Cancer.

Para mayor satisfacion del lugar del Auge del Sol, pondre otra obser-

uacion en otros puntos del Zodiaco, diferentes delos passados.

El año de 1589. en 7. de Nouiembre, tuuo el Sol de altura aparente en el Meridiano, 34. grad. 55. minut. y añadiendo dos minutos, 24. fegundos que tenia de paralaxis, fera la altura verdadera, 34. grad. 57. min. 24. feg. por lo qual la entrada del Sol en 15. grados de Efcorpion, en el Meridiano de Lisboa, fue en 6. dias de Nouiembre, y mas 21. horas, 20. minut. fegun el tiempo aparente: pero fegun el ygual, fue a las 21. horas. 06.

El año de 1590.en 4. dias de Hebrero, fue la altura Meridiana aparente del Sol, 35. grad. 6. minut. 30. fegund. y añadida la paralaxis, 2. minutos, 24. fegund. fue la altura verdadera; 35. grad. 8. minut. 54. fegund. De donde se figue, que la entrada del Sol en 15. grados de Aquario, fue en 3. de Hebrero, à las 11. horas, y 8. minutos despues de medio dia, segü el tiempo aparente: pero segun el ygual, sue alas 11. horas, y 16. minut.

En este año de 1590. en 20. de Março, tuno el Sol de altura Meridiana aparente, 51. grados, 32. minutos, 30. segundos: y añadida la paralaxis, sue la altura verdadera, 51. grados, 34. minutos, 20. segundos: y fue la entrada del Sol en Aries, en 20. dias de Março, 10. horas y 30. minutos despues

de medio dia.


Desde que entro el Sol en 15, grados de Escorpion, hasta que llegó a los 15, grados de Aquario, tardô 88. dias, 14. horas, y 16. minutos de hora. Desde que el Sol entrò en 15. grados de Aquario, hasta que llego al principio de Aries, tardô 44. dias, 23. horas, 14. minutos de hora.

Pues segun estas observaciones se descriua el circulo, a b c e h, el qual sea el ecentrico del Sol, y sea el centro del mundo el punto, d. Sea en el ecentrico el punto, a, los 15. grados de Escorpion: y el punto, b, los 15. grados

Godrada diel fol or V 1590

grados de Aquario, y el punto, c, el principio de Aries: del punto, a, por el centro del mundo, d, fe tire, a de. Tirefe, d b, de: juntefe, ce, c b: tambien fe junte, b e, y tirefe, c l, perpendicular fobre, b e. Esto assi dispuesto, en el interualo de tiempo que huuo entre la primera y segunda observacion, el mouimiento y gual del Sol, fue 87. grados, 18. minutos, 42. segundos, que es el arco de ecentrico, a b, y el aparente sue 90. grados, que es

el angulo, a d b. En el interualo de tiempo que huuo entre la fegunda y tercera observacion, el mouimiento ygual del Sol, fue 44. grados, 19. minut. 19. segund. que es el arco de ecentrico, b c: y el mouimiento aparente, fue 45. grados, que es el angulo, a e b, es 87. grad. 18. minut. 42. segund. segun que dos rectos son, 360. pero segun que quarro angulos rectos son 360. es, 43. grad. 39. minut. 21. segundos, y el angulo, b d e, es recto: luego el angulo, e b d, sera



46. grad. 20. minut. 39. segund. Pues en el triangulo, b d e, siendo, be, semidiametro, sera, d e, 72350. partes de las que, b e, tiene, 100000. Demas desto, el angulo, a d e, por la observacion, es 135. grados: luego el angulo c d e, sera 45. grados, que es el complemento a dos rectos: el angulo, d e c, que es el que responde a los arcos, a b, b c, ya conocidos, es 131. grad. 38. minut. segun que dos rectos son, 360. pues siendo el angulo, c d e, 45. grados en el centro, sera en la circunferencia 90. Luego los dos angulos d e c, c d e, son 221. grados, 38. minutos, segun que dos rectos son, 360. luego el angulo, d e, sera 138. grados, 22. minutos, que es el complemeto a dos rectos, en la circunferencia. Pues dado los angulos del triangulo, d e, se daran sus lados, segun que son cuerdas del circulo que circuns criue el mismo triangulo, y sera la cuerda, e c, 141420. y la cuerda; d c, 186944. Teniamos sabido, que, d e, es 72350. partes, segun que, b e, era 100000. luego saberse han los sados, d c, e e, segun la misma razon, y sera el lado, e c, 54731:

En el triangulo, le c, el angulo, cle, es recto, y el angulo, be c, que responde al arco, b c, es 44. grados, 19 minutos, 19. segundos, segun que dos rectos son, 360. pero segun que quatro angulos rectos son 360. 22. grados, 9. minut. 39. segundoluego sera el otro angulo, le e, 67. grados, 50. minut. 21. segundos, que es el complemento a dos rectos. Pues conocidos los angulos del triangulo rectangulo, cle, seran conocidos sus lados, segun que el lado, ce, opuesto al angulo recto, suere 100000. y, le, sera 37730. 1e, 92613. Por lo qual, segun que teniamos que el lado, ce, era 54731. sera el, 50687. y el lado, le, 20650. partes de las mismas. En el triangulo rectagulo, clb, el lado, le, fue conocido, que era 20650. partes de las que be, eran 100000. y el lado, le, era de las mismas partes, 50687. las quales resta-

das de 100000.que es el lado, b e, quedarán, 49313. y tanto fera el lado, b l. Pues conocidos los lados, b l. Que comprehenden el angulo re cro, b l e, por la 47. del primero de Euclid. hallaremos el lado, b c, que es 53.462. partes de las q.b e, tiene 100000. Teniamos que, c e, era de las mismas 54731. luego de las partes quere, b e, como cuerda del arco, b c, que fon 75460. sera, c e, 77251. partes: y fiendo, c e, cuerda del arco c e, sera conocido el tal arco, que fera 45. gra. 26. min. Teniamos que



el arco, a b, era 87. gra. 18. min. 42. leg. y el arco, b c, 44. gra. 19. min. 19. legundos. Y el arco, ce, acabamos de conocer, que es 45. gra. 26. min. luego todo el arco, a b c e, es 177. gra. 4. min menor que medio circulo: luego el centro del ecentrico, a b c h, está fuera del semento, a b c e. Sea el punto, f, por el qual y el centro del mundo, d, se tire, h f, d K, y sera el Auge del ecentrico en el punto, hatirese, fg, perpendicular sobre, a e, la linea, a e, co mo caerda del arco, a b e, es 199916 segun que el dimeciente es, 200000. y su mitad, e g, es 99958. la linea, d e, era-72350. partes de las que, c e, era 54731.pero de las que, c e, es 77251.como cuerda del arco, c e, fera, d e, 102119. La mitad de la linea, a e, que es, e g, era 99958. partes de las quales restadas de 102119. que es la linea, de, quedarân. 2161, que es la linea d g. El arco, a b c e, es menor que semicirculo, 2. gra. 56. min. la mitad destos es, 1. gra. 28. minu, y su seno recto es la linea, f g que siendo el seno rodo 100000. fera, f g, 2559. En el triangulo rectangulo, d g f, estan conocidos los lados que comprehenden el angulo recto, conviene a faber, d g, 2161. fg, 2559. luego por la 47. del primero de Euclid. sera conocido el lado, fd, que sera, 3349. partes de las que el semidiametro del ecentrico tiene 100000. y tanto es la ecentricidad del Sol.

Para saber el angulo, h de, se procede assi, quando, f d, es 3349. fg. es 2559, pero quando, f d, lado opuesto al angulo recto, suere 100000. sera fg. 76410. y tanto es el seno recto del angulo, f d g, que por la tabla de senos es, 49. gra. 50. min. Teniamos que el arco, c e, era 45. grad. 26. minut. luego todo el arco, c e h, es 95. grad. 16. minut. y siendo el punto, c, principio de Aries, el punto, h, estara en 5. grad. 16. minut. de Cancer, donde

sera el Apogeo del Sol.

Otras muchas obferuaciones se hizieron, y en todas ellas siempre el Apogeo del Sol vino a caer algo mas, o menos de los 7. grad. de Cancer, y las mas observaciones dieron el Apogeo, en menos de siete grados de Cancer, hechas por diferentes lugares del Sol, por lo qual me parecio, que en el tiempo de aora se deve de poner el Apogeo del Sol, en 7. grados de Cancer, y la ecentricidad en las observaciones, ha sido en la primera observacion, 331. partes: en la segunda, 333. en la tercera, 335. de

las que el semidiametro del ecetrico tiene, 10000, y assime parece, que tomaremos por la ecentricidad, las 333, partes, que son medio entre las

ecentricidades de las otras observaciones.

Segun las hypoteses de Copernico, el Auge del Sol estaua el año de 90. en 9. grados y 8. minutos de Cancer, lo qual es impossible, segun que por las observaciones se puede provar. Tambien la ecentricidad del Sol, segun Copernico, era este año de 1590. 322, partes, de las que el semi diametro del ecentrico tiene 10000, que es menor de la que se halla por la observacion.

De manera que fegun Copernico, el Auge del Sol va mas adelante de lo que realmente està, y la ecentricidad es menor, como queda demostra do, segun las observaciones. De donde se sigue, que el movimiento del Sol, segun Copernico, no concuerda con la observacion, como mas lar-

go lo demostraremos en nuestras Teoricas.

Pues que tenemos affentado, que la ecentricidad del Sol es 333, partes, de las que el femidiametro del ecentrico tiene 10000 de las que tu-

uiere 60 sera vna parte 59 minutos de consecucione a

Cacentricided Lilled

En tiempo de Ptolomeo, esta ecentricidad sue dos partes y media de las que el semidiametro del ecentrico tiene 60. El Rey don Alonso halló la ecentricidad del Sol dos partes, y 16. de las que el semidiametro del ecentrico tiene 60. Pues por esta variedad, las tablas de Equació no pueden ser perpetuas, sino que para cada ecentricidad es necessario que se haga tabla de Equacion: aunque esto quiso remediar Erasmo Reynoldo, en las tablas Prutenicas, poniendo limite en la ecentricidad, que no puede ser mayor de la que hallo Ptolomeo, ni menor de 231. partes de las que el semidiametro del ecentrico tiene 10000, pero las observacio» nes no corresponden con su dotrina Por lo qual sera necessario, hazertabla de Equacion, segun la ecentricidad que aora se balla, para que el mouimiento del Sol salga con mas correccion: porque por la dotrina de Copernico, el año de 1388 la entrada del Sol en Aries, fue 9. horas mas tarde que se hallò por la observacion : y en algun tiempo del año está el Sol con mas de 28. minutos de error, como lo podra ver el que con diligencia hiziere observacion dello.

En la dotrina de don Alonso, tambien anda el mouimiéto del Sol muy errado, porque la entrada del Sol en Aries, el mismo año de 1588, sue cafi nueve horas antes, que parece por la observacion: y en este año de 1600, sue poco mas de 6. horas. Porque aqui no es lugar propio para aueriguar la causa destas variedades del lugar del Sol, se queda para puestras. Teoricas, donde se demuestra la razon de todo. Por aora se hizo la tabla de Equacion, segun la ecentricidad que auemos hallado, por la

qual se hallarà el lugar del Sol en cada vn dia, y por el, su declinacion; y con esto se formarán las tablas de

declinacion para los Pilotos.

Siguense las tablas de Equacion del Sol, segun que la ecentricidad es. 33 3 partes de las que el semidiametro del ecentricosticne. 10000.

	Sig.	0	Sig.		Sig.	2	1
	R	A	R	A	R	A	
-	Aquaccion	Difer.	Aquaccion	Difer.	Aquaccion	Difer.	
G	G M S	MIS	GMIS	MS	GMS	MIS	
0	00 00 00 I 57	1 57	55 38 57 19	1 41	1 37 30	1 1	30
2	3 53		1 58 59	1 39	1 39 30	59	29
3	5 49	1 55	1 00 38	1 38	1 40 28	58	27
3	7 44 9 40	1 56	1 2 16	1 37	I 41 24 I 42 18	56	26
6. 7	11 35	1 55	I 5 29	1 35	1 43 10 1 44 00	52	24
8	15 26	1 55	1 2 38	I 33	1 44 48	48	22
9	- 7 21	1 55	1 10 11	1 32	1 45 35	- 47	21
10	19 16	1 1	1 11 43	1 31	1 46 20	45	19
12	23 04 24 57	I 53	1 14 43	1 28	I 47 44 18 23	39	18
14	26 50 28 43		1 7 38	I 16	1 49 1 1 49 37	38 36	i6
16	30 35	1 52	1 20 29	1 23	1 50 11	34	14 13
18	34 18		1 23 13 1 24 33	1 20	1 51 38	2 9	12
20	37 59 39 48	1 49	1 25 51	I 17 I 15	I 52 3 I 52 26	25	10
22	41 37	1 48	1 28 23	1 14	1 52 47	23	9 8
23	43 25	I 47	1 29 37	1 12	1 53 7	20	7
24	45 12	1 1 7	1 30 49	I 10	I 53 25 I 53 4:	18	6
26	48 44	1	1 33 10	1 8	1 53 54	13	4
27	50 29	1 44	1 34 18	1 6	1 54 5	11	3
28	52 13	1 42	1 35 24	I 4 1 2	1 54 14	8	2 I
30	-155 38		1 7 30	I	1 14 27	5	G
	A	R	A	R	A	R	
	II		10	-	· 9)	Tabla

TABLA DE EQVACION DEL SOL

ĩ		1	Sig.	D L	3	·		Sig.		4		5	ig.		5		
		-	R	-	A.	R		R		R			R	_	R		
ı		Æg	uacci	ien	Dif	er.	Æq	uacc	ion	Dife	er.	Æq	uacci	ion	Dife	r.	
ı	G	G	M	S	M	S	G	M	S	M	S	G	M	<u></u>]	M	S	
Re					-	- 2		40	48	 1	58		58	56	-	46	30
ne	0	1	54	27		1	1	39	50		00	_	57	10	1	47	29
	2	1	54	30	9	1	Ţ	38	50 48		-		55 55	23 34	1	49	28
	3	I	54	29		3		37	 —	-	2	-	SI	44	-	51	26
	4 5	ī	54	26		5	1	36	4 4 38	1	6		49	53	I	52	25
	6	1	54	14		9	1	34	29	1.	9		48	1	1	53	24
	7	1	54	5	_	12	1	33	18	1	11	-	46	8	1	53	23
	8	1	53	39		14	1	32	50	1	13		44	15	1	54	22
	9	1	53	22		19	1	29	34	1	16	1	40	26	1	56	20
	10 11	1	53	3		21	1	28	17	I	17	-	38	30	1	57	19
	12	· I	52	42		22	1	26	38	1 1	19	1	36	33		58	18
	13	-	52	56	-	26		24	16	- 	22	-	32	36	-	59	16
	14	1	51	30	1	38	i	22	53	I	23		30	37		00	15
	16	1	5i	2		30	1	21	28	1	25		28	37		00	14
	17	1	50	32		33	1	18	34	-	28	-	24	37		1	12
	18 19	I	49	14		35	1	17	5	1	29		22	36	š	2	11
	20	1	48	137	-	39	I	115	34	1	3 I		20	34		2 2	10
	2 1	1	47	58		41	1	14	-	1	33	-	116	32	2	-	8
	22	1	47 46	27 44	- 1	43	1	12	48	1	35		14	27		3	7
	23		45	59	-	47	1	9	9	1,	1	-	12	24		3	6
	25	I	45		_	49	1	7	28	1	41	-	10	2 1	•	4	5
	26	1	44			53	I	5	47	1	141		8	17		4	3
	27	,	43	32	-	55	1	2	23	-	42	-	4	1 5	2	4	2
	28	1	42	39	1	56	1	.00	40	1	43		2	5	1	-	1
	30	I	40	48	3	1	ī	58	56	1	44	_	100	00		-	G
	-	-	-1-	A	R	A		A			A	-	A			A	-
		-		8	-		-		7				(5			
	1 —		-			-										V	ſò.

Equation de Tichen le

Regimiento de Nauegacion. Vío de la Tabla precedente.

Vando se quiere saber la equacion que ay entre la linea de medio monimiento y verdadero del Sol, en qualquiera parte del Zodiaco, se restarà lo que ay del principio de Aries hasta el Auge del Sol, de su medio monimiento, contado del principio de Aries: y si fuere mayor el Auge que el medio mouimieto, se añadirá al medio moulmiento doze signos, y lo que quedare sera el argumento del Sol, con el qual entrarè en la tabla. Y fi el argumento fuere menos que seys signos, tomarse han los signos en la cabeça de la tabla: y los grados en la primera colúna de la mano yzquierda. Si fuere mas que seys signos, se tomaràn en el pie de la tabla; y los grados en la pri mera coluna de la mano derecha: y en el angulo comú fe hallara la equacio, la qual se restará del medio movimiero del Sol, si su argumero sucre menos que seys signos: pero si el argumento fuere mas que seys signos, se añadirà al medio monimiento, como los titulos de las letras lo muese tran.La, A, dize que se añada.la, R, que se reste. Y si en el argumento huviere algunos minutos mas que grados, se tomará de la diferencia que està enfrente de la equacion, la parte proporcional, segun fueren los minutos : la qual parte proporcional se anadirà a la equacion, o se quitarà, fegun que los titulos lo muestran. Pongamos vn exemplo, Sea el medio mouimiento del Sol, 5. signos, 13. grados, 15. minutos; del qual restando el Auge del Sol, que es, 3. signos, 7. grados, quedaran dos signos, 6. grados,15. minutos. Pues tomando en la cabeça de la tabla los dos fignos, y en la coluna de la maño yzquierda los feys grados, en el angulo comun estan vn grado, 43, minutos, 10. segundos: y porque ay 15. minutos mas que grados, se tomarà de los so segundos, que es la diferencia entre, 6. y 7. grados, la parte proporcional, diziendo : Si 60. minutos dan 51. fegundos, quedarán 17. minutos: y figuiendo la regla, feràn 12. fegundos: pues añadire los 12. segundos a la equacion que se hállo, porque va creciendo;y ferá 1.grado,43.minutos,22. fegundos : la qual equación fe restará del medio monimiento, por ser el argumento menos que 6. signos, y quedarân 5. signos, y 11. grados, 31. minutos, 28. segundos, y tanto seria el verdadero monimiento del Solen el Zodiaco, contado de principio de Aries.

Otro exemplo, pongamos que el medio monimiento del Sol era dos fignos, 20. grados, 20. ininutos, restense 3. signos, 7. grados, que es el Auge del Sol: y porque es mayor el Auge que el medio monimiento, se le añadiran 12. signos al medio monimieto: y de toda la suma restando el Auge, quedan 11. signos, 13. grados, 20. minutos. Y porque los onze signos elta en el pie de la tabla, se tomaràn los 20. grados en la primera coluna de la mano derecha, y en el angulo comú se hallarán 19. minutos, 16. segudos, y la diferencia que ay entre veynte grados, y 21. son 1. minuto. 55. segundos, de la qual diferencia se tomarà la parte proporcional que cabe a los 20. minutos, que eran mas que los grados, respeto que 60. minutos

Regimiento de Nauegacion.

dan vn minuto, 55. segundos, y sera 38. segundos; los quales se restarán de los 19. minutos y 16. segundos, porque va menguando la equacion, y quedará 18. minutos, 38. segundos, y estos añadire al medio mouimiento, y quedara el verdadero lugar del Sol, en dos signos y 20. grados, 38. minutos, 38. segundos.

La rayz, o medio mouimiento del Sol, que se ha de tomar para calcular por esta tabla, está puesta para el Meridiano de Lisboa, y al medio dia del postrero de Diziembre del año de 1584. Es la rayz, 9. signos, 10. grados, 1. minuto, 8. segundos.

El medio mouimiento del Solfe podra buscar por las tablas del Rey don Alonso, que es el mas verdadero y cierto, segun que lo mostrare-

mos en nuestras Teoricas.

Pues desta suerte, mediante esta tabla, teniendo las tablas del medio mouimiento del Sol, que no pongo aqui por enitar prolixidad, se podra hallar su verdadero lugar. Pero por quitar deste trabajo a los que no quieren tanto exercicio de numeros, se hizo la siguiente tabla, para que cada dia puedan saber muy precisamente el lugar del Sol, lo qual es de mucha importancia, principalmente para los que nauega, que es el principal fundamento con que se pusieron estas observaciones, y lo demas que por ellas se ha demostrado, porque sabido el verdadero lugar del Sol, se sabe su declinacion, y por ella la altura del Polo, si se tomò bien la altura del Sol sobre el Orizonte.

Tabla

Regimiento de Nauegacion. 21
1534 Binahli y esi le Salta undia a Febrero y disjournete mêle lumpses
Tabla del verdadero vousmiento del Sol. Sejmenty von altre di un din
mainis la Aprilis. | Maius. Iunios. | ad Carle

Dies	I	inua	rius.	Fe	brua	rius	IN	Aart	ius.	1.	Apr	lis.	<u> </u>	Mai	us.]	unit	15.
es me	1-	78		-	(N)	-	-	×		-		/	-	8	*		TI	[
menfis.	G	M	S	G	M	S	G	M	; 5		[M	13	G	\overline{M}	S	G	M	S
1 2	10	22	12	11	54	15	10	6	45	10	52	11	10	8	1 6	9 10	57	29
1-	-	-	-	-	-	3	-	1 6	-	-	21	-	11	-	-		54	56
3 4	13	24	35	113	55	36	13	6	47	13	50	8	13	4 2	8	12	52 49	45
5	14	26	54	15	57 58	6	14	6	41 35	14	47	53	14	58	8	13	47	10
7 8	16	29	10	17	58	46	16	6	26	16	45	37	15	56	1 57	15	41	52
9 10	18	31	28	20	00	I 35	18	6	I 41	18	43	11	17	51	58	17	36	32
11112	20 2 I	33	42	22	I	9	20	5	26	20	39	37	19	47	134	19	31	72
13	22	55	55	24	2 2	12	22	5 4	2 42	22	38 36	55	2 I 22	43	9 57	21	2;	49
15	24	38	6	26	3	10	24	4	18	124	34	4	23	38	40	23	20	25
16	26	39	14	128	3		26	13	44	25	33	35.	25	34	23	25	14	5%
18	27	41	18	29	4	19	27	2	43	27	130	134	26	31	47	26	12	14
19	28 29	42.,	19	X	5	37	28	2 I	15	28	29	00	27 28	29	6	27	9	30
21	₩ 1	44	19	2	5	27 43	V I	1 00	6 28	IA	25	47	29 []	24	42	29	4	1 15
23	2	46	18	4 5	6	1 13	1 2	59 59	48	2	22	29	1 2	19	55	CO 1	58	30
25	4 5	48	13.	6	6	23.	3 +	58	20	4	19	2 27.	3	15	3 36	2	52	58
27	6	50	3	8.	6	38	5.	56	46 54	6	15	18 39	5	10	7	4 5	47	27
29	8	5.I 5.2	46	-	-		7.8	55	I 8	8	11	38	7 8	5 2	6	6	41	56
31		53.1	-1	-	-j	-	9	53	15	-	-	-	9	00	3	-	-	-
13-1			-						-				D	3	r	A B	L A	

Tabla del verdadero monimiento del Sol.

U	Iu	lius	. 1	Aug	gustu	s. S	epto	mb	er.	O	tobe	r.	N	oue	mbe	r.	Dez	mb	er.
ies mentis.		9			क्र	1		净			<u>~</u>	.:		7	η		1	X	
nfis.	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S		3 1	M	S	G	M	S
I 2	8 9	36 33	20 38	8 9	13	34	8 9	5 4	57	7 8	25 25	5 I 2	8	1	15	44 55	8 9	33	15
3 4	10	30 28	42	10	8 6	37 9	10	2 00	25 41	9	24	13	1	11	16 16	9 24	10	35	7
5	13	25 22	20 35	12	3	44	1 I 12	59 57	20	11	22	4. I	1 2	12	16 17	4 ² 2	13	37 38	7 6
7 8	14	19	50	13	58 56	55 31	13	55 54	41 5	13		1 5	3	14	17 17	24 47	14	39 40	5 7
9 10	16 17	14	² 0	15 16	54 51	8 47	15	52 50	30 57	15	. 6	1 -	1	16	18	36	17	41 42	1
I 1 12	18	8	59 7	17	49 47	28	17 18	49 47	² 7 58	17			- 1	18	19	5 33	18		1
13	20 21	3 00	24	1		52 37	19	46	10		1	1 -		20	20	34	21	177	
15	2 I 2 2	57 55	59		1 40	6	21	43 42	40		1 -/		6	22 23	2 I	6 40	22	-47	
17			35		1 4/	53 48	23	40	59 42		1	. 1 -	8	24 25	22	16 55	1		
19	1		1	1		42 30	1 -		1 '				6	26 27	23	33		1 -	
2.1	1 6		1 /			1 .	1 %			2 1 2			13	28 29	24 25	38 43	1	1 7	
2.	1 -		1 "	8 2		1 /	1 -			² 14	9 1	71	6	Z I	26 27	1 0		57	*2
2 9		31		1	19		-	3			1 -	7	8	3	28 28	5	4	55	
2:		20		. 1	I			2 2					17	4 5	30	1		2	37
29		2	/	6 6		3	5 6	2 2	/ I -	7	2	7	21	6	3:		0 8	3 4	57
3	7	1	6 1	5 7	7	4	5			7	7	15	35				19	6	7

Regimiento de Nauegacion.

TABLADE EQVACION DELSOL.

1						. 1	-	1112	: :			
	Anni	G	M	S	T			Anni	G	M	S	T
	1585		48	20	33			1617	1	1	17	2.1
				31				-		46	27	54
В	1588		16	52	33		В	1619		3 I 16	38	2 I 54
	1589		48	Ìz	39	l	-	1621	I	3	9	27
	1590		33	23	12			1622		48	20	00
В	1591		19	33	29		В	1623		33	30	37
-			3.				-	-			41	-
	1593		35	15	45			1625	1	50	, 1 #2	33
	1595		20	25	45			1627		35	2.2	33
В	1596		5	36	18		В	1628		20	33	29
	1597		5 I 37	56	5 I 24			1629	1	52	53	3.9
					_					*********		-
В	1599		7	17	51 24		В	193 I 1632		37	25	39 35
-	1601		53	48	57		7	1633	1	8	45	45
	1602	-	38	59	30			1634		53.	56	18
В	1603 1604		24 9	20	30		В	1635		39	17	45 41
-	1605			-				1637	1 I	10	-	51
	1606		40	41 51	36			1638		55	37 48	24
	1607	-	26	2	3			1639		30	58.	51
B.	1608		1,I	12	36	1	B	1640		25	9	47
	1609		57 42	33 43	9 42			1641	1	57	29 40	57 39
	1611			54				1643		3,2	50	7
В	1612		27 13	4	9 42		В	1644		2.7	1	57 53
-	1613		59	25	15		-	1645	1	14	22	36
	1614		44	35	48			1646		59	32	36
l B	1615		29	46 56	15		В	1647		34 28	43	3 59
101	3010		3-9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7				D 4		VG	

D 4

Regimiento de Nauegacion. Vío de la Tabla precedente.

Omefe el dia del mes que se quissere saber en que grado de signo anda el Sol, en la primera coluna de la mano yzquierda, y el mes en la cabeça de la tabla; y en el angulo comun se hallará el grado y minuto, el año de 1584, que es para quando se calculò la tabla. Pero para otro qualquiera año es necessario, que se haga equacion, y se le añada: la qual se hallará en la tabla de atras, enfrente del año para quando se busca. Como queriendo saber en que grado de signo está el Sol el año de 1606. en 13. de Abril: tomando los 13. de Abrilen la primera coluna de 1606. en 13. de Abril en la cabeça; en el angulo comun estan 22. grados, 38. minut. 55. segundos de Aries: y en la tabla de equacion, enfrete del año de 1606. estan 40. minut. 51. segundo 36. terecros, los quales se añadiran a los. 22. grados, 38. minut. 55. segundo y seran 23. grad. 19. min. 50. segund. 36. terecros: y en tantos de Aries esta el Sol en 13. de Abril al medio dia, el año de 1606.

Es de aduertir, que si fuere año de Bisselto, se ha de obrar por el dia siguiente, desde 28. de Hebrero adelante; como queriendo saber el grado en que está el Sol en 29. de Hebrero, lo mirarê por el primer dia de Mar-

co, figuiendo la regla que se ha dado.

Estatabla no es perpetua, ni puede seruir mas de para vina edad, porque se muda la ecentricidad y apogeo del Sol, y la cantidad del año, y qualquiera destas causas haze variacion, aunque esto es por buen espa-

cio de tiempo.

Si se quissere estender esta tabla de equacion por mas años, se hara có añadir vn minuto,52. segund.6, terceros, que es lo que anda el Sol en 44, minutos de hora, que se dan en quatro años a la cantidad del año, mayor de lo que es, a qualquiera año de spues de Bissesto: como añadiendo vn minuto,52. segund.6. terceros, a vn grado, 5 minut. 1. segund. 33. tercer. que estan enfrente del año de 1625, que es primero despues de Bissesto, seran vn grado,6 minut. 53. segund. 39. tercer. y esta sera la equacion que se pondra el año de 1629, que es primero despues de Bissesto: y assi se procedera en los demas. Y si el año de 1626. se le añadiere vn minut. 52. segund.6. tercer. haran 52. minut. 4. segund.12. terceros, que sera la equacion del año de 1630. De suerte que sempre se han de añadir el yn min. 52. segund.6. tercer. a los años que se siguen despues del Bissesto.

Siguense las tablas de la declinacion del Sol, que van por los dias del año, en los quatro años que ay de vn Bisiesto a otro.

Tabla de la declinacion del Sol para el año de 1600. Bisextil.

Dias	Е	nero	. 1	Fe	brer	0.	IV	larç	·	. A	bril	•	Ā	Aayo). I	,1	unio	.]
S	G	M	S	G	M	S	Ġ	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S
I 2	23	3 58	6	17 16	12 55	28	7 6	21	43	04	44 7	14	15	12 30	44	2 ½ 2 2	7	20 II
3 4	22	52 45	35 39	16 16	37	36 15	6	35	55 49	.55	30.	16	15	.48	16 35	22	22	54 53
5	24	40	17	16 15	2 43	2 4 48	5	49 26	41	6	38	43	16 16	22 39	46 37	22	36	² 7
7 8	22	26 18	3	15	25	27 39	5 4	3	15	7	00	57 13	16	56 12	,12 3 I	22	48	29
9	22	9	49	14	47	39 26	4 3	16 53	20	7 8	45	2.9 36	17 17	28 44	28 27	22	59	2 42
111	2 I 2 I	52 42	26 56	14.	8 49	5 ² 7	3	29 5	37 52	8	29 51	23 39	, 17 13	59	37 45	23		56 44
13	2 I 2 I	33	4 46	13	28	43 57	2 2	42 18	17	9	13. 34.	-	18	29 44	33	23	15	14
15	2 I 2 I	12 00	2 .55	12	48	33	1	55 31	22	9	56 17	5 57	18 19	58	16 9	23	20	26 9
17		1	26	11	46 25	9 00	00 i	7 43	5 7 53	10	38 59	26	19	38	40	2 3 2 3	24	55 18
19	1	1 1	4 28	13	1 2	34	00 S	20	24	11	20 40	35	19 20	51	48 21	23	27	18
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. /	1	1	ł	20	21	00	26 50	53 28	12	00 2 I	56	20	16 28	43	23	27	58
2 2 2 2 2		1		9	36	29	I	14 37	5 35	12	41	3 47	20	40	00	23	27	3
25			27		52 29	5 40	2 2	1 24	8 36	13	39	35	2 I	2	20	1 -	2.4	32
27					7	8 28	2 3	48	1 25	13	58	43	2 I	32	29	23	17	12 2.5
29	1	1	58				3	34 58	45	14	36 54	9	2 I 2 I	41	,35	13	4	
3	1 17	7 29) 16	5			4	2 I	9				2.1	59	9		- Carren	

Año de 1600. Bisextil. Al meridiano de Lisboa.

Dias	1	lulio		P	gol	ło.	Sei	iem	bre.	1	Otul	ore.	N	uie	nbre	Dez	ziem	bre.
äs.	G	I.M	IS	G	M	S	G	M	S	G	IN	1 S	G	M	S	G	M	S
I 2	23	-1	48		1 -	1	8 7	8	5	3	3		- 1	1 -		21	55	44
3 4	22	57			1	47		2 / I	4 4	9 4	9	3 7	15	1 ′	1 ''	22	13	3
5 6	22	46			())		6	39		5	5	- L	1 1	1 '		22	35	36 40
7 8	22	34	36	16	1	17	5	31	1	1 -	4 5	4,	1 /	1	1 -	22	42 48	²⁵ 37
9	22	20	45 16	15	45	00	5	9 46	9	6	28	1 '		1	54	22	54 59	27 50
I 1 12	2 1 2 I	5 56	10	15	10 52	30 24	4	23	26		30		1 ′	36		23	4 9	43
13 14	2 I 2 I	48 39	21	14	33	53 29	3	37 14	28	6	58	1	1 0	8 24	24	23	13	35
15 16	2 I 2 I	2 9	51 54	13	56 37	50 52	2	5 I 27	10	8	43	49	1 0	39 54	50	23	19	39
17 18	21	9 59	54	13	18 59	39 12	2	4 41	47	9	27 49			23	30	23	24	16 57
19	20	48	34	12	39 19	35 47	1	17 54	4 ² 3 ²	10	33	35	19	37 51	46 2 3	23 23	27	6 44
2 I 2 2	20	25	42 54	11	59 39	44	V 4	31 7	32 46	10	54	33	20	4	·3 5 30	23	27 27	58 45
23	20 I9	1 49	38	11	18	30	M	15 39	48	11	36 57	56 51	20	30 42	3	23 23	27	50
25 26	19	36	11 55	10	37 16	47 53	I	2 2 5	42 49	12	18 39	35 9	20	55 5	50 00	23	24	6 58
27 28	19 18	9 55	22 28	9	55	48	1 2	49	25	12	59 19	32 41	2 J 2 J	16 26	34	23	19	19
29	18	41 26		9	13	- 3	2	26 59	31 53	13	39 59	37	2 I 2 I	36 46	47	23	8	45
31	18	J2	00	8	29	8				14	18	49				23	5	23

24

Tabla de la declinación del Sol para el año primero despues del Bisexto. 1601.

Dias	En	ero.		Fe	brei		M	arço	. 1	1	\ bı	il.	1	M	ayo.		1	unio	٥,	
as	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G,	N	1	S	G	M	S	G	M	S	
1 2	22	59 53	17 53	16	59 42	20	7 7	26 3	45	4 5	3 2	9	31	15	9 27	16	22	5	1	13
3 4	22	48	2 40	16 16	24	19 16	6	40 17	59 54	5		5	28	16	2	54 20	22	28		15
5	22	35	00 47	15	48 29	11 43	5	54 31	45 32	6	3	33	2 44	16 16	19 36	32	22	1 -		27
78	22	20	6	15	11	00	5	8 44	56	1.		18	16 52	16	·53	2 15	22	1		00
9	21	3 54	34	14	32	48	4 3	58	6	8	- 1	40	57 36		25 41	33	1	1 1	- 1	52
11 12	2 I 2 I	45	13	13	53		3	34	1		1	25	5	18	56					7
13	21	25	35	13	1 -	1 1	2	47	1	1 .		30	20	. 1 -		2	2		4 7	39
15	21	3 52	58		52	34		36		1 -	3	'5 I			1	3		1	2	3C 45
17	20	40 28	4	11	1 - 7	49	1	12 49	1 /	.>	10	34 55		11 6	5			-	6	36
20	1	1 1	20	1	1 .	5:	1	2 I		2 1	11	36	.1 2		i	9 2	- 1		7	46
2 1 2 2	1 -	1	8 2	3 10		22	1	4	3 1	フレ	11	17	1 .	- 1	2	6 .1		-	27	45
23		1	5	1 -	4	1	1.3	1 -		10	12	37 50	<i>~</i> 1	7. 2	1	8: 9 7	- 1	- 1	27 26	12 IO
25				9 8 8	3.	1	2	1 .		10	13	3	(*	5 2	1		01	1	2.	55
25			1	8 7	4	1	9 3	1 /	: 1	45 34	13		1		- 1		29	2.3.	2 (18	40
30		1 -		3			3	1	- 1	54 12	14	-	- (2. 2	i	48	57	23	14	1 -
3	1 1	7 1	6 [19			-	+	16	24	,	_	1	-	1	57	26			

Primero despues del Bissesto.

Dias	1	Iulio).	A	goft	٥.	Set	iemb	re.	0	tubr	e.	No	niem	bre	Dez	ziem	bre.
Z/s	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S
1 2	2 3	1 /	33	17 17	59 44	4.I 20	8	12	21	13	18	24	14	33 52	51	21	53	32 32
3 4	22	1	,	17	28	33 48	7	28	25	4 4	5 28	26	15	30	47	22	11	45
5	22	1 "		16	56 40	35 47	6	44	33	4 5	51	1	15		39 46	22	26 34	54
7 8	22	1 //	0	16 16	6	29 26	.5	59 36	23	5	37		16		35	22	41 47	13
9	22	1	1	15	49 31	4 39	5 4	13 50	40 54	6	23		16	5 9	19	22	53 58	
11	i .	58	33	15 14	13 55	52 51	4	28	4	7 7	9 31	3 42	17	3 ²	55 14	23	0	34
13	1	49	53 58	14	37 19	35	3	42 18	10 55	7 8	54		18	5 . 2 1	17	23	12	40
15 16	2 I 2 I	31	36 52	14	20 41	30	2 2	55 32	49	8	38	54	19	36. 51	54 58	23	19	38
17 18	2 I 2 I	11	47	13 13	22	20 52	î 'I	9 46	4	9	23 45	8	19	6	7.28	23	23	43
19	20	50 39	35	12 12	43 23	26 35	T	22 59	42	10	.6 28	5 1	20	34	33	2.3	26	"))
2 I 2 2	20	27 16	5 ²	12 11	3 43	36 16		35 12	35	11	49	53	20	1	33 31		27	56
23 24	20 19	3 51	54 19	11	23 2	5 34	M	34	00	11	32 53	35	20	39	3	23	27	8
25 26	19	38	32 23	10	41	5 1 58	1	57	55	12	14 34	3 41	2 I 2 I	51	9	23	24	35
27 28	19	11 58	56	9	59 38	54 41	: I 2	44	30 47	12	55	16	2 I 2 I	13	38 13	23	20	3 5
30	18	43	25 30	9	17 55	12 48	2 2	31 55	39 1	13	3 5 5 5	13	2 I 2 I	34 44	26 9	23	13	38
31	18	14	42	8	34	10				14	14	32				23	5	22
	-									-							Di	

Dias

Regimiento de Nauegacion.

SEGVNDO DESPVES DEL BISTESTO.

	1	Ener	0.	H	cbre	ro.	. A	Março. Abril. Mayo. da Junio										
	G	M	S	\overline{G}	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	ı.S	G	M	S
1 2	23	55	32	17	3 46	33	7	32	34	4	\$3	39	15	22	40	22	3	47
3 4	22	49	22 23	16	28	35	6	46		. 5	29	34	15	40	.6 53	22	19 26	24 30
5	22	36	47	15	52 34	38	6	38	3 12	6	5 28	4.	16	15 32	8	22	33	25 50
7 8	22	21	59	15	15	43	5 4	14	36	6 7	50	35	16	48	4	22	45	57 31
9	22	5 56	38	14	37 18	6	4	² 7	20 56	7	35	33	17	2 I ;7	13	22	1.	50
1 I I 2	2 I. 2 I	47	28 47	13.	58 38	37	3	16	28 49	8	19	38	17	52 7	46	23	6	6 9
13	21	27	43	13	19	18		5-3	9	9	3 24	44	18	2.3	00 40		13	50
1.5	2.I 20	6 54	14 54	12	37	36 56	2 I	5 42	58	10	46	4 46	18	51	53	23	19	49
17	20	43 3i	10	11	56 35	00	·(I	18 55	43	10	29 49	00 54	19	19 313	41	2.3	24	45
19	20	18	35 39	11	13	44	- i	31	2 I 42	1,1 1,1	31	44	19	46 58	5 1	23	26	54
2 I 2 2	19	5 ² 38	24 48	10	30	34 46	M	39	57 37	11	5 I 12	47	20	1,1	12	23	37 87	59 52
23	19	10	48	9	46	48		3 26	00 47	12	32	54	20	:4 4,5	53	23	² 7 26	24
25 26	18	55 40	36	9	2 40	34		50	30	13	31	32	20	57.	17 53	2 3	24	30
27 28	18	25	13	8 7	17 55	43	3	37	19	13	49	57	21	18	57.	23	18	28
29	17	53 37	30		. 1		3	47	3	14	² 7 46	48	2 I 2 I	37	31,38	23	15	4.0
31	17	20	27	1			4	10	35				21	155	2	1		-
-			-	-			-						Ě	-		Dias		

Regimiento de Nauegacion.

SEGVNDO DESPVES DEL BISIESTO.

Dias.	1	ulio		A	goffe	72 1	Seti	eml	ore.	C	tubr	c.	Noi	niem	bre.	Dez	iem	bre.
as,	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S	G	M	S
I 2	23	8 4	37.	18	48	33	8 7	56	56	3	12 35	35	14	29 48	3 3 I	21	51 60	71. 25
3 4	22	59 54	50 44	17 17	32	49	7	34	00 51	3 4	59 22	10 26	15.	7 25	8 51	22	9 17	6 24
5 6	22	49 43	30	17 16	00: 44	50 23	6	49	34	4	8	35 46	15	44	00	22	25 32	4 24
7 8	22	37 3 0	27 56	16	27 10	58 54	5	42	49	5	3 I 54	46 51	16	37	13 48	22	39 45	18 46
9 10	22	23	55 32	15	53 36	35	5 4	i9 56	30 4 0	6	17 40	48	16	55 11	5 20	22	5 1 57	46 7
11	22	8	44 33	15	18	16	4	33	58	フク	3 26	3	17	28 45	49 16	23	7	27 17
13	21	5 ² 43	10	14	46	26 51	3	47	54 49	7 8	48	33	18	17	23	23	11	20
15	2 I 2 I	34 24	3 29	14	\$ 46	12 24	3:	38	42 3 I	8	33	32	18	32 47	38 48	23	18	00
17	21	14	27 5	13	² 7	15	2 1	15 5 1	12 54	9	17 39	43 41	19	17	38 7	23	23 25	2·1 13
19 20	20	53	34 18	i2 12	48 30	12 44	1	28	31	10	1 23	30 8	19	31 44	34 59	23	26 27	36 32
2 I 2 Z	20	30 19	54	12 11	9 48	36 39		41 18	46	10	44	3 § 5 6	19	58	24	23	127	58
23	20	7 54	5 39	11	28	17 48	M	28	30	11	27 48	8	20	24 36	21	23 23	27 26	18 29
25 26	19	41 28	53 46	10	47 26	7	1	5 I 15	58 25	12	8 29	58 37	20	48 59	16 48	23	25	00 4
27 28	19	15	29 40	10	5 44	20	2	38	54 18	12	50 10	16	21	10 2.1	35 38	23	20 17	41 50
29°	18	47 33	36	9	22 I	46	2 2	25 49	42	13	30	19	2 I 2 I	31 42	38	23	14	32 46
31	18	18	39	8	39	38				14	9	4 6				23	6. Di	34

Regimiento de Nauegacion. 26

TERCERO DESPVES DEL BISIESTO.

Dias	E	nero).	Fe	brer	0.	· N	Aarç	7.	A	bril	.	1	Nayo),	Iunio.			
	G	M	S	G	M	S	G	M	S	\overline{G}	M	S	G	M	S	G	M	5	
2	23	1 56	45	17	7 50	41 28	7 7	38 15	f00:	4	² 7 50	52	14	59 18	57	22	9	38	
3	22	50 44	58	16 16	32	57 14	6	52 29	10 2 I	5	13 36	35 48	15	35 53	50	22	17	26	
6	22	38	20	15	57 38	46	6 5	43	6	5	59	35	16 16	10 27	45	27	-38	46	
7 8	22	23 16	58 9	15	20	10	5	19 56	52	6 7	44	54	16 17	44	31	22	44 50	26	
9 10	2 1	58	43 58	14	22	14 53	4	33	10 46	7 7	51	44 56	17 17	17 33	13	23	55	29	
11	2 I	49	47	14	43	32	3	46 2 t	17 41	8	14 36	2	17 18	48	9.	23	5	3 1	
13	2 I 2 :	19	43	13	3	11	2	35	29 	8	58 19:	30	18	19: 33	10 54	23	13	29	
16	21	57	43	12	22	46	2 I	48	5 I 16	9	40	3.9 23	18	4.8	26	23	19	40	
18	20	46 34 —	5	12 11	40	13	I	00	55	10	23	34	19	16 29	39	23	23	32	
19	20	8	34 47	11	19 57	32		37 13	13 35	11	26	26 7	19 19	42 55	49	23	26	31	
22	19	55 42	6	10	35	7	S	33	37 	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	46	36 52	20	20	3	23	27	53	
23	19	28 13	48	9	5 ² 30	14	1	57	16 52	12	² 7 46	50	20	32 43	2 2 3	23	27	34	
25	18	59 44	20	8	45	41	I 2	44	25 54	13	26 26	42 6	20	54	3	23	25	32	
27 18	18	13	55	8	00	38	2	31 54	26 49	13	45 5 —	13 49	2 I 2 I	25	29 28	23	19	25	
30	17 17	57 41	9				3	18	9 42	14	23	38	2 I 2 I	35	15	23	16	34	
31	17	24	34				4	4	45	A I Same	1 -		21	35	13	123			

Regimiento de Nauegacion. TERCERO DES PVES DEL BISIESTO.

1 2 Iulia Agolfo Setiembre Otubre Noniembre Deziebre																			
Dias	Iulio. Agosto.							iemb	ore.	0	tubr	c.	Not	icm	bre	Deziebre.			
1.5	GI	M	S	G	M	S	G	M	S	\overline{G}	M	S	G	M	S	G	M	S	
-		-1		-0			8			-	-6	40	14	24	2 1	21	49	7	
1 2	23	9 5	37 32	18	7 52	31	8	23 I	30	3	30	00	14	43	32	2 1	58	141	
-	-			-		-			-			18	75	- 2	30	22	6	51	
3	23	56	7	17	36	50	7	39	25	3	53 16	33	15	21	14	22	17	17	
1-					_			-	-									-	
5	22	50 45	51	17	5 48	00 45	6	32	14.	4 5	39	50 58	15	39 57	43	22	30	40	
-		4)	-						-	1-	-	-	-	-			-		
7	22	39	8	16	132	7	5	10	28	5	25	58	16	33	32	22	37	42	
8	22	32	37						-	1-	_		-		-	-	-	-	
9	22	25	42	15	58	5	5	25	35	6	34	59	16	50	54	22	156	22	
10	22	18	28	15	47	30	5	2	31	-			-	-	-	-	-		
11	22	10	150	15	23	4	4	39	40	6	57	42	17	27 41	19	23	5	58	
12	22	2	50	15	5	9	4	16	43	7	-	<u></u>	-	-	1-19	1-3	-	,,,	
13	21	54	22	14	47	00	3	53	44	7 8	42	58	17	57	35	23	10	17	
14	2.1	45	36	14	28	35	3	30	36		5	27	-	13	30	3	14	7	
15	2.1	36	31	14	10	8	3	7	32	8	27	50	18	29	1	23	17	31	
16	2.1	26	52	13	51	14	2	44	20	8	50	2	18	44	20	23	1-	28	
17	21	17	2	13	32	12	2	21	IO	9	11	58	18	58	58	2 .	22	56	
18	21	6	1 53	13	12	53	1	57	149	9	34	13	19	13	31	23	24	50	
19	20	56	14	12	53	22	1	34	30	9	56	2	19	17	1.9	23	26	17	
20	20	45	14	12	33	46	1	11	7	10	17	46	19	41	36	23	27	22	
21	120	33	135	12	1 13	153	_	1 47	42	10	1 39	17	19	55	5	23	27	51	
22	20	22	17	11	53	47		24	17	11	co	39	20	8	17	23	27	57	
23	20	10	1 25	11	33	28	M	00	150	11	21	52	, 20	21	4	123	27	35	
24	19	57	54	1	13	5		22	32	11	42	57	20	33	27	2 .	26	44	
125	19	45	13	10	52	31	1	45	00	1 12	3	48	20	44	29	23	25	24	
26	19	32	13	10	31	41	1	9	26	12	24	2 1	20	57	9	23	2-3	35	
1-	1	18	-	10	10	41	ī	32	57	12	-14	51	21	8	25	2.3	2 1	44	
18	19	10	54	9	49	31	¥	156	23	13	5	20	2.1	19	15	23	18	33	
_	-0				28		2	19	50	13	25	24	21	29	44	23	15	20	
130	18	37	19	9	6	20 51	2	42		13		15	21	39	17	23	11	40	
1-		-	-	8	-				-	14	4	56	-			23	7	42	
131	18	22	21	1 8	45	15	-	-	(14	4	, 0		-		-5		43	

CAP. V. Que enseña como se tomarà la altura del Sol sobre el Orizonte.

OLGADO El Astrolabio libremente, se alce, o abaxe la alidada, hasta que el rayo del Solentre por el agugero de la vina pinula, y dè en el agugero de la pinula contraria, y entonce la libra de la confignación de la pinula contraria, y entonce la libra de la confignación de la con

tonces la linea de la confiança de la alidada, mostrarà en la graduacion del Astrolabio, la altura que el Soltiene sobre el Orizonte. Los Pilotes no toman la altura del Sol, fino es al medio dia, porque para tomar la altura del Polo segun sus regimientos, es assi necessario: pero para los que quisieren ser curiosos, aqui enseñaremos, como fuera del medio dia se podra tomar la altura del Polo. Los Astrolabios que traen los Pilotos son pequeños, y la graduación mal ordenada, y afsi quando la alidada no corta en grado julto, toman a buen ojo la parte de grado que les parece que corta la alidada, y en esto es cosa muy facil auer error en el tomar de aquella parte, assi por ser pequeño el grado, como por estar mal hecha la graduacion. Podrianse graduar tan Artista. mente los Astrolabios, que aunque no fuessen mucho mayores de lo que son los que aora traen los Pilotos, pudiessen tomar muy precisamente la altura del Sol, y que no se guiassen por conjetura, y sin que interuenga ninguna cuenta, como en otra parte tenemos escrito, y fe dira adelante.

C A P.V I. Que enseña como se tomarà la altura del Polo.


Omada la altura del Sol al medio dia, fi las sombres de los cuerpos que estan perpendiculares sobre el Orizonte, fueren a la misma parte que es la declinación el dia de la observación, juntando el complemento

plemento de la altura, con la declinacion del Sol, ferà la altura del Polo. Pero si las sombras fueren a la parte cotraria, que es la declinación del Sol, entonces auemos de conferir la declinacion con el complemento del altura del Sol: y si el complemento y la declinación fueren vguales, el Zenit està en la Equinocial, y no ay altura de Polo: y si el complemento de la altura del Sol, y su declinación fueren defiguales, quitefe la mayor de la menor, y lo que quedare es la altura del polo, de la misma denominacion que la declinacion, si la declinacion fuere mayor que el complemento de la altura del Sol.Pero si fuere mayor el complemento que la declinacion, la altura del polo serà a la parte contraria de la declinació. Quando el Sol no tuuiere declinacion, el complemento de la altura del Solesla altura del Polo, a la parte que fueren las fombras. Si el Sol estuuiere en el Zenit, la declinacion que tuuiere es la altura del Polo, a la parte que fuere la declinacion.

Por la aguja de marear es facil conocer a la parte q van las fombras: y para que mejor fe entienda esta pratica, y los Pilotos la conferuen en la memoria, y entiendan la razon della, se pondran las reglas siguientes.

Sol y sombras a vna par te, juntar lo que falta de la altura del Sol para. 90. có su declinacion, y esto serà la altura del polo Boreal, o Meridional, segun sue re la declinacion.

Para la demostracion desta regla, sea en la figura figuiente el Meridiano, a b c d:el centro del mun-




do,e, de donde se presupone que se hazen las observaciones:

ciones: los polos del mundo, no ala Equinocial, fg. Pongamos que haziendo vn dia observació de la altura del polo, que era el paralelo del Sol, hK: y el Orizonte era, b d:y el Zenit el punto, a: la altura del Sol sobre el Orizonte el arco, dh: Pues estando el Sol en, h, su declinacion es el arco, gh, ala parte del polo, n, y poniendo el plano, r s, paralelo al Orizonte, b d, el estilo recto, q e, haria la sombra, q p, a la parte del polo, n. El complemento de la altura del Sol, es el arco, ha, el qual juntado con la declinacion del Sol, gh, serà todo el arco, ga, que es lo que ay del Zenit a la Equinocial, y otro tanto esla altura del Polo, que es el arco, b n, de la misma denominacion, que es la declinacion. Pongamos la segunda regla en la figura siguiente.

Sol y sombras diferentes : si la declinacion fuere ygual al complemento de la altura del Sol, el Zenit està en la Equinocial, y no ay altura de polo, como parece

en la figura figuiente.

Sean los polos, Meridiano, y Orizonte, y Equi nocial, como en la passada : y sea el paralelo del Sol,hK:y la altura del Sol fobre el Orizonte, dh: y la declinacion, a h, la qual es ygual al complemento de la altura del Sol: luego, ac, serà la Equinocial, y los puntos, b d: los polos un ol comança montes




en el mesmo Orizonte. Y porque el punto, a, dista de los puntos, b, d, por vn quadrante, siendo, b d, el Orizonte ferà el punto, a, el Zenit: y siendo, h K, el paralelo de Sol, y el arco, dh, su altura, el complemento para. 90. es, ha, el qual se halla ygual a la declinacion: luego, a c, sera la

E 4 Equino-

Equinocial, y,b d,los polos del mundo: y estando el Sol en,h,la sombra del estilo, q e,es en, p, a la parte contraria de la declinació. Demas desto, siendo Sol y sombras diferentes, si la declinación del Sol suere mayor que el complemento de su altura, restando el complemento de la declinación, lo que queda es la altura del Polo, como se demuestra en la figura siguiente.


Sea el Orizonte, b d, el Zenit, a: la Equinocial, gf, la declinacion, el arco de Meridiano, gh, la altura del fol fobre el Orizóte, el arco, dh, y fu complemento para 90. es, ha, menor que la declinació hg, por lo qual, restando el complemento, ha, de la declinacion, hg, queda-



de. 90. està el Zenit apartado de la Equinocial. Al Demas desto, siendo Sol y sombras diferentes, si el complemento de la altura del sol sobre el Orizonte, su fuere mayor que la déclinación, restando la declinación del complemento, lo que quedare es la altura del Polo, como se demuestra en la figura siguiente, y esa la parte contraria de la declinación.

Sea como en las figuras paffadas, el Orizonte, b d, el Zenit,a:la Equinocial, g f, los Polos, n o, el lugar del Sol el punto, h, fu declinacion, g h, a la parte contraria dode

van las fombras, como lo muestra el punto, p. La altura del Sol sobre el Orizonte, es el arco de Meridiano, d h: y su complemé to para 90. es el arco, h a, mayor que la declinación h g, la qual restada del cóplemento, h a, queda el arco, g a, que es la distancia del Zenit a la Equinocial,



29

y otro tanto es la altura del Polo, q es el arco, b n, a la parte contraria de la declinación. Lo mismo hara, añadiedo la declinación a la altura del Sol, y lo que faltare para 90.

està apartado el Zenit de la Equinocial.

Diximos, que quando el Sol no tiene declinacion, q es estando en la Equinocial, como en el punto, g, que el complemento de la altura es la altura del Polo: y esto es cosa clara, porque estando el Sol en, g, el complemento de la altura del Sol sobre el Orizonte, es, g a, q es lo q el Zenit està apartado de la Equinocial: y otro tanto sera la altura del Polo a la parte del punto, p, q es donde van las sombras. Si el Soltuuiere 90. grados de altura, y no tuuiere declinacion, el Zenit està en la Equinocial.

Pues figuiendo estas reglas los Pilotos, tomarán cierta su altura de Polo. Y si entendieren la razon de añadir, o restar la declinación, como aqui se ha demostrado, no se

podran errar, como algunas vezes acontece.

Tambien se sabra si el Zenit està entre el Sol y el Polo, boluiendo la cara al Sol, y si vieren que se mueue de mano yzquierda para la derecha, el Zenit està entre el Polo y el Sol; y si se mouiere de la manó derecha a la yzquierda, el Zenit està entre el Sol y la Equinocial. Si el Zenit estuuiere de la Equinocial al polo Austral, estando

la cara al Sol, si se mouiere de mano derecha para la vzquierda, el Zenit està entre el Polo y el Sol: y si se mouiere de mano yzquierda para la derecha, el Zenit està entre la Equinocial y el Sol. J Si estas reglasse praticaren en el Meridiano de Lisboa, o no muy lexos del, saldra muy cierta la altura: pero si se apartan del al Occidente, o al Oriente, ay necessidad de hazer equació de la diferencia del mouimiento del Sol, segu estuuieren apartados del Meridiano de Lisboa, q es para donde estan hechas las tablas de declinació. Como si vno estudiesse en 90. gra. de logitud del Meridiano de Lisboa, al Occidete, feria mas adelante el lugar del Sol en el Zodiaco, en Lif boa, q no en el tal lugar: por lo qual la declinació del Sol feria mayor, o menor, segun q fuesse creciendo, o descre ciendo: y assi la declinacion q respondiesse al mouimieto del Solen las seys horas, se auia de añadir a la declinacion de las tablas, si fuesse creciendo; y quitarle si fuesse menguando. Pero esto seria embaraço para Pilotos, y assi lo pueden dexar, quo les sera error sensible, ni tampoco la paralaxis del Sol. Los Matematicos podran suftificar esto en sus observaciones.

Es de aduertir, q la graduacion de los Aftrolabios se haze en dos maneras: la vna es, que comieça la numeración del Orizonte, y acaban los 90. grados en el suspensorio: en otros Astrolabios comiença la numeració del suspensorio, y acaba en el Orizonte. De qualquiera manera puede seruir para las reglas quuemos puesto. Sea el Orizonte del Astrolabio, b d, y el suspensorio, o: el Zenita: en la circunferecia de afuera comiença la numeración del Orizonte, y acaba en el Zenit: y en la de adetro; comiença del suspensorio y acaba en el Orizonte. Pongamos que tomando la altura del Sol cortò la alidada en el punto, e, pues si contamos por la graduacion de afuera, me muestra q la altura del Sol sobre el Orizonte, es 50, grados

grados: y fi contamos por la graduacion de dentro, me muestra la alidada. 40. grados, q es el complemeto para 90. del qual coplemen to auemos vsado en la pratica de las reglas. De suerte, q de qualquiera manera q se gradue el Astrolabio, se sabe el coplemento de la altura del Sol sobre el




Orizonte, porque tomando la altura por la numeracion de afuera, restado la altura de 90. queda el coplemento. Y si la altura se tomare por la numeracion de dentro, la alidada muestra el complemeto de la altura del Sol sobre el Orizonte.

Como se sabra la eleuacion del Polo sobre el Orizonte, a qualquiera hora fuera del medio dia.

A mas cierta y facil manera de hallar la altura del Polo, es la que toma al medio dia, y para los Pilotos es la que toma al medio dia, y para los Pilotos es la que toma al medio dia, y para los Pilotos es la que toma al manera de tomar altura fe requiere. Pero para algun curioso (que nunca falta) pondre algunos modos de tomar la altura del Polo fuera del medio dia. Con diferentes instrumentos se toma la altura del Polo a qualquiera hora, y porque aqui se trata de nauegació, dire de los quara este proposito son mas conuenientes. Lo primero, lleuaran vna bola, lo mas perfeta mente redonda que des qualquiera dividido en 360. partes y guales, como se suele dividir qualquiera circulo mayor en la Esfera. Demas desto, lleuen vna caxeta redonda que tenga

tenga quatro dedos de diametro, y en el fuelo della se haga vn circulo graduado en 360. partes yguales, y en el centro deste circulo se ponga vn peon, y en el peon vna aguja ceuada con piedra yman, como se haze en los reloxes de Sol: tapese con su vidrio, porque no se entre ayre: por encima del vidrio passe vna barreta, como, g h, y en ella se ponga vn estilo muy derecho, y con esto queda acabado este instrumento.

Pues sea, a b c d e, el circulo mayor, descrito en la superficie de la boca, y es necessario para hallar la eleuacion del Polo, por la mañana, o por la tarde, hazer dos o tres observaciones, como diremos. Pongase la caxeta para el Sol, demanera que la sombra del estilo, t x, vaya derechamete por la barreta, g h, y entonces se mire en q parte del circulo q està en el suelo de la caxeta, señala la aguja có la saetilla, y en el mismo instate se tome la altura q el Soltiene sobre el Orizóte. Passado q sea vna hora,



o pocos menos, se haga la misma observacion, teniendo cuenta que la sombra del estilo vaya por la barreta, gh, y viendo donde señala la saetilla de la agusa en el circulo, se tenga cuenta có aquel punto, y ver quatos grados ay, de dóde señalo la primera vez, adonde señalo la seguda.

Hagafe otra tercera observacion, viendo donde señala la faetilla de la aguja, en el circulo, y ver quantos grados ay entre esta tercera señal y la segunda. De manera que en estas tres observaciones, se tomaron tres alturas del Sol, y los dos espacios que huno entre los tres Verticales, donde estuvo el Sol en lastres observaciones. Pues tomarê en el circulo, a b c d, de la bola, el arco, b e, de tãtos grados como huno entre la primera y segunda señal de la faetilla: y el arco, c d, de tantos grados como huno entre la segunda y tercera señal de la saetilla. Despues, tomando vn compas se abrira al tamaño de la quarta parte del circulo, ab cd, y puesto el vn pie en cada vno de los puntos, b, c, d, y el otro en el mismo circulo, a b c d, el qual estando fixo, con el que se puso en los puntos, b,c, d, se descriuiran en la superficie de la bola: los tres verticales; fb, fc, fd, que son en los que estado el Sol en las tres observaciones: y el Zenites el punto, f, donde se cortan los Verticales. Despues desto se tome el arco, bi, ygual a la altura del Sol en la primera observació; yel arco,c K, ygual a la altura del Sol,en la seguda obser uació: y el arco, d l, ygual a la altura q tuuo el Sol en la ter cera observació, y tédremos los tres pútos en la bola, como el Sol estudo en el cielo, respeto de não Zenit. Demas desto se tome en el circulo, a b c d, có el cópas, el cóplemé to de la declinacion q el Sol tiene el tal dia, si la declinacion fuere a la parte que se leuata el Polo: y si el Sol declinare a la parte cotraria, se tome del circulo, a b c d, vna quarta de circulo có mas la declinacion del Sol, y có esta abertura de compas, se poga el vn pie en cada uno de los tres

tres puntos, i Kl, y con el otro se descriuan en la superficie de labola vnos circulos, que donde se cortaré serà el Polo que se leuanta sobre el Orizonte, como en esta figura. Supongo que el Sol declinaua al medio dia, y que el polo que se leuanta sobre el Orizonte era el Septentrional, por lo qualtomè del circulo, a b c d, yn quadrante, con mas la declinacion del Sol: y puesto el pie del compas en los tres puntos, i Kl, haziendo tres circinaciones, se cortaron en el punto, m, el qual es el polo Septentrional. Pues estendiendo el compas en el circulo, a b c d, a cantidad de vn quadrante, y poniendo el vn pie en el Orizonte, de manera que el otro passe por los puntos, m, f, que son el Zenit, y el polo, se descriuirà el circulo, mf, ne, el qual sera el Meridiano. Y con la mesma abertura de compas, poniendo el vn pie en el polo, m, con el otro descriuir è el circulo, n D, el qual fera la Equinocial: y si teniendo el pie del copas en qual quiera de los tres putos, i Kl, y el otro fixo en el polo, m, se descriuirà el paralelo que aquel dia hizo el Sol: y el arco, fn, es la distancia del Zenit a la Equinocial, que es lo mismo que la eleuacion del Polo. Tambien se podra hazer esto mismo con dos observaciones, procediendo de la mesma manera, pero no estan cierto.

CAP. VII. Que enseña lo mismo que en el precedente, sin saber la declinacion del Sol.

Vestos los tres Verticales, y las tres alturas del Sol, segun y como se ha hecho en la bola, busquese en la misma bola el centro de vn circulo que passe por los tres puntos, i K l, quese-

ra el punto, m, y este serà el polo del mundo: y abriendo el compas a cantidad de vn quadrante, en el circulo, a b c d, y poniendo el vn pie en el Orizonte, de manera que el otro passe por el polo, m, y por el Zenit, f, se descriuira el Meridiano, m s n e : y estando assi el compas, se ponga el vn pie en el polo, m, y con el otro se descriuira el circulo, D n, que serà la Equinocial: y el arco, f n, serà la distancia del Zenit a la Equinocial, se y gual a la altura del Polo. Tambien si poniedo el pie del copasen el polo, m, y el otro en qualquiera de los tres putos, i, K, l, y se descriuiere el circulo, z l K i, sera el paralelo si aquel dia anda el Sol; y el arco, n z, serà su declinacion.

CAP. VIII. Donde se enseña la fabrica de vninstrumento, con el qual se sabra la altura del Polo a qualquiera hora, y otras muchas operaciones.

O Pondre aqui la Teorica, niperspectiua deste instrumento, por qua tengo escrita en nuestro. Astrolabio con sus demostraciones; solaméte pondre vna breue pratica de la fabrica, para el que no

pondre vna breue pratica de la labrica, para el que le tuuiere los libros q desto tratan, la sepa hazer por este.

Sobre el centro, e, se haga el circulo, a b c d, y del mesmo tamaño se haga el circulo, ABCD, dividase cada vno destos circulos en quatro quadrantes, con las lineas, a c, b d, AC, BD, despues se divida cada quarta en 90. grados, como se acostumbra. En entrabos dos circulos solamente se han de descrivir Meridianos, y paralelos, como se haze en los planisferios generales, Para descrivir los Meridianos se podra la regla en el punto, a, y por cada grado del Semicirculo, d c b, y dode cortare al Diametro, b d, se haran señales, por las quales, y por los pútos, a c, se descriviran circunferencias, buscando los centros dellas en el Diametro, b d, estendido de vna y otra parte, quando sucre menester, y desta manera se descriviran los Meridianos en el vn circulo, y en el otro.


Para descriuir los Paralelos, se pondra la regla en el F 2 punto,

punto, d,y portodos los grados del Semicirculo, ab c, y donde cortare al Diametro, a c, se haran señales, por las quales, y por los grados dode sueró hechas, se descriuirá circulos que no salgan del circulo, ab c d. Los cetros destas circunferecias se hallará en el Diametro, a c, estedido de vna y otra parte: y auiendo passado portodas las señales del Diametro, a c, las dichas circunferencias, quedaran descritos los paralelos.


Las graduaciones, y numeros, se pondrá como en los mismos circulos parece. Es de aduertir, q aunq estos circulos q auemos descrito, llamamos Meridianos y paralelos, quado se hiziere algunas operaciones por este instrumento. Los Meridianos se llamara algunas vezes, circulos de posició, y otras vezes circulos de lógitud. Y los Paralelos, vnas vezes será Almicatarades, y otras Paralelos de latitud. Todas estas conversiones de nombres se haze segun las operaciones q por este instrumento se hiziere.

Pues descritos estos circulos como está dicho, y las figu ras muestra, se pódra el Planisferio, ABCD, sobre el planisferio, a b c d, de manera, se l centro del vno, couenga con el cetro del otro. En el cetro, e, del circulo, a b c d, se pondra vn exe de papeló de vn naype: y en el centro del circulo, ABCD, se hara vn agugero, se quepa justo el exe, y para que el circulo, ABCD, no se falga suera, se encolara otro papelonzillo algo mayor que el exe. Todo esto se dispondra de manera, se el circulo, ABCD, se mue ua libremente, al rededor del exe, sin que la circunserecia del vn planisferio, se aparte de la del otro.

Antes q el circulo, ABCD, se poga sobre el planisferio, a b c d, se harà esta diligencia, que el circulo, ABCD, se vnte con azeyte de nuezes, o linaçã, y se dexe secar, porq vntado con azeyte, se trasparente a las lineas del planisferio, a b c d, que estan debaxo del planisferio, ABCD, y es assi necessario para auer de obrar co este instrumeto.



De ninguna otra materia se puede hazer mejor este instrumento que papel, pero es menester que papel sea dimarcamayor, assiparala sirmeza delinstrumeto, como para el tamaño, y descriuirse en el bie las lineas. Para que los Meridianos vaya de grado en grado, es necessario, que se instrumeto tenga vna tercia de vara de Diametro, y no se requiere ser menor, por causa que las operaciones se haga mas precisas. Bien podria hazerse este instrumeto de lato, pero seria muy laborioso de labrar, porque la Planisferio, ABCD, se auia de hazer como vna red, sacado todos los blacos, y que dassentos los Meridianos, y paralelos, tá delgados como hilos. Yo hize vn quadrate esta del sacado de la como seria del gados como hilos. Yo hize vn quadrate esta del sacado se del sacado como hilos. Yo hize vn quadrate esta del sacado como hilos.



de laton desta manera, y con el se hazen muchas operaciones, que con el Astrolabio no se pueden hazer. Bien podria seruir vn quadrante deste instrumento, tanto co mo todo entero, pero el que no suere medianamente instruydo en Matematicas, y en el tratar instrumentos, hallarse ha muy embaraçado con el : pero el instrumeto entero es muy facil de obrar, y tiene muchos vsos, como en otra parte tenemos escrito; aora no pondremos sino el que es a proposito.

Para esta operació se ha de imaginar, que los puntos, a c,del Planisferio inferior, son los polos del mundo, y el punto, a, el Artico, y los circulos q van de polo a polo,

fon

Nauegacion.

fon Meridianos, o circulos Horarios: y los circulos que cortan a estos, son paralelos de declinacion; y la linea, b d, la Equinocial. El punto, A, del Planisferio superior se tiene de imaginar que es el Zenit, y los circulos que salen del Zenit, son Verticales, y los que cortan a estos, son Almicantarades, o circulos de altura : la linea, BD, el Orizonte.

Esto assientendido, queriendo saber la altura del Polo fuera del medio dia, se haran dos observaciones, como se dixo en el capitulo precedente, tomando la altura del Sol, y con la aguja su Vertical; como esta dicho en

el capitulo passadó:

En estas dos observaciones tenemos tres cosas; las dos alturas del sol; y la distancia que ay entre los dos Verticales, donde se tomaron las alturas del sol; y su declinacion la fabemos por el dia que hazemos la observacion. Pues conocidas estas cosas, ordenaremos el instrumento desta manera: Si las observaciones fueron por la mañana, tomarè en el Planisferio superior dos Verticales, que este apartado el vno del otro, la distancia que se hallò en la circunferecia de la caxa, entre las dos sombras del estilo que se hizieron en las dos observaciones: y en estos Verticales, en el mas llegado a la linea, A C, contare por los Almicantarades la altura del Sol, que tuuo en la primera observación, y en el otro Vertical contare la altura del Sol de la fegunda observacion, haziendo en entrambos Verticales señales dode fenecieron las alturas. Estos Verticales (como està dicho) si fuere por la mañana, se tomaran los mas llegados a la linea, A C. Esto assihecho, se rebuelua el Planisferio superior, y se ponga la vnaseñal de la altura del Sol, que se puso en el Vertical, en el paralelo de la declinacion del Sol: y si entonces la otra señal q se puso en el otro Vertical, cayere en el mesmo paralelo de la declinación del

Sol, el Planisferio superior està puesto sobre el Planisferio inferior, segun que nuestro Zenit se aparta de la Equinocial: y assi el Indice que està puesto en el punto, A, mostrarà esta distancia, que es la altura del Polo. Esta

misma distancia ay delpunto, B, al punto, a,

Pero si puesta la vna señal de la altura del Sol, que està en el vn Vertical, en el paralelo de la declinacion del sol, la otra señal que està en el otro Vertical no cayesse en el mesmo paralelo, es necessario tomar otros dos Verticales mas llegados al Meridiano, guardado entre ellos la distancia que se hallò en la circunferencia de la caxa entre las dos sombras delestilo. Pues assi se yra tentando, hasta que las señales de la altura del sol, que se pusieron en los Verticales, caygan en el mismo paralelo de la declinacion del sol, y entonces, como està dicho, el Indice que esta en el punto, A, mostrara lo que el Zenit se aparta de la Equinocial, que es la altura de Polo; y otro tanto se leuanta el polo, a, del Orizonte, B. Quanto mas lexos del medio dia se hizieren las observaciones, sera mas precisa la altura del Polo que se tomare.

Estas mesmas observaciones se pueden hazer por la tarde, guardando en todo, lo que se ha dicho de las obfervaciones de la mañana. Tambien se puede hazer vna observacion por a lmañana, y otra por la tarde: pero en esto podria aver algun inconveniente, y assisera mejor

proceder como esta dicho!

Auemos dicho dos modos de como se puede saber la altura del Polo en la mar, suera del medio dia: tambien se pudiera enseñar otro modo con un Planisserio general, como en otra parte lo auemos escrito, pero por ser cosa algo prolixa lo dexaremos. En tierra se puede saber la altura del Polo por otros muchos modos, aunque sea suera del medio dia, como tenemos demostrado en nuestro libro de reloxes.

Pues auemos enseñado tomar la altura del polo, mediante el Sol, serà bien que enseñemos, como se tomarà mediante la Estrella polar, y guarda delantera, segu que lo vsan los Pilotos, para lo qual se propondra lo que se sigue.

CAP. IX. Que enseña saber, en que parte estarà la estrella Polar de la circunferencia que haze al rededor del Polo, quando la guarda delantera estuniere en alguno de los ocho rumbos principales.




O Primero es necessario, saber la declinación de la estrella Polar, para conocer el Diametro que tiene el circulo que haze al rededor del Polo. Presupuesta la longitud de la estrella Polar, que es la postrera que està en la cola de la ossa menor, y tambien su latitud, por las tablas de Iuan de Monterregio, vendremos en conocimiento de su decli-

nacion. La longitud, segun las tablas mas nueuas, es 21. grados. 30. minutos de Geminis y la latitud. 66 grados.

Pues fegun esto, sea en la figura figuiente, el Meridiano, a b c d, el Polo del mundo, a, la Equinocial, b m d, el Polo de la Ecliptica, g, la Ecliptica,

cne, el lugar de la estrella Polar el punto,h. Del Polo, g, por,h, se tire el circulo de longitud, g K l, propongamos, f, el principio de Aries, y serà el punto, K, los. 21. grados, 30, minutos de Gemini; y serà, K h, los. 66. grados de latitud: del polo del mundo, a, por h, se descriua el circulo, a h n m, y serà m h, la declinacion de la estrella. Y aŭ que està dicho en el capitulo 23. de nuestro Astrolabio, como sin las tablas de Iuan de Monterregio se podra saber el arco, m h, por via de breuedad vsaremos de las tablas: pues si-



guiendo la dotrina dellas, segu la de Erasmo Reynoldo, a los 21. grados, 30. minutos de Gemini, que es la longitud, le responden 23. grados, 14. minutos, 12. segundos de arco, que segun se demostro en el capitulo 25. de nuestro Astrolabio, es el arco, K 1; el qual juntandole con el arco, K h, que es la latitud, será todo el arco, l K h, 89. grados, 14. minutos. 12. segudos: de los quales su seno recto es, 999 104. segun que el seno todo es, 10000000. Mas a los mismos, 21. grados, 30. minutos de Gemini, le responden debaxo del titulo, Numerus multiplicandus, 9982663, el qual

numero

numero multiplicando, es el fenorecto del angulo, hlm, como fe dixo en el capitulo 25. de nuestro Astrolabio. Pues en el triagulo, hml, como fe ha el feno todo al feno recto del arco, lh, opuesto al angulo recto, m, asi se ha el feno recto del angulo, hlm, que es el numero multiplicado, con el seno recto del arco, mh. Pues multipliquemos, 9999104. seno recto del arco, lh, que es el fegundo numero, por 9982663. numero multiplicando, que es el tercero; y serà el producto, 99817685533952. del qual quitaremos siete cifras de la mano derecha, porque se parte por el seno todo, que era el primero numero, y quedaràn, 9981768, que por las rablas de senos le responden, 86. grados, 23. minutos, y tanto es la declinación de la estrella, que es el arco, mh: pues restando 86. grados, 23. minutos de 90. quedaràn, 3. grados, 27. minutos: y tanto es el arco, ha, que es lo que la estrella Polar dista del polo del mundo; y esto, segun la longitud y latitud que ponen las tablas: pero segun nuestra observació tiene menor distancia del Polo, como diremos adelante.

(AP. X. Como se hallarà la ascension recta de la estrella Polar.



ESTA Hallar la ascension recta de la estrella Polar, porque estando sabida la ascension recta de la estrella Horologial, o guarda delantera, sepamos el arco de Equinocial, o de otro paralelo, que ay entre las dos estrellas, lo qual es necessario

para saber lo que se pretende.


Para que esto vaya mejor fundado, repitamos la figura precedente, quedandose en ella los mesmos circulos, y tomando el arco, fp, y gual del arco, Ke, y del polo, a, al punto, p, descreuir el circulo maximo, ap. Pues esto assi dispuesto, sigamos el precepto de las tablas, entrando en la tabla que se intitula, Cæli mediationum generalis, con la longitud de la estrella, que es, 21. grados, 30. minutos de Gemini: los grados en la cabeca, los minutos en la coluna primera de la mano yzquierda: y debaxo del titulo, Radix ascensionum, se hallaran 82. grados, 11. minutos, 38. segundos; y esto es el arco de Equinocial que ay de principio de Aries, que es el punto, f, hasta el punto, l: y debaxo del numero Multiplicando, està este numero, 589624. que en esta figura es la tangente del arco, op. Delpues en el Canon Fæcundo, o tabla de Tangentes, entrando con la declinacion, que es, 82. grados, 33. minutos, a los quales les responden, 165873,996. y tanto es la tangente del arco, h m. Pues multipliquese esta tangere, por, 589624. que es el numero multiplicando, y es el producto, 47803235951344. Deste numero se quiren siete letras de la mano derecha (porque tantos ceros tiene el feno todo despues de la vnidad) y quedaràn,4780323. y esto es el seno recto de la diferencia del Transitus medij cæli, que en esta figura seria el seno del arco, m l, y por las rablas responde alas 4780323 partes. 77. grad 58. minutos, y tanto es el arco, ml.

Teniamos que la Radix ascensionum, era. 82. grados. 11. minutos. 38. segundos, que es el arco, fl, del qual quitando el arco, m l, queda el arco,

f m, de. 4. grados. 13. minutos. 38. fegundos, que es vnarco de Equinocial que ay de principio de Aries, que es el punto, f, hasta el punto, m, que termina el circulo, a h m, que sale del polo del mundo, y passa por el punto, h, lugar de la estrella.

La razon, y demostracion desta pratica, està en el capitulo veynte y & cinco de nuestro Astrolabio, y por

esto no la pongo aqui.



CAP. XI. Que trata como los Pilotos toman la altura del Polo, por lo que la estrella Polar està mas aita, o mas baxa que el Polo.




ARA Conocer en que parte de su paralelo està la estrella Polar, lleuan los Pilotos vn regimiento que les dize, que quando la guarda delantera, que es estrella de la boca de la bozina, estuuiere en tal rumbo, la estrella Polar està mas alta. o mas baxa que el Polo; y fegun esto quitan, o añaden lo que

su regimiento les dize, de la altura que tomaron de la estrella Polar, para

que les quede la altura del Polo.

Pues lo que aqui fe pretende, es, dar regla cierta, para que fabiendo en que rumbo de los 32. que salen del Polo està la guarda delantera, sepan quanto mas alta, o mas baxa està la estrella Polar que el Polo. Para ente-

der esto, descriuamos la figura que se imagina al rededor del Polo: y sea el cir culo, a b c d, el paralelo q la guarda delantera descriue al mouimiento del primero mobil, el qual dividido con los Diametros, a c, b d, en quatro quartas ygua les, sea el punto, a, donde llaman Norte, y el punto, c, el Sur, y el puto,d,el Leste, y el punto, b, el Oeste. Despues cada quarta se divida en dos partes yguales, comomuestran las letras, e,f, g,h, en donde se ponen los viétos, Noroeste, Sudoeste,



Sueste,

Sueste, Nordeste, como en la figura parece. Hazen otra dinision, que cada octaua parte destas la diuen por medio, y en cada dinision ponen otro viento, como parece en la figura. Vltimamente, diniden cada vno destos 16. vientos en dos partes, de manera que son por todos. 32. vientos: los 8. primeros llaman vientos principales: los otros. 8. segundos llaman, medios vientos: los. 16. intermedias, llaman quartas. Bien se podrian imaginar quantos vientos quisiessen, porque de qualquiera parte de la circunferencia podria salir vn viento, pero para los Pilotos estos son bastante cosa para su nauegacion.

Pues entendido los principios que se han puesto, vengamos a tratar de lo que haze a nuestro proposito. Pongamos lo primero, estando la guarda delantera en el Norte, que tanto estará la estrella Polar mas alta


que el Polo.

La guarda delantera en el Norte.

SEa en la figura figuiente el Meridiano, a b c d, el Polo del mundo, e, el Zenit, a, el Orizote, b f d: Sobre el Polo, e, fe deferiua el paralelo, hKgl, que es el que la estrella haze al rededor del Polo: y será el arco, e h, de. 3. gra. 27. min. que es lo que la estrella està apartada del Polo, como auemos visto. Descriuase el circulo, Klfe, en angulos rectos con el Meridiano; y ferà el punto, h, donde se pone el rumbo del Norte, y el puto, K, el Oeste, y el punto, g, el Sur, y el punto, I, el Leste, que son los quatro vietos principales. Pues sepamos, quando la guarda delantera estudiere en el Norte, donde estarà la estrella Polar, y quato mas alta, o mas baxa que el Polo. La ascension recta de la estrella Polar acabamos de conocer, que es.4. grados,13. minutos, 38. segundos: y la ascension recta de la guarda delantera, es 221. grad. 52. minu. 30. segund. de los quales restando la afcension recta de la estrella Polar, quedan. 217. grados. 28. min. 30. segud. que es la ascension recta que ay entre las dos estrellas. Pues pomendo la guarda delantera en, h, y contando los 217. grad: 38. minutos, 30. fegund. que ay de ascension recta entre las dos estrellas, por el paralelo, h K g l, caera en el punto, m, apartado del punto, g, 37. grad. 38. minut 30. fegund. Pues del Zenit, a, por el lugar de la estrella, m, hasta el Orizonte, se defcriua el Vertical, a m n, y será la altura de la estrella Polar, el arco, n m, y el altura del polo es el arco, be, que supongamos que es. 40. grad. 22. minutos: pues todo lo que fuere menor el arco, n m, que el arco, b e, està mas baxa la estrella Polar, que el polo, estando la guarda delantera en, h, lo qual se demuestra en esta manera. Del punto, e, al punto, m, se descriua el arco, e m: del punto, m, al punto, o, se descriva vn arco, que venga perpendicular sobre, e g. En el triangulo, e o m, estan conocidos dos angulos con el lado opuesto al angulo recto, porque como esta dicho, el angu lo,o e m, es de 37. grad. 38. minutos, 30. fegundos: y el lado, e m, es 3. gra, 27. minutos. Pues por la. 16. del libro 4 de los triangulos de Monterregio, como se ha el seno recto del angulo, e o m, que es el seno todo, con el seno recto del arco, me, assi se ha el seno recto del angulo, o e m, con el

feno recto del arco, o m. Pues siguiendo la regla de proporcion, multipliquemos elseno recto del arco, e m, que es. 6017. partes de las que el seno todo tiene. 100000. por 61071. seno recto del angulo, o e m, y será

el producto. 367464207.el qual partido por el feno todo, que se hará quitando.5. letras de la mano derecha, y quedarán. 3674. que ferà elseno recto delarco, o m, que por las tablas de fenos le responden. 2. grados. 6. minutos. 20 fegundos. Mas por la. 19. del libro. 4. de los triágulos de Monterregio, como se ha el seno de complemeto del arco, e m, al seno de complemento delarco, mo, assi se ha el seno de complemento del arco, eo, al seno todo: y convertiendo, como se ha



el seno de complemento del arco, o m, al seno de complemento del arco m e, assi se hà el seno todo, al seno de complemento del arco, o e. Pues multiplicando el seno de complemento del arco, m e, que es. 99818. partes de las que el feno todo tiene, 100000, por el feno todo, es el producto, 9981800000. y este partido por el seno de complemento del arco. o m, viene al quociente. 99885. que por las tablas le responden. 87. grados.16. minutos: y su complemento para. 90. son, 2. grados. 44. minuros, y tanto es el arco, e o : y juntado este arco, e o, con el arco, e a, que es el complemento de la altura del Polo, serà todo el arco, o e a, 52. grados, 22. minu. Pues en el triangulo, a o m, estan conocidos los dos lados, a o, o m, con elangulo recto, a o m; luego por la. 19. del libro. 4. de Monterregio, como fe ha el feno de complemeto del arco, a m, al feno de coplemento del arco, a o, a si se ha el seno de complemeto del arco, o m, co el seno todo: y convertiendo, como se ha el seno todo al seno de complemento del arco, o miassi el seno de complemento del arco, a o, al seno de complemento del arco, a m. Pues multipliquemos. 99932. que es feno de complemento del arco, o m, por, 61060. que es seno de complemento del arco, oa, y sera el producto. 6101847920. y este se partirà por el seno todo, y sera el quociente. 61018. partes, que son el seno de complemento del arco, a m, que por las tablas le responden. 37, grados, 36. minutos: y tanto es el arco, n m, pues es complemento del arco, m a. El altura del Polo pusimos. 40. grad. 22. minut. que es el arco, b e: luego el arco, n m, es menor que la altura del Polo, 2. grados. 46. minutos. Por lo qual quando la guarda delantera estuniere en el rumbo del Norte, que es en el punto, h, se han de añadir, 2. grad. 46. min. a la altura que tuuiere la estrella Polar, que seria el arco, n misegun q queda demostrado. Quando

Quando la guarda delantera esta en el Oeste, quanto esta mas alta que el Polo.

Amos discurriendo por los demas rumbos, y pógamos la guarda delantera en el Oeste, que es en, K; de la figura figuiente, y estara la estrella Polar en, m, apartada del punto, 1, 37. grad. 38. minut. 30. segund. como queda demostrado, por la qual quedarà el angulo, h e m, de. 52. gra. 21. min. 30. seg. Descriuase el arco, mo, perpendicular sobre, h e. En el triangulo rectangulo, e o m, como se ha el

feno del angulo, e o m, que es el feno todo, al feno del arco, me, que como està visto, es 6017. partes, de las que el feno todo es 100000. assi se ha el feno del angulo, o e m, que es 179183. con el seno del arco, o m: pues multipliquemos. 6017. que es segundo numero, por 79183. que es tercero, y será el producto. 476444111. y partiendo este numero por. 100000. que es seno todo, que dan. 4764. seno recto del arco, o m, que por las tablas es su arco. 2. grados. 44. minutos. Mas en el mesmo triangulo como se ha el seno de complemento

k o m

del arco, e m, al seno de complemento del arco, om, assise ha el seno de complemento del arco, e o, al seno todo, y conuertiendo, como se ha el seno de complemento del arco, o m, al seno de complemento del arco, e m, assi se ha el seno todo con el seno de complemento del arco, e o. Pues multiplicando. 99818. feno de complemeto del arco, e m, por 100000 feno todo, ferà el producto 9918800000. el qual partido por. 99884. seno de complemento del arco, o m, vendra al quociente. 99933. que serà seno de complemento del arco, e o que por la tabla de fenos le responden. 87. grados. 55. minutos, y el complemento para. 90 fon. 2. grad. 5. minut. y tanto es el arco, e o, que restado del arco, e a, que es. 49. grad. 38. minut. queda el arco, o a, de. 47. grad. 32. minut. Pues en el triangulo rectangulo, a o m, estan conocidos los lados, a o, o m, que comprehenden el angulo recto, y como se ha el seno de complemento del arco, am, al seno de complemento del arco, a o. assise ha el seno de complemento del arco,o m, al seno todo; y conuertiendo, como fe ha el feno todo al feno de complemento del arco, o m, assi el seno de complemento del arco, o a, con el seno de complemento del arco, ma. Pues multiplicando. 99884. seno de complemento del arco, o m, por. 67494. seno de complemento del arco, o a, será el produ-Ao. 6741570696. q partido por el seno todo, viene al quociente. 67415. que es feno de complemento del arco, a m, que por las tablas le responden. 42. grados. 23. minutos: y tanto es el arco que ay del punto, m, al

Orizonte, que es lo que la estrella polar tendria de altura, que serian dos grados y vn minuto, mas que la altura del Polo: por lo qual, estando la guarda delantera en el Oeste, se han de quitar de la altura de la estrella polar. 2. grados. 1. minuto, para que que de la altura del Polo.

Quando la guarda delantera estuuiere en el Sur.

Ongamos que la guarda delantera està en el Sur, entonces la estre. lla Polar está del Norte a la parte del Oeste, en el punto, m, apartada del Norte. 37. grad. 38. minut. 30. segundos. Pues en la figura figuiente, que es como la passada, descriuase el Vertical, a m: y del punto, m, se descriua el arco, mo, perpendicular sobre, a e: tambien del punto, m, por el polo,e, se descriua vn circulo mayor, me n,y, n p, perpendicular sobre e g. Quando la guarda delantera estaua en el punto, h, la estrella polar estaua en, n, apartada de, g, como, m, lo esta de, h: luego el angulo, m e o, es ygual del angulo, pen, y los angulos, o,p, son rectos, y el lado, me,es ygual del lado, en: luego por la 20. propos de los triangulos Esferales de Clauio, el triangulo, me o, es y gual del triangulo, e p n, y tambien equilatero:y el lado, n p, 2. grad. 6. min. 20. segund. luego el arco, mo, sera otrotanto: y el lado, e p, era, 2. grad. 44. min. tambié el lado, e o, sera otrotato: pues quitando delarco, a e, el arco, e o, quedarà el arco, a o de 46. grados, 54. minut. En el triangulo rectangulo, a o m, está conocidos los lados, a o, o m, con el angulo recto, o. Pues por la. 19. del libro. 4. de los triangulos de Monterregio, como se ha el seno de complemento del arco, a mial se no de complemento del arco, 2 o, assi se ha el seno de complemento del arco, mo, al feno todo: y conuertiedo, como fe ha el feno todo al feno de complemento del arco, mo, assi se ha el seno de complemento del arco, a o, al seno de complemento del arco, ma. Pues multiplicado. 90932. que

es seno de complemeto del arco, o m, por 68327, que es seno de complemento del arco, a o, serà el producto 6828053764, el qual partido por 100000. que es seno todo, viene al quociente, 68280, y este es seno de complemento del arco, a m, que por las tablas de senos le responden 43. grados. 4. minutos: y tanto es lo que ay de la estrella polar, estando en, m, al Orizonte; luego esta mas alta que el polo. 2. gra. 42. min. y tanto es lo que se ha de quitar de la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en el Sur, para que quede la altura del Polo.



Quando la guarda delantera està en el Leste.

Pongamos que la guarda delantera està en el Leste, en el punto, 1, y estarà la estrella Polar en, m, apartada del Oeste, a la parte del Sur 37. gra. 38. min. 30. segund. Descriuas e vn circulo mayor, m o, perpendicular sobre, e g, y del punto, m, por el polo, e, se descriua el circulo, m e n, y del Zenit, a, se descriua el Vertical, a m. Descriuas e vn arco de circulo mayor, n p, perpendicular sobre, h e. Quando la guarda delantera estaua en, K, la estrella Polar estaua en, n, apartada de, 1, 37. grados, 38. minut. 30. segundos, luego el angulo, le n, es y gual del angulo, K e m,

por lo qual el angulo, n e p, ferà y gual del angulo, m e o. Los angulos, o, p, fon rectos : luego por la 20. proposide los triangulos Esferales de Clauio, el triangulo, n e p, es equiangulo, y equilatero del triangulo, m e o, el lado, n p, era. 2. grados. 44. minutos: luego ferà otros tattos, m o, que es su y gual; y el lado, e p, era. 2. grados. 5. minutos, luego ferà otros tantos el lado, e o. Pues añadiendo el arco e o, al arco, e à, serà todo el arco, o e a, 51. grados, 43. minutos. Pues en el triagulo rectangulo, a o m, está conocidos los lados, a o, o m, co angulo recto, o: pues por la io de Monterregio ya citada, como

fe ha el seno de complemento del arco, a m, al seno de complemento del arco, a o, assi se ha el seno de complemento del arco, o m, con el seno todo, y conuertiendo, como se ha el seno todo; 100000, con el seno de complemento del arco, o m, que es. 99884, assi se ha el seno de complemento del arco, o a, que es. 61955, con el seno de complemento del arco, a m. Pues multiplicando. 99884, que es el segundo termino, por 61955, que es tercero termino, viene a ser el producto. 6188313220, el qual partido por el seno todo, que es primero termino, viene al quociete. 61883, que por las tablas leresponden. 38, grados. 14, minutos, y tan alto està el punto, m, del Orizonte, que es donde esta la estrella Polar. Luego quando la guarda delantera estuuiere en el Leste, que es en, l, la estrella Polar tendra de altura sobre el Orizote. 38, grados, 14, minutos menos que la altura del polo. 2. grados. 8, minutos, y tanto se ha de aña dir a la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en el Leste, para que que de la altura del Polo.

Pues por estas mesmas demostraciones se ha sabido lo que la estrella Polar estarà mas alta, o mas baxa que el polo, estando la guarda delantera en qualquiera de los otros quatro rumbos principales, que son, Noroeste, Sudoeste, Sueste, Nordeste, que por euitar prolixidad no pongo aqui la pratica, que es el mismo discurso que se ha tenido en los quatro

puntos passados, y la misma demostracion.


CAP. XII. En que se demuestra, que lo que se añade a la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en qualquiera rumbo, no es ygual a lo que se quita, estando sa mesma guarda en el rumbo contrario.



N Los regimientos que hasta aora traen los Pilotos, tengo visto, que lo que se añade estando la guarda delantera en algun rumbo, a la altura de la estrella Polar, es y gual a lo que se quita, estando la guarda delantera en el rumbo contrario, lo qual no puede ser assi. Pues para que lo demostremos, sea

en la figura figuiente alguno de los Verticales, el circulo, a b c d, y el Zenit, a, el Orizonte, b q d'sea el Meridiano, a e c, y el polo del mundo, e, sobre el qual se descriua el paralelo que descriue la estrella Polar al rededor del Polo, y sea, h n g m. Pongamos que estando la guarda delantera en el Norte, la estrella Polar estaua en , m: y quando la guarda delantera estaua en el Sur, que es en, g, la estrella Polar ha de estar en, n, tan apartada


del Norte,h, como el puto m, del Sur, q es en, g. Pues del Zenit, a, por los puntos n,m, se descrivan los Verticales, an p, am q, por los pu tos, m,e, n, se descriuan los paralelos al Orizonte, st, u x,y z. Vltimaméte, por el polo,e, se descriua vn circu 6 lo mayor, que passe por los puntos,m,n,q passandopor el vno dellos, ypor el polo, necessariamente ha de pasfar por el otro. Ha se de enteder, q el Vertical, a b c d, està descrito en la superficie de la Esfera, de manera



que se corta en angulos rectos, có el circulo, K m l. Por la. 5. propo. del. 3. lib. de Theodosio, el arco, su, es mayor q el arco, u y el arco, u y, es ygual del arco, o n. Por la. 10. propo. del lib. 2 de Theodosio, y por la misma pro posícel arco, su, es ygual del arco, m r, luego el arco, m r, es mayor que el arco, o n. Pues estando la estrella Polar en , m, lo que se añade a su altura sobre el Orizonte, que es, q m, es el arco, m r, y estado la estrella Polar en n, lo q se quita de su altura, q es, p n, es el arco, o n: por q el paralelo, u e x, passa por el polo: y el arco, m r, es mayor q el arco, o n, luego estando la guarda delantera en rumbos contrarios, no se tiene de añadir en el yno lo que se quita en el otro, que es lo que propusimos de prouar.

De aqui queda, q en los regimientos q estuuieren en rúbos contrarios ygual la adicion a la subtració, no está buenos, y se deué de enmédar, aŭq la diferencia es poca, pero esto es para q vaya hecho có razó, y precisió.

Siguese la figura que muestralo que se tiene de quitar, o anadira la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en qualquiera de los 8. rumbos que estan en la figura, segun que los imaginan los Matematicos. La letra A, dize que se añada. La letra, R, q se quite.



A la letra que està en cadarumbo, le responde otra semejante en la circunferencia, y quiere dezir, que quando la guarda delantera estuuiere en algun rumbo de los que estan aqui, que la estrella Polar estarà en la letra de la circunferencia que fuere semejante a la del rumbo.

CAP. XIII. En que se demuestra lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en alguno de los. 8 rumbos, segun que los imaginan los Pilotos en la estrella Polar, donde se cortantodos.

VNQVE Es verdad que lo que hasta aqui se ha dicho es assi como lo tenemos demostrado, segun que los Matematicos imaginan los rumbos en el Polo del mundo: pero es necessario que sepamos, si segun que los Pilotos consideran los rumbos en que esta la guarda delantera, son los que

auemos dicho, o tienen diferente lugar, y fi bastaran las reglas que se ha dado, de añadir, o quitar en cada rumbo lo que se tiene propuesto. Tambien por que de bien entendida esta materia, de tomar la altura del Polo con la ballestilla, que hasta aora no la he visto tratar de nadie, aunque muchos han escrito de nauegacion, y no han reparado en algunos inconvenientes que en esto se pueden ofrecer, como aqui mostraremos.

Pues sea en la figura siguiente el centro del mundo, p, la quarta de circulo, a e d, el Meridiano, y el Orizonte, p d: el Polo del mudo el punto, e.

Diximos

Diximos en el capitulo precedente, que estando la guarda delantera en el Meridiano, en el punto, h, que la estrella Polar auia de estar en el punto,m,apartada del punto,g,para la parte del Leste. 37. grad. 38. minut. 30. fegundos, porque aya entre las dos estrellas. 217. grados. 38. min. 30. seg. de ascension recta; pero segun que los Pilotos consideran la guarda delantera en el Norte, imaginando yn Vertical que passa por la misma guarda y estrella Polar, entonces no viene a estar la guarda delantera en en el Meridiano: porque para q el Meridiano passasse por las dos estrellas, no ania de auer mas de 180. grados de afcension recta, entre la vna y la otra estrella. Luego es necessario, que para que el Vertical que imaginan los Pilotos, passe por entrambas estrellas, que no aya llegado al punto,h,donde es el Norte verdadero: como viendo el Vertical,a b q d, que passa por la guarda delantera, y la estrella Polar la guarda delantera, ha de estar en el punto, b, antes del punto, h, el arco, b h, y quanto el punto, b, està apartado del punto, h, otro tanto se retirò el punto, m, donde es el lugar de la estrella Polar, para el punto, g, porque quede entre las dos estrellas. 217. grad. 38. minu. 30. segund. de ascension recta. Pues para conocer quanto està mas alto el polo, e, que la estrella polar, m, estando la guarda delantera en, b, segun que los Pilotos imaginan los rumbos, por el polo, e, y por el punto, m, se descriua el circulo mayor, r e m f. Descriuase vn circulo mayor, bn, perpendicular sobre, re: descriuase otro circulo mayor, e b : y finalmente se descriua otro circulo mayor, e o, perpendicular sobre, b m. Pues siendo la ascensió recta, que ay entre la guarda delantera, y estrella polar. 217. grad. 38. min. 30. segund. serà el restante para.360.grad. 142.grad. 21.min.30.segund. y tanto es el angulo, b e m, pues está en el centro: Juego sera el angulo, be n,37. grad. 38. minut. 30. segund. que es el cumplimiento para dos rectos. En el triangulo rectangulo, be n,està conocido el lado, be, que es complemento de la declinacion de la guarda delantera, que como diximos, es, 14. grad. 25. minutos, 38. segund. el angulo, n, es recto el angulo, b e n, acabamos de conocer. Pues por la. i 6. del libro. 4. de los triangulos de Monterregio, como se ha el seno del angulo, b n e, que es el seno todo, con el seno del arco, b e, assi se ha el seno del angulo, b e n, con el seno del arco, b n, destas quatro cantidades estan conocidas las tres primeras; luego por reglas de proporcion se conocera el seno del arco, b n. Pues multipliquemos. 24915. que es seno recto del arco, b e, y segudo termino, por. 61072. q es seno del arco,b n,y tercero termino, y fera el producto. 1521608880. el qual partido por. 100000. que es seno todo, viene al quociente. 15216. el qual sera seno del arco, n b, que por las tablas le responden, 8. grad. 45. minut. 8. segundos, y tanto es el arco, b n. En el mismo triángulo, como se ha el seno de complemento del arco, b e, al seno de complemento del arco, b n, assi fe ha el seno de complemento del arco, n e, al seno todo: y conuertiendo, como fe ha el seno de complemento del arco, b n, al seno de complemento del arco, be, assi el seno todo, al seno de complemento del arco, n e. Pues multipliquemos,96846. que es feno de complemeto del arco, be, por.100000 que es seno todo, y tercero termino, y sera el producto, 9684600000.el qual partido por, 98835. que es seno de complemento

del arco, b n, yverdadera en el quociente. 97987, el qual es seno de complemento del arco, e n, que por las tablas de senos le responden. 78. grados, 29. minutos, los quales restados de. 90. quedan. 11. grados. 31. minut. y tanto es el arco, n e, el qual juntado con el arco, e m, que es el complemento de la declinación de la estrella Polar, que como esta dicho, es. 3.


grad. 27. min.y ferà todo el arco, n e m. 14. grad. 58. minutos.

En el triangulo rectangulo, b n.m., estan conocidos los dos lados, b n., m n.con el angulo recto, n.luego conoceremos el arco, b m.que serà. 17. grad.17. min. 23. segund. Y tambien conoceremos el angulo, b m n.que es 30. grad. 47. min. 55. segund. Despues en el triangulo rectangulo, e o m., estan conocidos los angulos, e m o, e o m., con el lado, e m., luego conoceremos los lados, e o, o m., que siguiendo la dotrina de los triangulos, e o, es. 1. grad. 45. minut. 56. segund. y el arco, m o, 2. grad. 57. min. que quitados de. 17. grad. 17. min. 23. segund. que era el arco, b m., quedara el arco, b o, de 14. grad. 20. minut. 25. segundos.

En el triangulo rectangulo, b o e, estan conocidos los lados, con el angulo recto, b o e, como se ha hecho atras, conoceremos el angulo, b e o, que serà de. 83. grad. 45. min. En el triangulo, a o e, estan conocidos los lados, a e, e o, con el angulo recto, a o e: y como se ha el seno de complemento del arco, a e, con el seno de complemento del arco, a e, con el seno de complemento del arco, a e, con el seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, a si se seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, a si se seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o, a si se seno de complemento del arco, a o, con el seno de complemento del arco, a o.

Pues multipliquemos. 64767. que es seno de complemento del arco, a o,

por.100000. que es feno todo, y ferà el producto.6476700000. el qual partido por. 99951. que es feno de complemento del arco, e o,y vendra al quociente.64798. que por las tablas le responden. 40. grad. 23. minu. 25. segund. que restados de. 90. quedan. 49. grad. 36. min. 35. segund. y tanto es el arco, a o, al qual si le juntaremos el arco, mo, que hallamos que era 2. grad. 57. min. será todo el arco, a m, de 52. grad. 23. min. 35. segund. que quitados de. 90. queda el arco, d m, de 37. grad. 26. min. 25. se-



gundos: y tanto seria la altura de la estrella Polar; estando la guarda delantera en el Norte, segun la consideración de los Pilotos. Pues restemos estos. 37. grad. 26. min. 25. segund. de. 40. grad. 22. minut. que ponemos la altura del polo, y quedaràn. 2. grad. 55. min. 35. segund. y tanto está mas baxa la estrella Polar, que el Polo, estando la guarda delantera en el Norte, segun la consideración de los Pilotos.

Si quisseremos saber, que tan grande es el arco, h.b., que es lo que la guarda delantera se aparta del Norte verdadero, para que el Vertical, a b m d, ab m d, passe por entrambas estrellas, que segu los Pilotos es Norte Sur, se procedera assi. En el triangulo, a e o, estan conocidos todos los lados con el angulo recto, o: pues como se ha el seno del arco, a e, q es: 76191. con el seno del angulo, a o e, que es el seno todo, assi se ha el seno del arco, a o, que es: 76164. con el seno del angulo, a e o. Pues multipliquemos 76174. por 100000, que es seno todo, y el producto, partiremos por 76191. y vendra al quociente 99964. que serà seno del angulo, a e o, que por las tablas le responden 88. grados. 29 minutos: de los quales restandos 3. grad. 45. minutos, que sue el angulo, b e o, que darà el angulo, b e a, de 4. grad. 44. minu. y tanto es el arco, h b, que es lo que la guarda delantera, se apartò del punto, h, para que el Vertical, a b m d, passas ginan los rumbos en la estrella Polar.

De aqui se sigue, que tambien la estrella Polar se tiene de llegar al puto, g, otro tanto como la guarda delantera se aparto del punto, h, y assi aura del punto, g, al punto, m, donde es el lugar de la estrella polar. 32. grad. 54 min. 30. segundos: y desta suerte aura entre las dos estrellas. 217.

grad. 38. minut. 30. segund. de ascension recta.

Quando la guarda delantera esta en el Sur, segun la consideran los Pilotos, quanto esta mas alta la estrella Polar que el Polo.

Ves tenemos tratado, quando la guarda delantera està en el Norte, segun q los Pilotos la considera, quanto mas alto està el Polo que la estrella Polar; aora trataremos, quando la guarda delantera està en el Sur, segun la mesma consideración de los Pilotos, quanto esta mas baxo el polo que la estrella polar. Descriuase la figura siguiente, en la qual sea el Meridiano el circulo, a e c, el centro del mundo, p, el Orizon, te, p c d, el polo del mundo, e, sobre el qual se descriuan los paralelos d al rededor del hazen las estrellas, polar, y guarda delatera. Estando sa guarda delantera en el Sur, la estrella polar estara a la parte del Norte: pues descriuale vn Vertical, am b d, que passe por entrambas ellas, y sera el punto,m,donde esta la estrella polar, y el punto,b, donde esta la guarda delantera, descriuante los circulos maximos, e m, e b. Pues ha de auer entre las dos estrellas. 217. grad. 38. min. 30. segundos, de ascension recta. fera el angulo, b e m, 142, grados. 21, minut. 30, fegund. como queda dicho atras. Los lados, e b, e m, desta figura, son y guales a los lados, e b, e m, de la figura precedete: y el angulo, b e m, de la vna ygual al angulo, b e m, de la otra. Pues si del punto, e, se tirare el circulo maximo, e o, perpendicular fobre,b m, ferà el arco,o e, desta figura, y gual al arco,o e, de la pasfada:por lo qual el triangulo, e o m, desta figura, serà ygual al triangulo,

e o m, de la precedente: y el lado, o m, deste triangulo, y gual al lado, o model otro triangulo. Tambien los lados, a c, e o, de la figura passada, son y guales a los lados, a e, e o, desta figura: y en cada v na dellas, el angulo, o, es recto; luego el bassa, a o, de la v na, es y gual al bassa, a o, de la otra. Teniamos demostrado en la figura precedente, que el lado, a o, era. 49. grados. 36. minut. 35. segund. luego sera otro tanto el lado, a o, desta figura. Tambien se demostro, que el arco, o m, era. 2. grad. 57. minut. pues quitando el arco, o m, del arco, a o, quedara el arco, a m, de. 46. grad. 39. min. 35. segund. que es el complemento de la altura de la estrella polar: pues restando el arco, a m, de. 90. queda el arco, d m, de. 42. grad. 20. minut. 25. segundos, que es la altura de la estrella polar, quando estuuo en va misso segundos, que es la altura de la estrella polar, quando estuuo en va misso.


mo Vertical con la guarda delatera, estando la guarda en el Sur. Pues restemos el arco, c.e, que es la altura del polo que pusimos, de.40.grad.22.minu.de.43.grad.20.minut.25.segund.que es el arco, d m, y quedaran 2.grados.58.minu.25.segund. y tanto esta mas alta la estrella polar que el polo, por lo qual, estando la guarda delantera en el Sur, segun que lo consideran los Pilotos, se han de quitar de la altura de la estrella polar, 2.grad.58.min. 25.segund. para que que de la altura del po-

lo, que es lo que se propuso que se auia de saber.

Aunque lo que auemos dicho, queda demostrado Geometricamenre, podria alguno dudar, diziendo, que al principio pusimos vna figura, en que demostramos que quando la guarda delantera estaua en el Norte, era mas lo que se añadia a la altura de la estrella polar, que lo que se quitaua de la mesma altura de la estrella, quando la guarda delantera estaua en el Sur; aora tenemos demostrado, que es mas lo que se quita quado la guarda delantera esta en el Sur, que lo que se añade quando la guarda delantera esta en el Norte. Para demostror la causa desta variedad, prouemos lo primero, que el angulo, h e n, desta figura, es menor que el angulo, g e m, de la figura precedente. Descriuamos la figura figuiente. en la qual pongamos la guarda delantera, y la estella polar, en el Norte, y Sur, como en las demas figuras precedentes. Si quando la guarda delantera vino a estar en el Sur, la estrella polar estuuiera tan apartada del Norte ala parte del Oeste, como lo estudo del Sur, a la parte del Leste. quando la guarda delantera estuno en el Norte, avia de venir al punto, o; porque el angulo, he o, es y gual del angulo, g e m, y passando vn Vertical por el punto, o, y por la guarda delantera, que pongamos que estava en el punto, x, haria el angulo, g e x, mayor que el angulo, h e o. Quando la estrella polar estaua en, m, y la guarda delantera en, b, y passaua por entrambas el Vertical, a b m, el angulo, h e b, era menor gel angulo, g e m, y auia

y auia entre las dos estrellas, 217. grados. 38. minutos. 30. segundos, que es la ascensión recta que ay entre las dos estrellas. Pues quitando del cir-


culo, brf, el medio circulo, hrg, valdra los angulos, heb, gef,el restante para 217. gra. 38.minn. 30. fegund. Si quando la estrella, o guarda delantera està en el Sur, ponemos la estrella polar en, o, seria la ascension recta que ay entre ellas, el arco, rfx, el qual es mayor que 217. grad. 38. min. 30. segundos: porque siendo elarco, hfg, medio circulo, que son 180. grados: y los angulos, he o, gex, mayores q los angulos, he b, g e f, mayor sera el circulo, r f x, q el circu



lo, br f, y el circulo, br f, se puso de 217. grad. 38. min. 30. segund. luego el circulo, r fx, seria mayor que 217. grados. 38. minut. 30. segundos: luego el Vertical que passa por la estrella polar, y guarda delantera, no passa por el punto, o, sino por el punto, n, mas llegado al Meriadiano, haziendo el angulo, he n, menor que el angulo, ge m, que es lo primero que se auia de prouar.

Repitamos la figura donde prouamos, que lo que se añade a la altura

de la estrella Polar, estado la guarda delantera en el Norte, era mas que la que se quita, estando la guarda en el Sur. Prouamos en esta figura, que el arco, m r,era mayor que el arco, o n, eftando la estrella Polar en el punto,n, tan distante del 🧯 Norte, h, quanto el punto m, dista del Sur, g. Pues segun la confideracion que aora hazemos, estando la guarda delantera a laparte del Sur, no puede passar por ella, y por la estrella Polar vn Vertical, fino ef-



tando la estrella Polar entre el Norte, h, y el punto, n, como acabamos de prouar. Pues pongamos que està en el punto, i, del Zenit, a, por el puto, i, descriuamos el Vertical, a i fB, que passe por entrambas estrellas. El arco, a o, es y gual del arco, a f, y el arco, a n, es mayor q el arco, a i ; luego el arco, i f, mayor es que el arco, n o : luego tanto se puede allegar el


punto, n, al punto, h, que venga el arco, fi, a fer mayor que el arco, m r, los quales arcos fon los que se añaden, o se quitan a la altura de la estrella Polar, para que que de la altura del Polo. De manera, que segun los Pilotos consideran la guarda delantera en el Norte, y en el Sur, puede ser mas lo que se quita de la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en el Sur, que lo que se añade, estando la guarda delantera en el Norte; y eon esto queda respondido a la duda que pudieran poner acerca de lo que se ha dicho.

Quando la guarda delantera esta en el Noroeste, segun la consideración de los Pilotos, saber que es lo que se añade a la altura de la estrella Polar.

E A En la figura figuiente, el Meridiano, a h g, el Polo del mundo e, sobre el qual se descriua el paralelo que haze la guarda delantera, h bgd; yel paralelo que haze la estrella Polar, m n q. Pongamos que quando la guarda delantera esta en el Noroeste, la estre-Ila Polar esta en el punto, m, sea el Zenit el punto, a, del qual por la estre-Ila Polar se descriua vn Vertical, a mp, como lo imaginan los Pilotos. Por el punto, m, se descriva el circulo, b m d, que hagá el angulo, a m b, de 45. grados: y estando la guarda delantera en el punto, b, estara en el Noroeste, segun que los Pilotos consideran los rumbos. Del polo del mundo, e, a los puntos, b m, se tiren los circulos maximos, e b, e m, y el circulo, e m, se estienda hasta el punto, c, adonde tirando del punto, b. vn circulo mayor, haga angulos rectos con el circulo, ce. El angulo. bem, (como tenemos prouado) es de. 142 grados, 21 minutos 30 fegurdos:por lo qual el angulo, bec, restante a dos rectos, sera. 37. grados, 38. minutos. 30. segundos. En el triangulo, be c, estan conocidos dos angulos con vn lado, el angulo, b ce, es recto, el angulo, b e c, acabamos de conocer, el lado, e b, es el complemento de la declinación de la guarda delantera, que es, 14 grados. 25 minutos. 38 fegundos. Pues por la 16. dellibro. 4. de los triangulos de Monterregio, como se ha el seno recto del angulo, bce, que es el seno todo que ponemos. 100000. con el seno recto del arco, be, que es. 24915. de las mismas partes, assi se ha el seno del angulo, bec, que es: 61071. con el seno del arco, bc. Pues multiplicando.24915.por 61071.sera el producto.1521583965. del qual quitando las cinco primeras figuras de la mano derecha, que es partir por el seno todo, viene al quociente, 15215, seno del arco, bc, que por la tabla de senos le responden. 8. grados. 45. minutos, y tanto es el arco, b c. En el mesmo triangulo, por la 19 del libro 4 de Monterregio, la proporcion del seno de complemento del arco, be, opuesto al angulo recto, con el seno de complemento del arco, b c, essa misma tiene el seno de complemento

Nauegacion.

plemento del arco, ce, con el seno todo: y conuertiendo, la proporcion del seno de complemento del arco, be, es como la del seno todo, al seno de complemento del arco, ce. Pues multiplicando. 100000. por. 96845. que es feno de complemento del arco, be, es el producto.9684500000.el qual partidopor. 98836. que es seno de complemento del arco, bc, viene al quo-fi ciente. 97985. y tanto es el seno de complemento del arco, ce, que por las tablas le responden. 78. grados. 28. minutos, que restados de. 90. quedan 11.grados: 32.minut. y tanto es el arco ce, el qual juntado con 3. grad 27 min. que es el arco, em, serà todo el arco, cem, 14. grad, 59. min. En el triangulo



bem,estan conocidos los lados, eb, em, con el angulo recto, es luego por la.19. del lib.4. de Monterregio, como se ha el seno de complemento del arco, b m, con el seno de complemento del arco, b c, assi se ha el seno de complemento del arco, c m, con el feno todo; y convertiendo, como fe ha el seno todo, q es. 100000.con el seno de complemeto del arco, c m, que es. 96600. assi se ha el seno del complemento del arco, b c, q es. 98836. co el seno de complemento del arco, b m. Pues multiplicando el segundo termino por el tercero, es el producto. 9547557600. el qual partido por el seno todo, que es primero termino, viene al quociente. 95475. que son seno de complemento del arco, b m, que por las tablas le responden. 72. grados. 42. minutos, los quales restados de. 90. quedan, 17. grad. 18. min. y tanto es el arco, b m. En el mesmo triangulo, b c m, por la, 16, del libro 4.de Monterregio, como se ha el seno recto del arco, b m, que es. 29737. con el seno del angulo, b c m, que es. 100000. assise ha el seno del arco cb, que es. 15215. con el seno del angulo, e mb. Pues multiplicando el fegundo termino por el tercero, es el producto. 1521500000. el qual partido por. 29737. que es primero termino, viene al quociente. 31165. que es el seno del angulo, b m c, al qual por la tabla de senos le responden. 30. grad. 46. minutos. Pues al angulo, b m c, añadamos le el angulo a m b, que ponemos de. 45. grad. y fera todo el angulo, a m e, 75. grad. 46. min. Del polo, e, fobre el arco, a m, vega el arco, e l, en angulos rectos. En el triangulo rectangulo, el m, está conocidos los dos angulos, el m, e m la co el lado, e m, por la. 16. del lib. 4. de Moterregio, como se ha el seno del angulo, elm, que es el seno rodo, con el seno recto del arco, em, que es 6017. assise ha el seno del angulo, e m l, que es. 96930. con el seno del arco, el. Pues multiplicando el segundo termino por el tercero, es el producto. 583227810. el qual partido por el primero termino, viene al quociente. 5832. que es el seno del arco, el, que por las tablas le responden.3.grad 20.minu.40.fegundos, y tanto es el arco, el. En el mesmo

triangulo, el m, por la 19. del libr. 4. de Monterregio, como se ha el seno de coplemento del arco, e m, con el seno de coplemento del arco, e l, assi se ha el seno de complemento del arco, l m, con el seno todo: y conuersamente, como se ha el seno de coplemento del arco, el, que es. 99829. con el seno de complemento del arco, e m, que es. 99818. assi se ha el seno todo, que ponemos. 100000. con el seno de coplemento del arco, lm: Pues multiplicando.99818.que es segundo termino, por 100000. que es seno todo, es el producto. 9981800000. el qual partido por. 99829. que es primero termino, viene al quociente. 99988. que es el seno de complemento del arco, Im, que por las tablas le responden, 89. grad. 9. min. los qua-

les restados de. 90. quedan. 52. min. y tanto és el arco, l m.


En el triangulo rectangulo, a el, por la 19 del lib.4. de Monterregio, como se ha el seno de coplemento del arco, a e, con el seno de coplemen to del arco, el, assi se ha el seno de complemento del arco, al, con el seno todo: y conuersamete, como se ha el seno de coplemento del arco, el, co el seno de coplemento del arco, e a, assi el seno todo con el seno de cople mento del arco, al. El feno de coplemento del arco, el, es. 99829. el feno de complemento del arco, a e, es el feno recto de la eleuación del Polo, para donde se haze la tabla que aqui ponemos, para. 40. grad 22 min. que fu seno son. 64767. y el seno todo. 100000. Pues multiplicando. 100000. por.64767.es el producto.6476700000.el qual partido por.99829.viene al quociente. 64877. que son el complemento del arco, a l, que por las tablas le responden. 40. grad. 27. min. y tanto es el arco de Vertical, que ay del punto, l, al Orizonte; del qual arco si quitaremos. 52. minut. que es el arco, l m, quedaràn. 39. grad. 35. minu, y tanto es el arco de Vertical, que ay del punto, m, al Orizonte, que seria la altura de la estrella Polar. Pues quitando.39.grad.35.minu.de.40.grad.22.min. que es la altura del polo, quedaran. 47. min. y tanto esta mas baxa la estrella polar, que el polo, poniendo la guarda delantera en el Noroeste, segun la consideracion

Quando la guarda delantera esta en el Nor deste, segun la consideracion de los Pilotos, que imaginan los rumbos en la estrella Polar.

Ongamos la guarda delantera en el Nordeste, segun la consideracion de los Pilotos:sea en la figura figuiente, el Meridiano, a h e g: el polo del mundo, e: los paralelos de la estrella Polar, y guarda delantera, sean como en la figura passada. Pongamos que la estrella Polar esta en, m, quando la guarda delantera està en el Nordeste: del Zenit, a, por la estrella Polar venga vn Vertical, amp: por el punto, m, se descriua vn circulo maximo, d mb, que haga el angulo, dmb, de quarenta y cinco grados, y entonces estarala guarda delan-

tera en el punto, b, en el Nordeste, segun que lo consideran los Pilotos. Del Polo, e, a los puntos, b m, se descriuan los arcos, e b, e m: estiendafe el arco,m e,hasta el punto,c,de manera,que el circulo maximo que viniere del punto, b, haga angulos rectos con el arco, mec: del polo, e, fe tire el arco, el, que haga angulos rectos con, a mp. El triangulo, bec, desta figura, es ygual del triangulo, b c e, de la figura precedente, porque el angulo, b e m, desta figura, es ygual al angulo, b e m, de la figura pre cedente: luego el angulo, ce b, que es el cumplimiento a dos rectos en la vna y otra figura, son yguales: pues siendo el lado, eb, en entrambas siguras, el cumplimiento de la declinación de la guarda delantera, será vno mismo en entrambas figuras; y en la vna, y en la otra, el angulo c, es recto. Luego por la. 22. de los triangulos Esfericos de Clauio, el triangulo, bce, desta figura, es ygual al triangulo, bce, de la figura precedente: por lo qual, el lado, bc, en esta, serà ygual del mismo lado,b c,de la otra: y si al lado,c e,le anadieremos el lado,e m, que darà el lado, b e m, ygual dellado, c e m, de la figura precedente. Pues los lados, c b,c m,del triangulo,b c m,desta figura, fon yguales à los lados,c b, c m, del triangulo, b c m, de la figura precedente, que en la vna y en la otra, cotienen el angulo recto. Por la.36. del lib.3. de Monterregio, el triangulo b c m, desta figura, serà ygual del triangulo, b c m, de la figura precedente. Luego el angulo, b m e, es. 30. grad. 46. min. el qual quitado del angulo,a m b,que es. 45. grad. quedará el angulo,a m c, de. 14. grad. 14. minut. En el triangulo rectangulo, el m, como se ha el seno del angulo, el m, que es el seno todo, co el seno del arco, e massi se ha el seno del angulo, l m e; con el seno del arco, le. Pues multiplicando. 6017: que es seno del arco; e m, por. 24587. que es seno del angulo, l m e, serà el producto. 14793979. el qual partido por 100000 que es seno todo, viene al quociente. 1479. que son seno del arco, el, que por las tablas le responden. 50. minut. 52. fegundos, y tanto es el arco, le. En el mismo triangulo, el m, como se ha el seno de complemento del arco, e m, con el seno de complemento del arco, el, assi se ha el seno de complemento del arco, m l, con el seno todo: y conuersamente, como se ha el seno de complemento del arco, el, con el seno de complemento del arco, e m, assi el seno todo con el seno de co plemento del arco, m l. Pues multipliquemos. 99818. q es seno de complemento del arco, e m, por. 100000. seno todo, y serà el producto. 9981800000.el qual partido por 99988. seno de complemento del arco, el, viene al quociente. 99829. seno de complemento del arco, ml, que por las tablas le responden. 86. grad. 39. minut. los quales restados de. 90. quedan 3.gra 21.min. y tanto es el arco, lm. En el triangulo rectangulo, a le, está conocidos los lados, a e, q es el coplemero de la altura del Polo: y el lado, el, acabamos de conocer, y el angulo, l, es recto. Pues por la. 19. del lib.4. de Monterregio, como se ha el seno de complemento del arco, a e, con el seno de complemento del arco, e l, assi se hà el seno de coplemento del arco, a l, con el feno todo: y conuerfamente, como se ha el feno de complemento del arco, el, que es. 99988. con el seno de complemento del arco, ae, que es. 64767. assi se ha el seno todo, que es 10000 con el seno de complemento del arco, al. Pues multipli-

cando fegundo termino, por el tercero, es el producto. 6476700000. el qual partido por el primero termino, que cs. 99988. viene al quociente, 64774. que es seno de complemento del arco, al, que por las tablas le responden. 40. grad. 22. min. 19. segun. y tanto es el arco de Vertical que ay del punto, l, al Orizonte: del qual si quitaremos el arco, ml. que es de 3. grad. 21. minut. quedaran. 37. grad. 1.min.19 fegundos, y tanto es el arco de Vertical que ay del punto, m, al Orizonte, que es la altura de la estrella polar. Pues restando. 37. grad. 1. minu.



19 segund. de. 40 grad. 22 minut. que es la altura del Polo, quedaràn. 37 grad. 20 min. 41 segund. y tanto es lo que està mas alto el Polo que la es-

trella Polar, estando la guarda delantera en el Nordeste.


Quando la guarda delantera esta en el Sudueste, segun la consideración de los Pilotos.

VNQVE Sea prolixidad, pondrè las figuras fegun que confideran los Pilotos la guarda delantera en el Sudueste, y en los demas rumbos.

Sea el Meridiano, y paralelos de las dos estrellas, y polo del mundo, como en las figuras passadas; y pongamos, que quando la guarda delantera esta en el Sudueste, que la estrella Polar està en el puto, m, de la figura figuiente. Del Zenit, a, por el lugar de la estrella Polar se descriva el Vertical, a m p: y por el punto, m, se descriva el circulo, b m d, de manera que el angulo, b m p, sea de. 45. grad. porque entonces la guarda delantera estarà en su paralelo en, b, en el Sudoeste. Del polo, e, se descriva los arcos, e b, e m, y el arco, e m, se continue al punto, c: y del punto, b, venga vn arco, b c, que haga angulos rectos con, m e c: descrivas el arco, e l, que haga angulo recto con el Vertical, al p.

Enesta figura se puede demostrar, que el seno de complemento del arco, al, es ygual seno de complemento del arco, al, de la figura precedente. Tambien se demostrarà, sel arco, ml, es ygual del arco, ml, de la figura precedete: luego si añadieremos. 3. gra. 21. min. que es el arco, ml, 2.40. gra. 22. min. 19. segund. que es el complemento del arco, al, tendremos. 43. gra. 43. min. 19. seg. que es el complemento del arco, a m, y tanto

es la eleuacion de la estrella polar, estando la guarda delantera en el Sudueste. Pues restando de 43.grados.43.minutos.19.segundos la eleuacion del polo, que es. 40. grados. 22. minutos, quedan 3. grados. 21. minutos. 19.fegundos , y tanto esta mas alta la estrella polar que el polo, estando la guarda delantera en el Sudueste, segun que-lo imaginan



Quando la guarda delantera esta en el Sueste, segun la consideracion de los Pilotos.

Ongamos la figura de quando la guarda delantera esta en el Sueste, sea en la figura figuiente, Meridiano, y paralelos, y polo del mundo, como en las passadas, y pongamos, que quando la guarda delantera esta en el Sueste, la estrella Polar esta en, m. Por el ponto, m, se descriua el Verrical, a m p, y por el mesmo punto, m, se descriua el arco dmb, que haga con el Vertical, amp, el angulo, pmb, de 45. grados : v.

entonces la guarda delatera estarà en el punto, b, en el Sueste, segu la consideracion de los Pilotos. Descriuanse los arcos, em, eb, y el arco, em, se continue al punto, c, adonde viniendo el arco del punto, b, haga angulo recto con el arco, mec, del punto, l, venga el ar co, el, que haga angulo recto con alp. Demostrarse haen esta figura, con el discurso que en las pasfadas, que el arco, 1 m, es ygual al arco, lm, de la figura, de quando la guarda delantera estaua en el Nordeste, que era: 52. minutos, tambien fe demostrarà que el complemento del arco, al, desta matin




figura es ygual al complemento del arco, al, de la figura, estando la guarda delantera en el Nordeste, que alli hallamos que era. 40. grad. 27. min. Pues juntando el arco, ml, con el complemento del arco, al, tendremos el complemento del arco, a m, que sera. 41. grad. 19. minut. y tanto es la eleuación de la estrella Polar, estando la guarda delatera en el Sueste. Pues restando. 40. grados, 22. minut. que es la eleuación del Polo de 41. grados, 19. minutos, que dan. 57. minut. y tanto esta mas alta la estrella Polar que el Polo, estando la guarda delantera en el Sueste, segun la confideración de los Pilotos.


Quando la guarda delantera esta en el Leste, segun la consideración de los Pilotos, que imaginan los rumbos en la estrella Polar.

▼ Iempre se tiene de entender, que en todas las figuras, el Meridia no, y paralelos de las dos estrellas, y polo del mundo, que estan de vna manera. Pongamos que la estrella Polar esta en el punto, m, quando la guarda delantera esta en el Leste. Del Zenit, a por el puto,m, se descriua el circulo Vertical, amp: y por el mesmo punto, m,se descriua el arco, d m b, que haga angulos rectos, con el Vertical, a m p, y entonces estarà la guarda delantera en el Leste, en el punto, b, segun la confideracion de los Pilotos. Del punto, e, se descriuan los arcos, e m, e b. y continuese, e m, hasta, c, donde si del puto, b, se descriuiere el arco, b c, haga angulos rectos con, me c, descriuase el arco, el, que haga angulos rectos con,a m. Pues si bien se considera, el triangulo rectangulo, b c m. es equiangulo, y equilatero, en todas las figuras precedentes : porque el angulo, b e m, en todas las figuras es lo que falta para quatro rectos de la ascension recta, que ay entre la estrella Polar, y guarda delantera : y los lados, e m, e b, en todas las figuras es el complemento de la declinación de las estrellas: luego el lado, b m, es vno mismo en todas las figuras, y tambien el angulo, bec. Por lo qual el triangulo rectangulo, bcm, es ygual en todas las figuras, por ser el lado, b m, y los angulos, b m c, b c m; yguales en todas ellas: y no fiendo los circulos, b c, b m, y guales a medio circu lo, seran los lados, b c, m c, y guales en todos los triangulos: por lo qual rãbien el angulo, m b c, como demuestra Clauio, en la. 22. proposi. de sus triangulos Esferales.

Pues queda demostrado, que el angulo, b m c, es. 30. grad. 46. minut, restandole de 20. que es el angulo, a m b, que dara el angulo, a m c, de 59. grad. 14. minut. En el triangulo rectangulo, m l e, como se ha el seno del angulo, m l c, que es el seno todo, que ponemos. 100000. con el seno del arco, m e, que es. 6017. assi se ha el seno del angulo, l m e, que es. 85925. co el seno del arco, l e. Pues multiplicando, 6017. que es segundo termino;

por 85925, que es tercero termino, es el producto. 517010725. el qual partido por 100000 que es primero termino, viene al quociente, 5170. que es elseno del arco, le, que por las tablas le responden. 2. gra. 78. min. y tanto es el arco, le. En el mismo triangulo, Ime, como se ha el seno de complemento del arco, m c, con el feno de complemento del arco, l e, afsi se ha el seno de complemento del arco, m l, al seno todo, y conuersa. mente, como se ha el seno de complemento del arco, le, que es. 99865. con el seno de complemento del arco, e m, q es. 99818, assi se ha. 100000. seno todo, con el seno de complemento delarco; ml. Pues multiplicado 99818. por. 100000. es el producto. 9981800000. el qual partido por 99865. que es el primero termino, viene al quociente. 99952. y tanto es el seno de complemento del arco, ml, que por las tablas le responde. 88. grad.15.minut.que restados de.90.queda, 1. grad.45.min. y tanto es el arco, lm. En el triangulo, ale, los lados, a e, le, estan conocidos con el angulo recto, a le, luego como se ha el seno de complemento del arco, a e, con el feno de complemento del arco, el, assi se ha el seno de complemento del arco, al, con el feno todo: y conversamente, como se ha elseno de complemento del arco, le, con el seno de complemento del arco a e,assi el seno todo con el seno de complemento del arco,a l. Pues multiplicando,64767. que es seno de complemeto del arco,a e, por 100000. seno todo, sera el producto, 6476700000. el qual partido por.99865. q es seno de complemento del arco, le, y primero termino, viene al quo-

ciente, 64800. y tanto es el feno de complemento del arco, al, que por las tablas le responden. 40.grados,24.minu. y tanto es el arco de Vertical que ay del punto, l, al Orizote. Pues fi destos. 40.grad.24.min. restamos el arco, lm, que es. 1.gra.45.mi nut. quedara el arco de Vertical que ay del punto, m, al Orizonte, que sera de 38.grad.39 .. d minut. y tanto seria la eleuació de la estrella polar, estando la guarda delantera en el Leste, segun la consideracion de los Pilotos. Pues restemos 38.gra dos. 39. minutos, que es la altu




ra de la estrella Polar, de 40. grados. 22. minutos, que es la eleuacion del Polo, y quedarà vn grado. 43. minutos, y tanto esta mas baxa la estrella Polar que el Polo, estando la guarda delacrera en el

Quando la guarda delantera esta en el Oeste, segun que los Pilotos imaginan los rumbos.

Escrivamos Meridiano, y paralelos como en las figuras passadas. y pongamos que quado la guarda delantera esta en el Oeste, que la estrella Polar esta en el punto, m, del Zenit, a, por el punto m, le descriva el Vertical, a m p, y por el mesmo punto, m, se descriva el arco,b m d, que corte en angulos rectos al Vertical, a m p: y entonces estará la guarda delantera en el Oeste, en el punto, b. Del polo, e, ados púntos b,m, se descriuan los arcos, em, e b; y el arco, em, se continue al punto c, y del punto, b, al punto, c, se descriua el arco, b c, de manera que hagaiangulos rectos con, mec. Acabamos de prouar, como el triangulo lo me, es ygual en rodas las figuras; y el angulo, b m c, de. 30. grad. 46 minutel qual quitado del angulo recto, p.m b, queda el angulo, e.m li de, 59.grad. 14. minut. (como en la figura precedente) y fiendo el lado, e m, y no meifmo en esta figura, y en la precedente, tambien sera el lado, l ma venal en entrambas figuras, que acabamos de prouar que era de vn grado. 45 minuros. Tambien el lado, el, desta figura, es y gual al lado, el, de la passada: por lo qual los lados, a e, le, del triangulo, a e l, desta figura, son yguales a los lados, a e, le, de la passada: y el angulo, l, es recto en entrambos triangulos: luego el lado, a l, del triangulo, a e l, desta figura, es vgual al lado, al, del triangulo, a el, de la figura precedente, luego los complementos son yguales. Tambien prouamos en la passada, que el complemento de

al,era 40. grad. 24. min. a los quales si añadieremos: 1.grad-45.minut. que es el arco, 1 m, ferà el arco de Vertical, que ay del punto, m, al Orizonte. 42. grad. 9. minut. y tanto es la eleuacion de la estre-Ila Polar, estando la guarda delantera en el Oeste, segun la consideracion de los Pilotos. Pues restemos de 42.grad.9.min. la eleuacion del Polo, que pusimos de 40. grad.22.minu.y quedara. 1.grad. 47.min. y tanto esta mas alta la estrella Polar que el Polo, estando la guarda delantera en el Oeste, segun que los Pilotos imaginan que los rumbos salen de la estre-Ila Polar.




Auemos tratado algo prolixamente esta consideración que hazen los Pilotos, de la estrella Polar, y guarda delantera, porque quede bien entendido

tendido fu modo de proceder, y demostrado lo que tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, estando en qualquiera de los ocho rumbos principales la guarda delantera, segun lo consideran los Pilotos.

Por mas acertado tendria, que los Pilotos víassen de algun instruméto (como diremos adelante) para conocer en que rumbo esta la guarda delantera, porque en la imaginación que los Pilotos hazen, puede auer grande engaño, assi por falta de las reglas que para este eseto tienen, como por su consideración, y no se puede siar de semejante pratica, sino suesse estando la guarda delantera en el Norte, o en el Sur, que entonces puede auer poco error.

En esta figura se demu estra lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella polar, segun que los Pilotos consideran los rumbos, estando la guarda delantera en cada vno de estos. El primero numero es, grados: el segundo, minutos: la letra. A. dize que se añada: la. R. que se quite.



CAP. XIIII. En que se pone vna aduertencia, cerca de vn regimiento de nauegacion que hizo luan Bautista Lauana, Cosmografo mayor de Portugal.



VAN Bautista Lauaña, Cosmografo mayor de Portugal, pone en un regimiento de Pilotos que el hizo, que estando la estrella Polar en la cabeça, o en el pie, que se han de quitar, o aña-

dir.3.grados, 27. minutos, de la altura de la estrella Polar, lo qual es assi, segun la longitud, y latitud de la estrella que ponen las tablas, y la imaginación que haz en los Matematicos, que (como se dixo atras) imaginan los rumbos en el Polo: pero segun la imaginación de los Pilotos, para quie

el hizo el regimiento, es error notable, segun queda demostrado. I si dixere que los Pilotos han de considerar los rumbos en el Polo del mundo, esto no lo pueden hazer, por ser inuisible, sino es mediante algun instrumento, el qual el no enseña, ni del haz e mencion: de donde se sigue, q no aduirtio como los Pilotos consideran los rumbos, y como se tienen de hazer las reglas para vsar de su ballestilla. Tambien es defeto,no poner regla mas de para quando la estrella Polar esta en el Norte, yen el Sur: es defeto no auer hecho obseruacion de la distancia de la estrella Polar al Polo, porque segun las observaciones que en este tiempo se han hecho no dista del Polo mas de tres grados (como diremos adelante). Tampoco pone regla como conoceran quando la estrella Polar estaràen la cabeça, o en el pie. Las demostraciones que auemos hecho, no son mas de para dotrina, y para que se entienda que se procede con fundamento, que lo que se tiene de seguir se dira quando se pusieren tablas para este modo de tomar la altura del Polo. Tambien tiene otro error, que las tablas de declinacion del Sol, no estan hechas segun las obseruaciones deste tiempo: y en esto ay error, segun que por las observaciones queda demostrado.

CAP. XV. En que se pone vna aduertencia, sobre lo que dize Pedro Nuñez, que lo que auemos dichono pue de ser regla general para todas las eleuaciones de polo, estando hechas las reglas para vna eleuacion.




RVEVA Pedro Nuñez en su libro de nauegacion, que estas reglas que se dan de añadir, o quitar de la altura de la estrella polar, que estan hechas para vna eleuacion, que no son yguales estas adiciones, o subtracciones, a las que se hazen en otra eleuacion. Pues examinemos si es mucha la

diferencia, y fea en la figura figuiente, el Meridiano, paralelos, de la escrittella polar, y guarda delantera, como en las passadas; y pongamos la guarda delantera en el Norte, segun la consideran los Pilotos, en el punto, b, y entonces estarà la estrella polar en, m. Pongamos que la eleuación del polo es. 20. grados, y sento serà el

arco, e a: descriuale el Vertical, a b m d, el qual passe por la guarda delantera, y estrella polar: descriuanse los arcos del circulo mayor, e b, e m, los quales en qualquiera disposicion que estuuieren las estrellas, han de ser vnos mismos, pues son el complemento de su declinación. Tambien el augulo, be m, es el mesmo que en las figuras passadas, pues es el complemento de la ascension recta, para. 360. grad. Luego el triangulo, b e m,es el mesmo que en las figuras precedentes, por lo qual el arco, e o, tambié ferà ygual del que primero teniamos hallado. Pues en el triangulo, a e o, tenemos conocido los lados,a e,e o, con el angulo recto, o, luego conoceremos el lado,a o: porque como se ha el seno de complemento del arco, a e, opuesto al angulo recto, o, con el seno de complemento del arco e o, assi se ha el seno de complemento del arco, a o, con el seno todo: y convertiendo, como fe ha el feno de complemento del arco, e o, con el seno de complemento del arco, a e, assi el seno todo con el seno de complemento del arco, a o. Pues multiplicando. 34202. que es seno de complemento del arco, e a, y fegundo termino, por. 100000. que es feno todo, y tercero termino, fera el producto 3420200000 el qual partido por


99951. que es seno de com plemento del arco,e o, viene al quociéte. 34218. que sera seno de complemento del arco,a o, que por las tablas le responden. 20. grad. y casi vn minuto, y tanto es el arco, do. El triangulo, e o m, tambien es ygual del triangulo, e o m, de la primera figura: luego el lado, o m, de la primera figura: luego el lado, o m, de la primera figura, en la qual hallamos que era de. 2. grad. 57. minutos.



Pues quitemos del lado, do, que hallamos de. 20. grad. 1. minut. el arco de Vertical, mo, que es. 2. grad. 57. min. y quedara el arco, d m, de. 17. grados. 4. min. y tanto es la altura de la estrella polar en la eleuacion de. 20. grad. de polo, estando la guarda delantera en el Norte, segun la consideracion de los Pilotos. Pues restemos. 17. grados. 4. minut. que es el arco, d m.de.20. grad. que es el arco, c e, y quedarán. 2. grad. 56. min. que es lo que se tiene de anadir a la altura de la estrella polar, para que sepamos la altura del polo, estando la guarda delantera en el Norte, como esta dicho. Teniamos q en eleuacion de polo de. 40. gra. 22. min. se añadian a la altura de la estrella polar. 2. grad. 55. min. 35. segun. estando la guarda de lantera en el Norte: luego aun no es yn minuto de diferencia entre las dos eleuaciones de polo, co fer bie distantes la vna de la la otra Por tato, con las reglas q estan hechas para. 40. gra. 22. min. se podran seruir para las demas eleuaciones, pues la diferencia de lo que se añade, o quita a la altura de la estrella polar, no es cosa sensible en las demas elevaciones. Exami-

Examinemos tambien en esta eleuacion de. 20. grad. quando la guarda delantera estuniere en el Sur; quanto es lo que se tiene de quitar de la altura de la estrella polar, para que quede la altura del Polo. Sea en la figura figuiente el Meridiano, y el Orizonte, el polo, y paralelos de estrellas, como en la precedente, y puesta la guarda delantera en el Sur, en, b, v la estrella polar a la parte del Norte en, m: claro esta (como tenemos dicho) que los lados, be, e m, que hã de fer los mismos, y el angulo, be m, que en la figura precedente: y tambié el arco, e o: luego fiendo los lados, a e,e o,de la figura precedete: y el lado,a e,opuesto al angulo recto, y gual al lado, a e, de la figura precedente, tâbien opuesto al angulo recto: luego el lado, a o, desta figura, sera ygual al lado, a o, de la figura precedente. Pues en la figura passada, el complemento del lado, a o, fue. 20. grados. 1. minuto, que es el lado, do: y el arco, o m, es. 2. grad. 57 minut. que juntados con. 20. grad. 1. minut. que és el arco, do, sera todo el arco, dm, 22. grad. 58. minut, y tanto es la altura de la estrella polar en eleuacion de 20. grad. del polo, estando la guarda delantera en el Sur, segü la consideracion de los Pilotos. Pues quitemos de. 22, grad. 58. minutos, que es la

altura de la estrella polar, 20. grados, que es la eleuación del polo, y quedarán 2. grados. 58 minutos, los quales se tienen de quitar de la altura de la estrella polar, para que quede la altura del Polo. En eleuación de. 40. grados. 22. minutos, se quitauan otros tantos estando la guarda delantera en el Sur, y la estrella polar a la parte del Norte, de la altura que tenia, para que quedasse la altura del polo



como fe dixo en fu lugar: por lo qual las reglas de.40. grados, 22. minutos feruiran para las demas eleuaciones.

C A P. XV. Que trata de las quatro estrellas del Cruz.ero.



VANDO A los Pilotos se les encubren las estrellas de la parte del Norte, se les descubren otras estrellas, que estana la parte del Sur, aunque no tan cercanas al polo, como las que estan a la parte del Norte. Las mas cercanas que estan del polo, son quatro estrellas que estan en los

pies del Centauro, como parece en esta figura: y porque las quatro estrellas, a b e d, hazen figura de cruz, las llaman el Cruzero. Destas quatro estrellas solamente vían de las dos los Pilotos: de la que esta en el talon del pie yz quierdo, q es la que tiene la letra, a, se siruen como de la estrella polar.

Nauegacion.



Segun la dorrina de Copernico, y de otros modernos, la estrella, a, que està en el talon del pie yzquierdo del Cétauro, està en dos grados de Escorpion, con mas. 30. min. Y este año de 1594, tiene de latitud, como auemos dicho, 55.gr. 40.min. Pues segü esta longitud, y latitud, por las tablas de direció de Monterregio, o de Erasmo Reynoldo, examinemos su declinacion y ascension recta. Entrando en la tabla general de declinacion, debaxo del titulo, Arcus, enfréte de 2. gra. 30. mi. de Escorpion, estan 13. gra 7.min.45.feg. y debaxo del titulo, Numerus multiplicadus, está este numero.9419151. Iuntemos la latitud de la estrella, con los 13. gra.7. min-45.feg. como manda el precepto, y feran 68.gra.47.min.45.feg.cuyo feno recto es,9322186. partes, de las quales el seno todo tiene, 10000000. Pues multipliquemos, 9322186. por el numero Multiplicando, que es, 9419151. y serà el producto, 87807077584086. del qual quitado siete letras de la mano derecha, por quantos ceros tiene el seno todo despues de la vnidad, y quedară, 8780707-partes, las quales son seno de la declinació de la estrella, q por las tablas le responden 61. gr. 25. min. y tanto tiene de declinació Austral la estrella q està en el talon del pie yzquierdo del Ce tauro:por lo qual está apartada del polo Austral. 28. gra. 55. min. que es el complemeto de la declinacion, y no. 30. gra. como los Pilotos piensan: y el que dà regla en su libro, seria bié que lo aueriguasse por arte, y no por opinion de Pilotos. Pues sabida la declinacion, sepamos su ascension re-Aa. Entrando con la longitud de la estrella en la tabla general, Cæli mediarionu, debaxo del titulo, Radix ascensionum, enfrente de. 2. gr. 30. mi. de Escorpió estan. 214. gra. 46. min. 49. seg. y debaxo del titulo, Númerus multiplicadus, estan. 3565624. En la tabla del Canon facundo, responden a 61.gr. 25. min que es la declinación de la estrella, 18353997 el qual numero multiplicaremos por, 3565624. q es el numero Multiplicando, y fera el producto, 65443452199128. del qual quitado fiete letras de la mano derecha, quedan, 6544345. partes, las quales son seno de la diferencia, Transitus medij cali, que por las tablas de senos le responden, 40. gr. 53. min.los quales aquise tienen de restar de. 214. gra. 46. min. 49. seg. q era la radix ascensionum, y quedarán. 173. gr. 53. min. 49. seg. y tanto es la ascensió recta desta estrella, q por las tablas de ascensiones rectas, media el cielo co 23.gr. 20.min.de Virgo:y quando el sol estuuiere en 23.gra.de Piscis,

Piscis, ésta estrella estará en el Meridiano a la media noche, que sera a

los catorze dias de Marco.

La longitud de la estrella que està debaxo de la rodilla del pie derecho del Centauro, es vn grado. 20. minut. de Escorpion, y su latitud. 51. grad. 10. min. como está dicho. Pues entrando en la tabla general de las declinaciones, con vn grado. 20. min. de Escorpion, debaxo del titulo Arcus, está 12. gra. 43. min. y debaxo del titulo, Numerus multiplicadus, está este numero. 9403753. Pues juntemos los. 12. gra. 43. min. con. 51. gr. 10. min. que es la latitud de la estrella, y sera todo. 63. 53. min. cuyo seno es 8978996. partes, de las q el seno todo tiene. 10000000. Pues multiplique mos. 8978996. por 9403753. que es el numero multiplicando, y sera el producto. 84. 136260 571988. del qual quitando siete letras de la mano derecha, que dan. 8443626. partes, las quales seran seno de la declinacion de la estrella, q por las tablas de senos, cuyo seno todo es, 100000000. le responden. 57. grad. 37. min. y tanto es la declinacion desta estrella.

Para saber su ascension recta, entraremos en la tabla general, Celi me. diationum, con la longitud de la estrella, y enfrente de yn grado, 20. min. de Escorpio, debaxo del titulo, Radix ascensionu, estan. 213. gra. 24. min. 20. seg.y debaxo del titulo, Numerus multiplicandus, esta este numero. 2617049. Entrado en la tabla de Tangentes, o Canó fæcundo, con 57. gra-37. min. que es la declinacion de la estrella, le responden. 15767616. Pues multiplicado este numero, por el numero multiplicando, q era 3617049. fera el producto, 57032239685184. del qual quitaremos fiere letras de la mano derecha, y quedară, 5703223. partes, las quales fon feno de la diferencia, Transitus medij cæli, q por las tablas de senos le responde 34 gra-46.min.los quales se tiene de quitar de 213.gr. 34.min.20.seg.q es la Radix ascensionu, y quedan.178. gr. 48 mi. 20. seg. y tanto es la ascension re-Aa de la estrellaq esta debaxo de la rodilla del pie derecho del Centauro, y por las tablas de ascensiones rectas, media el cielo con. 28. gra. 40. min. de Virgo. De suerte que estado el Solen. 28. gr. 40. min. de Piscis, estarà esta estrella a la media noche en el Meridiano, q sera a los. 20. de Março.

De suerte que entre la ascensió recta de la vna y otra estrella, no ay de diserencia mas de. 4. gr. 54. min. 31. seg, que por ser tan poca, se podra dezir, que quado la vna estuuiere en el Meridiano, tambié lo estara la otra; y segun esta consideracion haremos la cuenta desta estrella, assi por euitar prolixidad, como porque pocas vezes es menester tomar la altura

del Polo por estas estrellas, como se vera adelante.

C A P. XVII. Que trata de lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella que esta en la rodilla derecha del Centauro, estando en alguno de los. 8. rumbos.

Estando la estrella de la rodilla derecha del pie del Centauro en el Norte.

Quanto

Nauegacion.


50

VANDO La estrella de la rodilla derecha del pie del Centauro estuniere en el Norte la estrella del tasó del pie yzquierdo, tambien estarà en el Meridiano, o muy cerca, como arriba aduertimos : por lo qual de la altura que tuviere la estrella del talon, se tienen de quitar. 28. grad. 35.

minutos, para que quede la altura del polo, porque otros tantos esta mas alta lá estrella que el Polo.

Estando la estrella del Talon del pie yzquierdo del Centauro en el Leste, o Oeste.

d K, por, 64278, que es seno de comple...
mento del arco, da, y sera el producto
50443797300. el qual partido, por
100000. que es seno todo, y sera el
quociente, 56443. partes, que seran seno de complemeto del arco, a K, y por
que, K e, es el complemento del arco,
a K, seran las, 56443. partes, seno del arco, K e, que es lo que la estrella està seuantada sobre el Orizonte, que por las
tablas de senos, es. 34. grad. 22. minut. y
tanto es el arco, K e: el qual restado del
arco, b d, que es sa altura del polo,



quedan.5.grados,38.minutos, y tanto està mas alto el polo que la estrella, estando en el Oeste, o Leste: por lo qual estandò la estrella en estos dos puntos, se tienen de añadir a su altura.5.gra-

dos. 38. minutos, para tener la altura del Polo.


I 2

Estando

Regimiento de Estando la estrella del talon del pie yzquierdo del Centauro, en el Nordeste.

Epitamos la figura precedete, y pongamos la estrella en el Nora deste, en el punto, l, y tirese el vertical, a l e, y sera el arco, e l, la altura de la estrella sobre el Orizote. Pues para conocer q tanto es el arco, el tirefe el arco, dl, que fera el rubo del Nordeste, tirefe el arco, 1 m, perpendicular fobre, da. En el triangulo, l m d, està conocido el lado, dl, q es. 28. gra. 35. min. q es el coplemento de la declinació de la estrella, y los dos angulos, lm d, q es recto. y, ld m, q es 45 gra Pues como fe ha el feno todo, con el feno del arco, dl, afsi fe ha el feno del angulo, m dl, con el seno del arco, m l. Pues multipliquemos. 47843. q es seno del arco, d l. por.70710. q es seno del angulo, m dl, y sera el producto.3382978530.el qual partido por 100000 q es seno todo, sera el quociente. 33829 partes, las quales son seno del arco, m l, q por las tablas de senos, es 19.gr. 46.mi. Mas en el triagulo mismo, como se ha el seno de coplemeto del arco, d l, con el seno de coplemento del arco, l m, assi se ha el seno de coplemento del arco, m d, co el seno todo y convertiédo, como se ha el seno de cople mento delarco, l m, con el feno de coplemento delarco, l d, assi el feno todo, con el seno de complemento del arco, d m. Pues multipliquemos 84448. q es seno de coplemento del arco, d l, por 100000. q es seno todo, y sera el producto. 8444800000. el qual partido por. 94107, q es seno de complemento del arco, m d, viene al quociente. 89736. partes, las quales

fon feno de coplemento del arco, d m, q por las tablas de fenos le responden: 63. gra. 49 min. y lo q falta para 90. son. 26. gra. 11 min. y tato es el arco, d m, el qual restado de 50. gra. q es el arco, d a, que da 23. gra. 49 min. y tanto es el arco, m a. En el triangulo, a m l, estan conocidos los lados, a m, ml, con el angulo recto, m: pues como se ha el seno de complemento del arco, a l, co el seno de coplemento del co, a m, assi se ha el seno de coplemento del arco, m l, con el seno todo; y conuer-



tiendo, como fe ha el feno todo, con el feno de coplemento del arco, m 1, afsi fe há el feno de coplemeto del arco, m a, co el feno de coplemeto del arco, m 1, pues multipliquemos. 94107. Que se feno de coplemento del arco m 1, por 91484. Que se feno de coplemento del arco, m a, y fera el producto, 8609284788. el qual partido por 100000. Que se feno todo; y viene al quociente. 86092. partes, las queles fon feno de coplemento del arco, al, que por las tablas de fenos, es. 59. gra. 25. min. y tanto es el arco, le, pues es coplemento del arco, la. Luego estando la estrella en el Nordeste, tiene de altura fobre el Orizonte. 59. gra. 25. min. de los quales, si restaremos. 40. gra. que ponemos de altura de Polo, quedan. 19. gra. 25. min. y tanto està

mas alta la estrella que el Polo, estando en el Nordeste, en el punto, I, por lo qual se quitan de la altura de la estrella. 16. grados, 25. minutos, para que que de la altura del Polo.

Estando la estrella en el Noroeste, tiene la mesma altura que en el Nordeste, y assi se quitaràn los. 19. grados, 25: minutos de la altura de

la estrella.

Quando la estrella estuniere en los rumbos contrarios, de Nordeste, y Noroeste, se le añadiran a la altura de la estrella, los, 19, grad. 25, minuta para tener la altura del Polo; aunque en estos rumbos pocas vezes se verà esta estrella, a causa de que no llegan los, que nauegan a tanta altura, que estando en estos rumbos les quede encima del Orizonte.

Siguese la figura en que se tiene de añadir, o quitar ala altura de la estrella, estando en qualquiera de los ocho rumbos. El primero numero es grados: el segundo, minutos: la letra. A. dize que se añadan: la. R. que se quiten.



Resta de dezir como se sabra quando esta estrella del talon del pie yzquierdo del Centauro, llega a qualquiera de los ocho rumbos, quando esta estrella estuuiere con la que està debaxo de la rodissa del Centauro, en vn Vertical, es señal q està en el Meridiano, o le salta poco. Quando esta estrella llega a los demas rumbos, puede auer engaño, sino se conoce por alguninstrumento; el qual enseñaremos adelante, juntamente con otros, que para la nauegacion son de importancia. La sigura que tienen estas estrellas del Cruzero, se puso atras.

CAP. XVIII. Que trata quanto està mas alta, o mas baxa la estrella Polar que el Polo, estando en qualquiera de los ocho rumbos principales.

O Primero enseñamos, quando la guarda delantera estava en alguno de los ocho rumbos, segun se imaginan en el polo del mundo, quanto la estrella Polar estava mas alta, o mas baxa que el Polo. Despues,

fegun que los Pilotos imaginan los rumbos, en la estrella Polar, y se hizieron reglas para quando la guarda delantera estuuiesse en qualquiera destos rumbos, para saber quanto mas alta, o mas baxa estaua la estrella Polar que el Polo: aora queremos dar regla, para quando la estrella Polar estuuiere en alguno de los ocho rumbos, de los que se imaginan en el polo del mundo, quanto està mas alta, o mas baxa que el Polo.

Para conocer quando la estrella polar estara en alguno de los ocho rumbos, se enseñarà adelante vn instrumento con que se podra conocer, y otras cosas a este proposito. Pues examinemos quanto mas alta, o mas

baxa estarà en cada vno de los ocho rumbos.

Estando la estrella Polar en el Norte, o en el Sur, quanto esta mas alta, o mas baxa que el Polo.


Stando la estrella polar en el Norte, o en el Sur, esta. 3. grad. 27. minutos, apartada del Polo, porque su declinacion es. 86. grados, 33. minutos, como atras que do demostrado: assi quando la estrella polar estuniere en el Norte, está mas alta que el Polo. 3. grad. 27. min. por lo qual se quitaràn de la altura de la estrella polar, para que que de la altura del polo. Pero estando la estrella polar en el Sur, està mas baxa que el polo. 3. grad. 27. minut. por lo qual se tienen de añadir a la altura de la estrella polar, para que que de la altura del Polo. Esto seria, si ta estrella polar tuniesse la declinación que ponen algunos autores, pero segun nuestra observacion es mayor la declinación que esta estrella tiene, como se dira adelante: pero por aora vamos con la declinación que segun la longitud, y latitud le ponen.

Quando la estrella Polar esta en el Leste, o en el Oeste.

27. minut. que es lo que se aparta la estrella polar del polo. Pues por la 19. de los triangulos Essericos de Monterregio, como se ha el seno de complemento del arco, a K, con el seno de complemento del arco, K e, assi se ha el seno de complemento del arco, a e, con el seno de complemento del arco, a e, assi se ha el seno de complemento del arco, a e, assi se ha el seno de complemento del arco, a K, Pues multipliquemos, 64767, seno de complemento del arco, a e, que es segundo termino, por 199818, seno de complemento del arco, a e, que es segundo termino, por 199818, seno de complemento del arco, a e, que es tercero termino, y sera el producto. 6464912406, el qual partido por 100000. Se seno todo, viene al quociente. 64649 partes, que son seno de complemento del arco, a K, al qual seno, por las tablas le responden. 40. grad. 17. minu. y tanto esta leuantada seno, por las tablas le responden. 40. grad. 17. minu. y tanto esta leuantada

la estrella polar sobre el Orizonte, estando en el Oeste, que son, 5. minutos menos que la altura del Polo.

Quando la estrella polar esta en el Leste, que es el punto, i, està mas baxa que el Polo otros cinco minutos, porque el triangulo, a e l, es equiangulo, y equilatero del triagulo, a e K, porque los lados, a e, e l, son yguales de los lados, a e, e K, y los angulos, a e l, a e K, son rectos: luego el lado, a l, es ygual del lado, a K: por lo qual quando la estrella polar estuuiere en lesta tan alta sobre el Orizonte, co-




mo quando estuniere en, K, y assi estan en vna misma disposicion con el Polo.

La estrella Polar en el Nordeste, o Noroeste.

Ongamos que la estrella polar esta en el Nordeste, o Noroeste, y queremos saber quanto esta mas alta que el polo: para lo qual sea en la figura figuiente, el Meridiano, a e g: el polo del mundo, c, le-uantado sobre el Orizonte, 40. grad. 22. minut. Sobre el polo, e, se descriua el paralelo que haze la estrella polar al rededor del polo, y sea, h K gl. Pongamos la estrella polar en el Nordeste, en el punto, b, y descriuase el Vertical, a b: y del punto, b, al polo, e, se descriua el arco, b e. Tambien se descriua, b c, perpendicular sobre, a e. En el triangulo, b c e, estan conocidos los angulos, b c e, b e c, por s, b e, es resto; y, b e c, es de 45. grad. y el lado, b e, es. 3. grad. 27. minutos. Y por la 16. del lib. 4. de Monterregio, como se ha el seno del angulo, b c e, al seno del arco, b e. Pues multipliquemos. 6104. que es seno del arco, b e, por 1707 so, que es seno del angulo.

c e b,y fera el producto. 431613840, el qual partido por 100000, que ponemos seno todo, viene al quociente. 4316, partes, que serán seno del arco, b c, que por las tablas le responden. 2. grad. 28 minut. 28. segundos. Mas en el mesmo triangulo, como se ha el seno de complemento del arco, b e, al seno de complemento del arco, b c, assis se ha el seno de comple-

mento del arco, e c. al seno todo: y connertiendo, como se ha el seno de complemento del arco, c. b., al seno de complemento del arco, c. e. Pues siguiendo la regla de proporcion; multipliquemos. 99818. seno de complemento del arco, b. e, por el seno do, que es 100000. y sera el producto. 9981800000. el qual partido pon 99906. seno de complemento del arco, b., viene al quociente, 99912. partes, que son seno de complemento del arco, c. e, que por las tablas le responden. 87. grados, 36. minutos, que restados de. 90. que estados de son que restados de son que restado de son q



dan dos grados. 24 minutos, y tanto es el arco, ce, el qual fi le restamos del arco, a e, que es. 49. grados, 38. minutos, quedaran. 47. gragrad. 14. minut. y tanto sera el arco, a c. En el triangulo rectangulo, a b c, estan conocidos los lados, a c, c b, con el angulo recto, a c b : luego como se ha el seno todo, al seno de complemento del arco, c b, assisse ha el seno de complemento del arco, a c, al seno de complemento del arco, a b. Pues multipliquemos, 99906. seno de complemento del arco, c b. por, 67901. seno de complemento del arco, a c, y sera el producto, 6783717306 el qual partido por el seno todo, que es 100000, viene al quocieme, 67837. partes, a las quales por las tablas le responden. 42. grad. 43. minu. y tanto està leuantada la estrella polar sobre el Orizote, estando en el Nordeste: porque el complemento del Vertical, ab, para. 90. es lo que se leuantala estrella sobre el Orizonte. Pues restando. 40. grad. 22. minut, que es la eleuacion del Polo. de 42. grad 43. minut. q es la altura de la estrella, que dan-2.grad.21.minut.y tanto està mas alta la estrella que el Polo. Por lo qual, quando la estrella polar estuuiere en el Nordeste, se tiene de quitar de su altura. 2. grad. 21. min. para que que de la altura del Polo.


La estrella Polar en el Noroeste.

Vando la estrella Polar estuuiere en el Noroeste, tiene la mesma altura que en el Nordeste. Pongamos la estrella polar en el Noroeste, en el punto, d, y descriuase el Vertical, a d:y del punto, d, se descriua el arco, d c, perpendicular sobre, a e. El triangulo, a b c, tiene les angulos, b a c, a c b, yguales a los angulos, d a c, a c d, porque los angulos, b e a, de a, en entrambos triangulos son yguales: y los angulos al puto, c, son rectos: y el lado, a c, es comun: luego los demas lados del voltriangulo, son yguales a los del otro, por lo qual diremos, quando la estrella polar estuuiere en el Noroeste, tiene la mesma altura que en el Nordeste.

en el Sueste.

Ongamos en la figura figuiente, la estrella Polar en el Sudueste, en la qual el Meridiano, Polo, Zenit, y paralelo, es como en la passada. Tenemos el punto, d, medio entre, K g, y serà el Sudueste. Descriuase el Vertical, a d, cuyo complemento fera la altura de la estrella polar sobre el Orizonte: descrivase el arco, de b, y sera el punto, b, el Nordeste, contrario al Sudueste: descriuase los arcos, d'in, b c, perpediculares sobre, a g: los triangulos, dm e,b c e, son de yguales lados, y angulos porque los angulos, bce, dme, fon rectos, y los angulos, bec, dem, ponemos y guales: y el lado, b e, es y gual del lado, d e ; luego el otro angulo, y demas lados, fon yguales. Teniamos que el arco, b c, era, 2. grad. 28. minut, 28. fegund. luego fera otro tanto el arco, d m, y el arco, e c, era de. 2. grad. 24. minut. tambien sera, e m, de otro tanto. Pues siendo el arco, a e, 49. grad. 22. min. y añadiendole. 2. grad. 24. minut. sera todo el arco, a m. 51. grad. 46. min. En el triangulo rectangulo, a m d, estan conocidos los lados, a m, m d, con el angulo recto, a m d. Pues como fe ha el feno de complemento del arco a d, al seno de complemento del arco, am, assi se ha el seno de complemento del arco,m d,al seno todo: y conuertiendo, como se ha el seno todo, al seno de complemento del arco, d m; assi se ha el seno de complemento del arco, a m, con el seno de complento del arco, a d. Pues multi-

mento del arco, a m, con esteno de complemento del arco, d m, por, 61886. feno de complemento del arco, d m, por, 61886. feno de complemento del arco, a m: y fera el producto, 6182782716. el qual partido por 100000. que es feno todo, viene al quociente, 61827. partes, que fon feno de complemento del arco, a d, a las quales por la tabla de fenos le responden. 38. grad. 11. minut. y tanto es la altura de la estrella polar, estando en el Sudueste. Pues restando. 38. grad. 11. minut. de. 40. grad. 22. minut. que es la eleuacion de Polo, quedan. 2. gra. 11. minut. y tanto está mas alto el polo que la estrella. Por lo qual estando la estrella polar en el trella.



Sudueste, se tienen de anadir a su altura. 2. grad. 11. minut. para que quede la altura del Polo.


La estrella Polar en el Sueste.

Vando la estrella polar esta en el Sueste, tiene la mesma altura que en el Sudueste, porque los triangulos, a d m, a f m, son de lados yguales, y angulos. Es de aduertir, que lo que se quita de la altura de la estrella polar, estando en el Nordeste, o en el Noroeste, no es ygual a lo que se añade a la altura de la estrella, estando en los rumbos contrarios. La demostración queda dicha atras.


Pero quando la estrella polar estuuiere en el Norte, lo que entonces se quita, es ygual a lo que se añade estando en el Sur.

Tambien estando la estrella polar en el Oeste, o Leste, tiene vna misma altura sobre el Orizonte.

Siguese la figura fegun esta consideracion, donde se pone lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, estando en alguno de los ocho rumbos, para que quede la altura del Polo.




CAP. XIX. Que trata de las leguas que ay entre dos lugares en la carta de Marear, segun que lo miden los Pilotos, por las reglas de sus regimientos.



ra rumbo: legun la comun opinion, caminando por el Meridiano, responde a cada grado de eleuacion de Polo.17. leguas y media Españolas: pero para quado se nauega por otro qualquiera rumbo, se hizo la tabla siguiéte, en la qual se ponen las leguas que responden a cada grado de eleuacion de polo, nauegando por qualquiera de las ocho quartas, como parece en la figura, la qual se entiende desta manera.

Sea la Equinocial, a b:fea algun Meridiano, ca, y pongamos gamos el paralelo, c d, apartado de la Equinocial vn grado. Pues faliendo vna nao del punto, a, y nauegasse por el Meridiano, a c, quando llegasse al punto, c, tendria caminado. 17. leguas y media. Y si nauegasse por vna quar ta de viento apartada del Meridiano, como por la linea a e, quando llegasse al paralelo, c d, auria caminado. 17. leguas y seysochauos de legua, que son tres quartos. Y nauegando por la segunda quarta de viento, que seria por la linea, a f, quando llegasse al paralelo, c d, auria caminado. 18. leguas y siete ochauos de legua: y assi quanto la quarta de viento por donde se nauega, estuiiere mas apartada del Meridiano, tanto mas leguas aura caminado, a vn mismo grado de eleuacion de Polo, como



caminando por la.7. quarta, que es por la linea, a d, quado llegare al paralelo, c d, aura caminado. 89. leguas y tres quartos. Quando caminare por la Equinocial, o por qualquiera paralelo, no puede faber lo que tiene caminado, por que va siempre por vna eleuación de polo, y assi esto queda a la fantasia del Piloto: y esto es lo que dizen los regimientos hasta aqui. Para mas certeza, vsen de medir estas distancias por los troncos de

leguas que pondremos adelante.

Regimiento de CAP. XX. En que se examinalo que dize Pedro Nunez en su libro de nauegacion, en el cap. 2.

R. V.E. V.A. Pedro Nuñez, en el cap. 2. del lib. de nauegació, que fi huniere dos pueblos que difieren en latitud, y en diferentes Meridianos, y huniere otros dos pueblos mas apartados de la Equinocial, que difieran en la misma latitud, que el camino que ay entre los dos pueblos mas apartados de la

Equinocial, es mayor que el que ay entre los pueblos mas llegados a la Equinocial. Pues pongamos esto en figura, y examinenos si es mucha la diferencia, para que veamos si la tabla que està hecha, para los que parten de la Equinocial, podra servir sin error, para los que partieren de otro qualquiera punto. Sea la Equinocial, b f, y algun Meridiano, a b, en el qual pongamos en el punto, b, vn pueblo: y pongamos en otro Meridiano vn pueblo en el punto, c, vn grado apartado de la Equinocial, tirese el arco, b c. Pongamos en otro Meridiano, a d, vn pueblo en el punto, d, apartado de la Equinocial.40.gra. y en el Meridiano, a e, otro pueblo en e, distante de la Equinocial. 41. grad. tirese el arco, de. Hase de entander, que cada vno de los arcos, b c, d e, està apartado del Meridiano, por vna quarta de viento, estiendase, a c, hasta la Equinocial. En el triangulo, b f c el angulo, f, es recto, y el angulo, c b f, es el restante para. 90. quitando el angulo, ab c, que ponemos vna quarta de viento, que es. 11. grad. 15. min. pues quitando de.90.los 11.grad. 15.minut. quedan. 78.grad. 45.min. y tanto es el angulo,c b f,y el lado,c f, ponemos de vn grado : luego por la 16. del lib. 4. de Monterregio, como fe hã, 98078. partes, seno recto del angulo, c b f, con. 1745. partes, seno del lado, c f, assi se ha el seno todo, que ponemos, 100000. con el seno del arco, c b. Pues siguiendo la regla de proporcion, hallaremos que el arco, b c, es. 1779. partes, de las mismas, a las quales en la tabla de fenos le responden. 1. grad. 1. minu. 10. segund. y

tanto es el arco, b c, que es el camino que haze la nao, del punto, b, para el punto, c, que reduzido a leguas, son. 17. leguas, y seys ochavos, o tres quartos, como parece en la tabla precedete. Pues examinemos que tanto camino es el arco, de, que es la distancia entre los dos pueblos, que ponemos mas llegados al Polo. Estiedas e, y tirese el arco, de g, que venga perpendicular sobre el arco, de g. En el triangulo, a g d, el angulo, g, es recto: el angulo, a d g, ponemos de vna quarta de viento, que son. 11. grad. 15. min. el lado, a d, es. 50. grados, porque es complemento de 40. grad. que pone

mos que el punto, d, està apartado de la Equinocial. Pues por la. 16. del mos que el punto, d, està apartado de la Equinocial. Pues por la. 16. del lib. 4. de Monterregio, como se ha el seno del angulo, a g d, que es el seno todo, con el seno del arco, a d, que es. 76604. partes, de las que el seno del ciene, 100000. assi el seno del angulo, a d g, que es, 19509. con el seno del arco, a g. Pues siguiendo la regla de proporcion, viene a ser el seno del arco, a g. Pues siguiendo la regla de proporcion.

no del arco, a g, 14944. partes, a las quales le responden en la tabla de senos. 8, grad, 35 min. 18, legun. En el triangulo, a g e, estan conocidos los lados, a g, a e, con el angulo recto, g, porque el lado, a g, le acabamos de conocer, y el lado, a e, es el complemento del pueblo que ponemos en, e, que diximos que estana apartado 41. grados de la Equinocial: luego sera, ae, 49. grad. Pues como se ha el seno de complemento del arco, a e, co el seno de complemento del arco, a grassi el seno de complemento del arcoje g, con el seno todo: y convertiendo, como se ha el seno de complemento del arco, a g, que es. 98877. con el seno de complemento del arco, ae, que es, 65605, alsi se ha el seno todo, que es 100000. con el seno de complemento del arco, e g, que siguiendo la regla de proporcion lrallaremos, que es. 66350. que por las tablas le responden. 41. grad. 34. min. los quales restados de. 90. quedan. 48. gra. 26. min. y tanto es el arco, e g. En el triangulo, a d g, estan conocidos los lados, a d, a g, con el angulo re-Ao,g. Pues como se ha el seno de complemento del arco, a d. con el seno de complemento del arco, a g, assi se ha el seno de complemeto del arco d g, con el seno todo: y conversamente, como se ha el seno de complemento del arco, a g, con el seno de complemento del arco, a d, assi el seno rodo, con el seño de complemento del arco, d g. Pues multipliquemos,64278. seno de complemento del arco, a d, que es segundo termino, por 100000. seno todo, y tercero termino, y sera el producto, 6427800000 el qual partido por, 98877 feno de complemento del arco, a g, y primero termino, y sera el quociente, 65008. que es el seno de complemento del arco, d g, que por las tablas de fenos, es. 40. grados, 32. minutos, 51. fegundos, los quales restados de 90. quedan 49. grados, 27. minutos, 9. segundos, y tanto es el arco, dg. Teniamos que el arco, e g,era.48. grados, 26. minutos, los quales restados de.49 grad. 27. minu. 9. segund. que es el arco, d g, que da el arco, d e, que sera vn. grad. 1. minus 9. segund. y tanto es el camino que ay del punto, d, al punto, e, que reduzido a leguas, son, 17. leguas y seys ochanos, que son tres quartos de legua. De manera, que el camino que se haze del punto, d, al punto, el pueblos mas apartados de la Equinocial que los pueblos, b, c, y que la diferencia de latitud, es la mesma: y tambien la quarta de viento por donde se nauega de los vnos a los otros, es el mesmo, sin auer error sensible: aunque Pedro Nuñez prueua, ser mas el camino del punto, d, al punto, e, que no del punto, b, al punto, c, pero esto es Matematicamente; mas al fentido no fe echa de ver la diferencia: y assi seguramente podran vsar de la tabla que està hecha para los que parten de la Equinocial, como está dicho. Aunque en esta altura de. 40. grados, nauegando por la. 7. quarta, casi es la diferencia. 30. leguas; pero quien nauegare por esta quarra, no se sie desta cuenta, porque si en la altura del Polo se erraren ocho minutos, que es cosa muy possible, y aun algunas vezes mas, se errara por esta cuenta las 30. leguas, alomenos mas de. 26. y assi esta nauegacion de la.7. quarta se tiene de hazer mas por estimatina. que por altura, sino es que se tome con mucha precisson, lo qual tengo por impossible en la mar: y los Pilotos diestros hagan comparació de la altura con la estimatiua, y veran la discrepancia que alguna vez hallaran.

CAP. XXI. Que trata del Relox Nocturno, y su fabrica.




N Todas las fabricas que tengo vistas deste Relox Nocturno, en vnas ponen, que la guarda delantera haze la media noche en la cabeça, que es en el Meridiano, en los 25. dias de Abril: otros que en 30, de Abril: ni los vnos, ni los otros no aciertan, sino suesse que imaginassen el Nor-

te, como auemos dicho que lo imaginan los Pilotos, que entonces, los que dizen que la guarda delantera haze la media noche en el Norte, a los. 30. de Abril, no le yerran mucho: pero segun que la guarda delantera media el cielo, es error, como se mostrarà. Por la longitud y latitud que esta estrella tiene, se sabe que su declinacion es 75.grados. 34. minutos, 22. segundos: y su ascension recta, 221. grados, 52. minutos, 8. segundos, como queda demostrado. Tambien se demostrò, que mediana el cielo con 14. grados, 15. minutos de Escorpion. Pues quando el Solestuniere en 14. grados, 15. minutos de Tauro, ésta estrella passarà por el Meridiano a la media noche, porque estando el Sol en el grado opuesto, estarà entonces en el Meridiano contrario, y viene a estar el Solen. 14.grados, 15. minutos de Tauro, a los seys dias de Mayo, poco mas : por lo qual se tiene de poner en este Relox nocturno, 6. de Mayo en la cabeça, que ha de ser parte contraria del Manubrio. Si el agugero por donde se vehiala estrella Polar, se pone en el centro del Relox, se podran poner en la cabeça, 30. de Abril: pero para otras operaciones mas que saber la hora, es necessario poner este agugero suera del centro, como diremos.

Pues entendido que la guarda delantera haze la media noche en la cabeça, alos feys de Mayo, fobre el punto, d, se descriua el semicirculo, abc, cuyo Diametro sea, adc. Tirese, cgf, en angulos rectos con a c, y pongamos que, c, es el polo Artico, y el punto, a, el Antartico: tomese del circulo, abc, elarco, CA, de. 3. grados, 27. minutos : y si dieren credito a nuestra observacion, no mas de. 3. grados, porque no hallamos mas distante la estrella Polar del Polo, y del punto, a. Por A, se pongala regla, y donde cortare la linea, c f, se hara vna señal, que ferà, g. Tambien se tome el arco, CB, de. 14. grados, 25. minutos, 38. segundos, que es el complemento de la declinación de la guarda delantera: y de, a, por, B, se ponga la regla, y cortarà la linea, c f, en, f, y estaran puestas las dos estrellas en la linea, e f, en los puntos, g, f, segun su declinacion, respeto del Polo, C. Y porque el lugar no tiene disposicion para el instrumento salga del tamaño que se requiere, tomaremos aparte la linea, e q, de manera que se aya con, en, como, cf, con, cg : y fobre, e, se haran los circulos, q D, n r, los quales feran los paralelos que la guarda delantera, y estrella Polar hazen al rededor del Polo. Tomese el arco, r m, de 37. grad. 38. min. 30. segund. y tirese la linea, e m F, y fera el arco, mr n, 217. gra. 38. minu. 30. fegund. que es la ascention recta

que



que ay entre estas dos estrellas, y desta suerte quedaran la guarda delantera, y estrella Polar, assentadas en el instrumento en sus verdaderos lugares. A cantidad del Semidiametro, e h, se hara el circulo, o p, con las circunferencias y anchura que aqui parece, poco mas o menos, y diuidase en quarto quartas, y la mitad en 12. partes yguales, poniendoles sus numeros, como parece: sobre los quales se haran vnos K 2 dientes,

dientes, y el de las. 12. sera punta laguda, porque se diferencie al tacto entre las demas. Hagase otro circulo, HG, que quepa justo dentro del circulo, o p, y el circulo, GH, se hara de ancho, GX, y en esta anchura se haran las circunferencias con los espacios que se veen, y en el espacio de medio se pondran los signos, dividiendole en 12 partes vguales, y cada yna en 30. si lo sufriere el espacio, y sino en las que se pudiere dividir. En el espacio de afuera se pondran los meses, correspondiendo a los signos, como se suele hazer en los Astrolabios; despues se haga en el espacio interior, la division de los 32. rumbos, poniendo el Norte enfréte de 14.gra. 15.min.de Tauro. Esto assi hecho, se hara la rodezuela, Klygual al Diametro, u x, y en ella se pondra el Indice, l q z: despues desto se haga vna chapa redonda, s t, vgual de, o p, con fu manubrio, como parece: v en el centro desta chapa se hara vin circulo, algo menor que, l K, y se le quitarà lo q estuniere del circulo para el centro. Tambié se hara otra circuferencia, ygual de, HG, porque la rueda, HG, fe claucen la rueda, st: y antes que se claue la circunferencia, GH, se deslape por la parte baxa, y la rueda, o p, se deslape por la circunferencia interior, sacandole suera todo lo que està dentro desta circunferencia; y antes que se clave la rueda, H G, se ponga la rueda, o p, de manera, que la rueda, G H, se ponga de suerte que solape la rueda, o p, debaxo della, y assi se clauarà de manera, que la rueda, o p, se pueda mouer al rededor, y que no se salga fuera. Despues se haga vna rodezuela ygual del agugero que se hizo en la rueda de la chapa, HG, y esta rodezuela se claue en la rueda, 1K. centro con centro. Este Indice se assentarà sobre la chapa, HG, y hagafe otra rueda que fea algo mayor que el agugero de chapa, st, y fe ponga por la parte trasera de la chapa, enuiajando la vna y la otra, de manera que hagan superficie llana, y se claue con la rueda del Indice, de suerte que se pueda mouer al rededor, sin que se pueda salir : y en esto la industria del artifice podra suplir lo que con muchas palabras no se podra dar bien a entender. En el punto, q, del Indice, se hara vn agugero, y otro en el punto, m, que passe las tres chapas.

CAP. XXII. Que trata del vso del Relox Nocturno.



OMESE Del Manubrio en la mano derecha, de manera que no fe incline a la vna parte ni a la otra, y por el agugero,m, se procure ver la estrella Polar, y por el agugero, q, se vea la guarda delantera, y esto se hará alçando, o baxando el Indice, q l: y quado assi se viere las dos estrellas jun-

tamente por los dos agugeros, el Índice, q I, mostrará en la rueda, o p, la hora que fuere de la noche. Conviene primero tener puesto el punto de las 12 en el dia del mes. Tambié el punto, F, mostrarà en que rumbo està la estrella Polar, y la linea, I q, mostrarà en q rubo està la guarda del atera.

No se puede hazer este instrumento mayor, porque no se aparte mucho de la vista, para poder ver las estrellas por los agugeros.

CAP.

Nauegacion.

CAP. XXIII. Que trata de la fabrica del instrumento de la Ballestilla que vsan los Pilotos.



IENEN Los Pilotos yn instrumento, para tomar denoche la altura de polo, por la estrella Polar, de que se ha tratado, el qualenseña-

remos como se fabrica, en dos maneras: la vna es por cãtidades continuas: la otra es mediante numeros. Por cantidades continuas, se fabrica en esta manera:


Sobre vna tablamuy llana se tire vna linea, t e f, que tenga cinco, o seys palmos de largo, y junto al vn estremo desta linea se tome la linea, ec, de medio palmo de largo, y sobre el puto, e, se descriva el circulo, a b c d, que su Semidiametro sea, e c. Tambien se tome, c n, y gual de e c,y sobre el punto,n,se descrivael circulo, cgfh, que fera tangente al circulo, a b c d, en el punto, co Cada uno destos circulos se divida en 4. quartas, y la quarta, a d, del circulo, ab cd, se divida en 45 partes y guales: y en otras tantas fe divida la quarta, g f, del circulo, c gfh Del punto,d, se tire la linea, du, que sea equidistante de la linea, t a e:pongafe vna regla por el punto, c, y por cada una de las divisiones de la quarta, a dey tambien juntamete por las divisiones de la quarta, fg, y donde cortare la regla a la linea, u d, se hagan señales, que desta manera quedadarà dividida la linea, tu, segun que tiene de estar la vara de la ballestilla:la qual aqui representa la linea,t a c,en la qual siseñalaren las divisiones de la linea, u d, tan apar tadas del punto, e, como lo estan del punto, d, quedara graduada la vara de la ballestilla, cuyo principio es el púto,c:y la parte que se tiene de poner al ojo, y la linea, e d, es la mitad del transuersario, ofranja: y todo el transuersario es ygual del Diametro, de b. Pues dividida esta linea, tac, fegun que auemos dicho sobre la tabla; se pasfaran estas divisiones ala vara de la ballestilla, poniedo K 3

de diez en diez sus numeros, por el orden que en la sigura parece. La razon porque la quarta, a d, se diuidio en.45. partes, es, porque el angulo que se haze en el cen-

tro, es duplo del que se haze en la circunferencia: y assi el angulo, a e r, es duplo del angulo, a cr. Y fiendo el arco, a r, 10. partes de las que tiene la quarta, a d, 45. partes, el angulo, a cr, no fera mas de diez grados de los que tiene la quarta, 90. y la linea, cr, estendida, has ta que corte en la linea, du, cortarà en el punto, u, y afsi el angulo, t cu, es de diez grados: de suerte que poniendo el punto, c, en el ojo, y passando la vista por los estremos del transuerfario, y parando el transuersario en el punto, t, se haria vn angulo en el ojo, de 30. grados, causado de los dos rayos visuales, que passan por los estremos del transuersario, pues su mitad haze angulo de quinze grados.

Suelense poner dos tras uersarios en la ballestilla, el

vno dellos es pequeño, por q el mayor no puede seruir quando la altura del polo es pequeña. Pues tomese, e l, q sea la mitad del transuersario pequeño, y tirese, l q, paralela



lela de, e t: y diuidida la quarta, a b, en 45. partes y guales, y en otras tantas la quarta, f h, y poniendo la regla por el punto, è, y por las diuisiones de las quartas, a b, f h, se tiraran lineas, hasta q corten la linea, l q, y donde la cortaren, se haran señales, las quales se passaran a la linea, c a t, y se podra graduar la vara de la ballestilla, segun el trans uersario pequeño, haziendo diferencia de la graduació del transuersario pequeño, de la graduación del transuersario grande.

Para que la graduacion vaya de grado en grado, es necessario, que del punto, c, se tiren lineas por todas las diussiones de las quartas, a d, f g, y hazer señales (como est tà dicho) en la linea, d u, y passallas a la linea, ct, y ponerles sus numeros como se ha hecho, y en la figura parece.

Este modo de graduar la ballestilla, puede tener algun error, si el artisice no es diestro en el medir, y tirar lineas; por lo qual hize vna tabla de numeros, para que por ella se pueda graduar la ballestilla, con mucha precision y facilidad.

CAP. XXIIII. En que se trata, como por via de números se puede graduar la ballestilla, muy mas cierta que por la via que se tiene dicha.

que auemos dicho, es bueno, pero requiere mucho cuydado en medir los circulos, y tirar las lineas, assi las paralelas, como las que salen del contacto de los circulos, porque en qualquiera poca cosa que se descuyde, puede auer mucho error: por lo qual me parecio poner la tabla siguiente, con la qual, auque el artissice no sea muy diligente, no se podra errar cosa sensible: y assi aconsejaria a los que hiziessen ballestillas, que siguiessen este modo de graduallas; y aun con Karen esta dicho de graduallas; y aun con Esta de graduallas esta de

esta tabla puede qualquiera Piloto examinar su ballestilla, si la lleua cierta, y si fuere necessario, hazerlad nueuo.

Pues tome vna vara quadrada, que téga de largo cinco palmos, mas o menos, que fea de buena madera, y téga en quadrado vna pulgada. Esta vara se mida en 2000. partes yguales, y fino sufriere tantas diuisiones se diuidirà en 1000. partes, y cada vna valdra dos. Despues dividan la mitad del transuersario, en.50 partes yguales, de las que se dividio la vara en 1000. y tendra todo el transuersario, & 100.de las que toda la vara tiene 1000. y si cada vna destas partes del transuersario, ponemos que vale dos, sera la mitad del transuerfario. 100. partes de las q la varatiene. 2000. Pues segun esta cuenta, se hizo la tabla siguiete, en la qual en cada coluna ay dos ordenes de numeros, o colunas. En la que està a la mano yzquierda, se ponenlos grados y medios, en que se tiene de graduar la ballestilla. En la que està a la mano derecha, se ponen las partes de la vara que caben a cada grado, como quiriendo señalar en la vara, 20 grad buscarè los. 20 grad en la coluna de la mano yzquierda, y delante estan. 567. partes: pues contarè otras tantas en la vara, y donde estuuiere el tal numero, se harà la señal de 20. grad. y para feñalar 20. grados y medio, tomarê de la vara 553. partes, que tantas estan en la tabla, frontero de los 20. grados y medio: y assi desta suerte se señalarán los demas grados. De seys grados para abaxo no se pueden señalar en la largura desta ballestilla, porque para poner menos que seys grados, vendria la ballestilla a ser muy larga, que es inconueniéte. Demas desto,

por

600

567

500

400

300

200

Nauegacion.

59

por larga que fuesse, no se podria poner la graduación de dos grados, sino se tomasse vn transuersario muy pequeño. Pero para lo que los Pilotos han menester, basta que llegue la graduación hasta. 6. grados, que con esto podran tomar la altura del polo, hasta que la estrella esta cerca del Orizonte, que no se puede ver.

Es de aduertir, que la numeración de las partes de la vara de la ballestilla, tienen de començar de la parte que se pone al ojo, como si suesse la vara, a b, y la parte que se pone al ojo el punto, a, pues deste punto se tienen de començar a contar las partes de la vara; y al punto b, serian las. 567. partes, de las que se ponenen la vara 2000. y alli se tienen de señalar los. 20. grados, que diximos que en la tabla tenian delante las 567. partes: y assi poniendo al ojo el punto, a, de la ballestilla, y viendo por los estremos, de, del transuersario, el Orizonte, y estrella Polar, y parando el transuersario

zonte, y estrella Polar, y parando el transuersario en el punto, b, diremos que tiene de altura la estrella Polar 20. grados sobre el

Orizonte.

Siguese

Regimiento de Siguese la figura de la Ballestilla, con su transuersario.

A Vara, ab, ha de

fer muy derecha, y de

buena madera, como

de peral, o ferual, para que
fe pueda bien medir y graduar: y el transuersario,
c d, ha de correr muy justo
por la vara, ab, y que haga
angulos rectos con ella.



Exemplo de lo que auemos dicho, donde fe entendera mas claramente la fabrica de la Ballestilla, por via de numeros.


N El padron de la Ballestilla que se hizo para la casa de la contratación de Seuilla, tomamos vna vara, que tenia de largo tanto como las varas, AB, CD, EF, GH, juntadas vnas con otras: como juntando la parte, C, con, B, y, E, con, D, y, G, con, F. Toda esta vara se dividio en 500. partes yguales, como se muestra en los numeros de la vara que estan en la primera orden a la mano yzquierda: cada vna destas partes pusimos que valiesse dos, como parece en la segunda orden. Tambié pusimos que valiesse quatro cada vna destas partes, como parece en la tercera orden. Pusieronse estas tres diferencias de numeros, para hazer tres transuersarios, o sonaxas diferentes, para que siruan de tomar diferentes alturas, aunque con vna sola se hiziera, que siruiera para tomartodas eleuaciones de Polo, pero no fuera con tanta precision como con tres: porque con la pequeña se toma de 6.grados, hasta.12.y de 12. hasta 24. se toma con la mediana: y de 24. hasta 60.0,70. se tomarà co la mayor. Pues queriendo poner la graduacion para la sonaxa pequeña, tomare 100. partes de la vara, por donde cada parte vale.4. que sera, AK, y deste tamaño ha de ser la mitad del transuersario, o sonaxa. Y para poner seys gra dos, con que entra esta sonaxa pequeña, entrarè en la tabla con los 6.grados, y enfrente a la mano derecha, está 1908. este numero contarè en la vara, por donde cada parte vale 4. y donde feneciere el numero, que es, L, por alli hare vna señal en el otro lado de la vara, donde pondre

pondre el numero. 6. y desta manera se pondran los demas grados y medios, hasta 12, 0, 15. que son los que comodamente pueden seruir para la sonaxa pequeña. Pues queriendo poner la graduación de la fonaxa mediana, pondre la mitad de la sonaxa, como, A M, doblada de, A K.: para la graduación desta sonaxa se entra en la tabla con doze grados, enfrente de los quales eftan 951. el qual numero contare por la segunda graduacion, por donde cada parte vale dos, y donde feneciere el numero, pondre 12. y desta manera se pondran los demas grados que pertenecen a esta sonaxa, que seran hasta, 24.0,30. grados. La sonaxa mayor sera doblada de la mediana, que sera su mitad, como, AN. Pues queriendo poner la graduacion desta sonaxa, entrarè en la tabla con 24. grados, que son con los que comiença, enfrente de los quales estan 470. Este numero contarè en la vara, en la primera orden de numeros, donde cada parte vale vna, y donde feneciere el numero, allise pondran 24. y con este modo de proceder se pondran los demas grados. Puedese señalar cada graduacion con vna letra, como, a, b, c, poniendo a cada fonaxa otra femejante, para que fe conozca la graduacion con q̃ fonaxa conuiene . En el agugero de cada fonaxa fe pondra vn muellezillo, para que mouiedo la fonaxa, fe tenga en la vara donde la pusieren.

Hizofe de cinco quartas de largo la vara; si la quisseren mas corta, la pueden hazer, segun esta dotrina, pero no serà tan

cierta.





Enestafigura se demuestra, q aunque eltranfuerfario es duplo el vno del otro, q la graduacion del vno en la vara,no vendra con la dupla graduaciódel otro: como fiendo la vara de la balles tilla, ab, y la

mitad del transuersario, b c, el qual estando en, b, haze el angulo, cab. Digo que si tomaremos otro transuersario, b d, que sea duplo de, b c, que el angulo, b a d, que no fera duplo del angulo, c a b, fino que fera menor que duplo. Delpunto, d, se tire, de, paralela de, c a, y cortarà la linea, ba, en, e, y fera, a e, ygual de, a b: y el angulo, deb, ygualalangulo, cab, fobre el punto, a, a cantidad de, b a, se haga el circulo, b o e, el qual passarà por el puto,e,y cortarà la linea, de, en, o: tirefe, a o, y fera el angulo,b a o,en el centro duplo del angulo,b e o,en la circunferencia. El angulo, b a o, es mayor que el angulo, b a d: luego el angulo, b a d, no es duplo del angulo, b a c:luego el transuersario, b d, no puede estar en el punto, b, para hazer angulo duplo del angulo, ca b, sino mas cerca del punto, a. Tirese, df, paralela de, be, y estiendase, a o, y cortarà, df, en, g: tirefe, gh, perpédicular fobre, a b, y fera el punto, h, donde ha de estar el transuersario, para que el angulo que hiziere sea duplo del angulo, bac.

Partes

62

Nauegacion.

Partes de la vara de la ballestilla, segun que la mitad del transuersario tiene. 100. de las mismas.

tiene. 100. de las mismas.											
Grados.	la vara. Partes de	la vara. Grados de	Grados.	la vara. Partes de	la vara. Grados de	Grados.	la vara. Partes de	la vara. Grados de	Grados.	Partes de	la vara. Grados de
3	1761	6. 30	12	470 460	24.30	21	260	42 42.30	30	173	. (o 60 30
30	163.4	7-30	30 45.	451	25	30 45	254	43 43 43 9	30	170	61 61.30
4	1430	8.30	13	433	26.30	22	247	44 44.30	31	165	62 62.30
30 45	1270	9 30	30	416	27 27.30	30:	241	45 45.30	30 45	163	63 63.30
5	1143	10.30	14	401 394	28 28 30	23	235	46 46.30	32	160	64 64.30
30 45	1038	11.30	30 45	386	29.30	30	230	47 47 30	30 45	157	65 65.30
6	951	12.30	15	373 367	30.30	24	225	48 48.30	33	154	66.30
30 45	877	13.30	30 45	360 355	31	30	219	49 49 30	30	151	67.30
7	814 786	14.30	16	349	3± 32.30	25	214	50	34	148	68 68.30
30 45	759 735	15.30	30 45	337	33 30	30 45	2 10	51 51.30	30 45	145	69 69 30
8	711	16.30	17	327	34 34•30	26	205	52.30	35	143	70 70.30
30 45	669	17,30	30	317:	35.	30	198	53.30	30 45	140	7 ¹ 7 ¹ •30
9	631	18.30	18	308	36 36.30	27	196	54 54.30	36	138	72 72.30
30 45	597 582	19.30	30	299 294	37 37·30	30	192	55	30	135	73 73.30
10	567	20.30	19	290	38 38.30	28	188	56.30	37	133 131	74 74-30
30 45	539 527	21 21 30	30° 45	28i 278	39	30 45	184	57 57.30	30	130	75 75·30
11	514	22 22.30	20	274 270	40 40 30	29	180	58 58.30	38	128	76.30
30	491	23 23.30	30	267 264	41 41.30	30	, , ,	59 59·30	30	126	77
,	2 Au-										

Aduertencia cerca de los numeros de la tabla precedente.

Iximos atras, que para poner seys grados en la vara de la ballestilla, que se tomassen los grados en la coluna primera de la mano yzquierda, y enfrente estauan las partes de la vara, que eran 1908. Esto se tiene de entender desta manera: Sea la vara del radio, a b, y el transuersario, c b d; quando se haze la tabla precedente, se considera el lado, c b, que es la mitad del transuersario, como seno todo; y, b a, que es la vara de la ballestilla, como tangente: y entrando en la tabla de tangentes con tres grados, hallariamos el angulo, b c a: pe-

ro en la operacion deste instrumento, auemos menester el angulo, b a c, por lo qual entraremos en la tabla de tangentes, con el complemento de 3. grados, que son 87. y tanto es el angulo b c a, y hallariamos la tangente, a b, de la qual, y el rayo visual, a c, estarà comprehendido el angulo, b a c, que seria de tres grados: y segun este modo de

proceder estan puestos los numeros de la coluna donde dize grados, los quales numeros son el complemento del angulo, b c a, que sera el angulo, b a c, los quales numeros se buscarán en la tabla de tangentes, por el fin della. Pues en el radio auemos menester el angulo c a d, por lo qual frontero de tres grados se ponen seys, porque hallando el angulo de tres grados, c a b, tene-

mos el de feys, porque, ca d, es duplo de, ca b, y
este es el fundamento con que se
formò la tabla.


S

CAP. XXV. Como se sabra la postura que tienen las guardas, estando la estrella Polar en qualquier rumbo.

VNQVE Por el Relox nocturno que auemos enseñado, se podra saber la postura de las guardas en qualquiera hora, y tambien en que rumbo està la estrella Polar; pero para los que no tunieren el instrumento del Relox, quiero enseñar otro instrumento, con el qual podran sacilmente conocer, por la postura de las guardas, quando la estrella Polar estarà en alguno de los ocho rumbos de que auemos tratado, para que tomando entonces su altura, puedan saber la del Polo, por las reglas que luego diremos. Descriuase el circulo, a b c d, cuyo centro, e, dividase en 4. partes vguales con los Diametros, a c,b d: tomese, a f, de 23. grad 28 minut. y tirese df, y cortarà al Diametro, a c, en, g, sobre el punto, e: por, g, se descriua el circulo, gh K. En la quarta de circulo, gh, se cuenten las declinaciones, de las estrellas, començando del punto, g, y del punto, K: por fin de la declinacion se ponga la regla, y donde cortare al Diametro, a e, se hara vna feñal: como teniendo la estrella Polar. 87. grados de declinación, tomarfe ha el arco, g y, de otros tantos: del punto, K. por el punto, y, se podra la regla, y cortará el diametro, a e, en, n, por donde tiene de passar el paralelo de su declinacion. Despues se tome el arco, g z, de 75. grad. 34. minut. que es la declinación de la guarda delantera la mas Austral : y del punto, K, por, z se ponga la regla, y cortarà el Diametro, a e, en, o, por dode tiene de passar el paralelo de la guarda delantera. Vitimamete, se tomeel arco, gi, de 72. grad. 53. minut. y del punto, K, porsi, se ponga la regla, y cortarà el diametro, a c, en, p, por donde passarà el paralelo de la

guarda trasera. Pues sabidos los paralelos que hazen estas estrellas al rededor del polo del mundo, que es el punto, e, es necessario saber, en que parte deste paralelo se tiene de assentar cada vna dellas. Para lo qual en el circulo, badc, se cuenten sus ascensiones rectas, començando del punto, b, para el punto,a: y por el fin de la ascension, y por el polo, e, se ponga la regla, y donde cortare la regla al paralelo de la declinación de la eftrella, allí ferà su assiento; como la estrella Polar tiene de ascension recta. 4. grad. 13. minut. 38. segund. pues tomo el arco, b 9, de otros tantos: y pobietido la regla por los puntos, e q, corta al paralelo de la estrella en 1, donde se . rafu assiento. Demas desto, tomo el arco, b a r, de 224. grad. 52 minut. que es la ascension recta de la guarda delantera; y puesta la regla por los puntos, er, corta al paralelo de la estrella en, u, donde lera su assiento. Tambien tomando el arco, bas, de 229. grad. 12. minut. 48. segund. que es la ascension recta de la otra guarda mas boreal : y del punto, e, por, s, poniendo la regla, cortara al paralelo de la estrella en, x, donde sera su assiento. Pues destà suerte estaran puestas las estrellas en la superficie plana, en la disposicion y postura que tienen el cielo. La demostracion desta pratica, se hallara en nuestro Astrolabio. Luego si pusieremos el punto,a, en el Norte: y el punto, c, en el Sur: y el punto, b, en el Oesse: y

K, en el Leste: y los demas rumbos en sus lugares, como en el instrumento de adelante mostraremos. Si se pusiere la estrella Polar en algun rumbo, se vera la disposicion que tienen las guardas: Siguese la figura de que auemos tratado.



Puestas las estrellas en la disposicion que auemos dicho, fabriquemos el instrumento, con que veremos quando la estrella Polar estuuiere en alguno de los ocho rumbos, en que disposicion estan las guardas: o al contrario, quando la guarda delantera estuuiere en alguno de los ocho rumbos, veremos en que disposicion està la estrella Polar: Para hazer este instrumento, es necessario que pongamos las estrellas mas apartadas del Polo, para que se pueda vsar mejor del: esto se hara haziendo la sigura precedente mayor; o sino por esta mesma se podra hazer, tomando la distancia que ay de cada estrella al Polo, y esta multiplicandola algunas vezes, ca da vna en su linea, vendran a estar en la inesa, e, cinco velzes en la linea, er, vendra a caer en, A, la guarda delantera: y si tomare

la distancia, e x, otras cinco vezes en su mesma línea, vendra a caer en, B; donde sera el assiento de la otra guarda; y tomando la distancia, e t, otras cinco vezes, en la linea, e y, vendra a caer en, D, donde sera el assiento de la estrella Polar: y desta manera estaran estas estrellas puestas en los putos, A B D, en la mesma disposición que estavan en los puntos, u x t. Despues desto, se cortarán todos los blancos que estan dentro los lazos, sal-


uo los que contienen las estrellas.

Esto hecho, se hara el circulo, a b c d, ygual del circulo, n fh g: demas desto, se haran los tres circulos como parece. El circulo de la parte de dentro, se diuidira en ocho partes yguales; poniendo en cada diuisson el nombre de vno de los ocho vientos: en los otros dos circulos de asuera se pondran los meses, con sus numeros, poniedo 6. de Mayo en el Norte; como la figura muestra. El circulo, H K T, se encaxara dentro del circulo, a b c d, de suerte que se pueda mouer al rededor facilmente, de manera que no se salga fuera. Demas desto, en el circulo, a b c d, en la parte del Sur, se ponga vn Manubrio de que se pueda tener para obrar con el, y co esto y la figura, se dexa bien entender la fabrica deste instrumento. Ha ganse dos agugeros, el vno en, D, el otro en, A;

Vso del instrumento de que auemos tratado.

Omando el instrumento del Manubrio, y puesto el Norte en la parte alta, de suerte que no se in cline a vna parte ni a otra, y estando alsi, se trayga la rueda de las estrellas al rededor, hasta que por el agugero, D, se vea la estrella Polar: y por el agugero. A, se vea la guarda delantera, a vn mismo tiempo: y estando assi, se verà en el circulo, a b c d, en que rumbo caen las estrellas, Polar, y guarda delantera. Demas desto se verà la hora que es, mirando el dia del mes en que hora de las que estan en el circulo, HKT, señala.


Si este instrumento le hizieren mayor de lo que aqui està, no podran vsar bien del por auerse de apartar mucho de la vista.



Siguese la fabrica del instrumento, con el qual se sabe en que rumbo està la estrella que esta en el talon del pie yzquierdo del Centauro.

Obre el centro, e, de la figura figuiente, fe defcriua el circulo, ab c d, el qual fe parta en quatro quartas con los Diametros, a c, b d. Tomese, a f, de 23. grad. 28.min.y tirese,d,f,que cortarà al Diametro, a c, en,g:so bre el centro, e, por, g, se descriua el circulo, g h l K, y serà el punto, K, principio de Aries: y la sucessió de los signos fera, Klh, porque el centro, e, es el polo Austral. Tomese K m, ygual al coplemento de la declinació de la estrella, que està en el talon del pie yzquierdo del Centauro: y del punto, h, por, m, se ponga la regla, y cortarà al Diame tro,gl,en,n:y del Polo,e,por,n,se descriua el circulo,ni, q serà el paralelo q descriue la estrella al rededor del Po lo. Tomese tambié, ho, de tantos grados como es el coplemento de la declinació de la estrella q està debaxo de la rodilla del pie derecho del Centauro: y del puto, h, por o, se pogala regla, y cortarà al Diametro, gl, en, p: sobre el polo, e, por, p, se descriua el paralelo, p q, q sera el q haze la estrella al rededor del Polo. Tomese en el circulo hlK, la ascensió recta de cada vna de las dos estrellas, q de la primera son 173.gr.54.min: q es el arco, Klt: y del puto, e, por, t, poniedo la regla, cortarà a su paralelo en, r, dode sera el lugar de la estrella del talo del Cetauro; y la ascensió recta de la seguda, es 178. gr. 48. min. y tomádo el arco, Klu, de otrostatos, se poga la regla por el Polo, e, y el púto,u,y cortarà fu paralelo en,s,donde fera el lugar de la estrella q està debaxo d'la rodilla di pie del Cétauro.

No pongo aqui la demostració desta pratica, por q en la fabrica de nño Astrolabio està puesta muy a lo largo.



Pues si queremos hazer el instrumento, para conocer en qual de los ocho rumbos està la estrella del talon del pie yzquierdo del Centauro, tomaremos estas dos estre llas que auemos puesto en este planisferio, mas apartadas del Polo, para que con mas distincion se pueda vsar dellas: lo qual se hara si duplicaremos, o quadruplicaremos la distancia de cada vna dellas del Polo, e, en sus lineas, donde estan: como tomando tres vezes la distancia, er, en la linea, et, vendra a caer en, x: y tomado la distacia, es, otras tres, en la linea, e u, vedra a caer en, z, y estara las dos estrellas en, x, z, en la misma proporció q estaua en, r, s, respeto do tro planisferio mayor. Hecho esto, se haga el circulo siguiete, a b c d, del tamaño del circulo g h l K,

ghlK,de la figura precedente, y ponganse las estrellas, z,x, en el circulo, a b c d, en la milma disposicion, que estan en el circulo, ghlK. Sobre el circulo, abc d, se hara otro circulo, de manera que entre el vno y otro aya vn espacio en que se puedan poner los numeros de las horas, el qual se dividirà en 24. partes yguales, començando de la linea, ezb, y la cuenta de las horas vaya de mano derecha para yzquierda, como parece en el circulo. Demas desto se haga otro circulo, flm n, delancho que le parezca ser acomodado, dentro del qual se pueda reboluer el circulo, a b c d:y este circulo ha de estar encaxado en otro, de suerte que mouiendose dentro del, no se pueda salir. En este circulo mayor, auratres espacios: en el primero se pondran los ocho rumbos, en los otros los meses con sus numeros de los dias, poniendo. 20. de Março en el Norte: porque teniendo la estrella, z, 178. grados de ascension recta, y mas 48 minutos, media el cielo con 28. grados, 40. minutos de Virgo: y assi estando el Sol en 28. grados, 40. minutos de Piscis, que sera a los 20. de Março. Esta estrella estarà en el Meridiano a la media noche, por lo qual se ponen 20. de Março, en la parte opuesta donde ha de tener el Manubrio el instrumento.

La succession de los meses se tiene de assentar de la mano yzquierda para la derecha, como en la figura parece. Demas desto, en el circulo, flmn, se pondra vn Manubrio en la parte del Sur, que es en el punto, m.

En los puntos donde caen las estrellas, x, z, se haran dos agugeros no muy grandes: y del mismo circulo, ab c d, saldra vn tronco, o otra cosa donde se pongan las dichas estrellas. Todo lo demas que estuuiere dentro del circulo, a b c d, se quitarà fuera, porque no impida al yso del instrumento.

Regimiento de Vso del instrumento.



Omando el instrumento del pie, o manubrio, de manera que no se incline a vna ni a otra parte, se traera la rueda, a b c d, al rededor, hasta que por los agugeros, x, z, vea las dos estrellas, cada vna por el suyo: y entonces el dia del mes de la rueda de asuera, mostrarà la hora que està en la rueda interior: y en las diuisiones de los rumbos que estan en el primero espacio de la rueda de asuera, se vera el rumbo en que cae la estrella, x, que es la mas cercana al Polo. Si esta estrella cayere en la diuision que està en el punto, f, està en el Norte: y si en el punto, m, està en el Sur: y segun esto, en qualquiera de las diuisiones que cayere se sabra el rúbo

Nauegacion.

en que està, y por las reglas q se han dado, se sabra quan-

to està mas alta, o mas baxa que el Polo.

Es de aduertir, que a la mano que estuuiere la estrella, x, respeto de la estrella, z, que a essa mesma mano està el Polo Austral, y los rumbos se imaginan en el mifmo Polo sino M lab ris usflib el conta . "

CA P. XXVI. Que trata del Astrolabio de los Pilotos.

L Astrolabio de que vsan los Pilotos, solo sirue de tomar la altura del Sol sobre el Orizonte, mediante la qual, y la declinación del Sol, saben la altura del Polo, que eslo q estan apar-


tados de la Equinocial, como atras enseñamos: y como paratomar la altura del Sol, o de qualquiera estrella, basta la graduacion de vn quadrante, assi en los tales Astrolabios no se gradua mas de medio circulo, que aunq bastaua la vna quarta, pero para aniuelar el Astrolabio graduan dos quadrantes, porque tomando la altura del Solpor el vno, y luego subitamente por el otro, si estas dos alturas fueren yguales, es señal que està bien aniuelado, y fino son y guales las dos alturas, le va enmendado.

El Diametro destos Astrolabios, ordinariaméte es de vn palmo, y a lo mas de vna tercia de vara; pues para los q no tuuiere noticia del, pondre aqui su figura y fabrica.

Sobre el centro, e, se haga el circulo, ab c d, con los demas circulos interiores, diuidafe en quatro quadrantes, có los Diametros, a c, b d. Despues cada quadrate se divida en 90. partes y guales. Lo primero, se divide cada quadrate en 3 partes, y cada vna destas en otras 3. q sera por todas 9. partes, q cada vna valdra 10. grad. Cada vna destas 9. partes se parta por medio, y esta mitad en 5. partes, y con estas divisiones queda cada quarta dividida en 90 partes Despues se le pongan a estas divisiones

sus numeros, de 10.en 10,0 de 5.en 5. començando del punto, b; y del punto, d, para el punto, a, que es donde està els uspensorio. Los Portugueses comiença la numeracion del punto, a, para el punto, b. En esto no ay incó-ueniente, por que los vnos toman la altura del Solsobre el Orizonte, y los otros la distancia del Zenit al Solsy porque la vna es complemento de la otra, todo sale a vna cuenta, saluo que las reglas de los regimientos que mandan que se quite, o se añada la declinacion, proceden diferentemente, como se tratò en su lugar.

El circulo donde estan estos numeros, tiene de ancho mas de vna pulgada, y de gruesso otro tanto. Està sustentado en la cruz, f g,h l, q es del mesmo gruesso, y ancho: tiene de peso. 8. libras, poco mas o menos. En el suspeso-rio, a, tiene vna gugero por donde se le mete vna sortija,



de donde se cuelga. Tiene vna alidada, q los Marineros llaman Declina, que es de la figura que aqui se pone, en la qual qual la linea, mon, es la que llaman de la confiança, y ha de ser tan larga como el Diametro, a c, del Astrolabio: en el punto, o, tiene vn agugero, por el qual passa vn perno, y por el centro del Astrolabio, y se asixa con vn tornillo por la parte trasera.

En la fabrica deste Astrolabio se requiere gran diligé cia, por que facilmente se podra engañar en vn grado de al tura por la mala fabrica, como tego visto algunas vezes.

Lo primero, han de aniuelar muy bien el Astrolabio, colgandole del agugero, a, del qual caera vn hilo con vn plomo, por el centro, e: y estando esto assi, se hará los circulos de la graduació, como està dicho, poniedo mucho cuydado en la ygualdad. Esto hecho, se hara el agugero por el cetro, e, y sea tan derecho, q vaya muy perpendicular sobre la superficie del Astrolabio, de manera que no vaya al soslayo, porque si este agugero no estuuiere muy derecho, no serà possible que el Astrolabio dela altura verdadera, aunque la graduacion, y aniuelació estè bien hecha. J Los oficiales que hazé estos Astrolabios, despues q los tienen acabados, suelenlos afinar, tomado la altura del Sol por el vn quadrante, y por el otro, y siedo estas alturas yguales, tienen por cierto que el Astrolabio queda en su perfecion: y algunas vezes queda tan malo, que tomando el Piloto la altura en otra, hora, que el Sol tenga diferente altura de la que tuno quando le concertò, y no le halla que le da la altura ygual por entrambas quartas, torna otra vez al oficial a que le enmiende, y ponele tan mal como de primero, no sabiendo de donde le procede el daño. El mesmo inconueniente tiene el agugero de la alidada, aunque no tanto por no ser tan gruessa.

Tambié conuiene, q los agugeros de las pinulas, por do de tienen de entrar los rayos del Sol, sean pequeños, y q esté puestos muy derechaméte en la linea fiducia, mon:

y si desta manera, y con este cuydado estuuiere hecho el

Astrolabio, darà siempre la verdadera altura.

Si graduaren todas quatro quartas, y puesta la alidada, y el grado que cortare en la vna el mismo cortare en la otra contraria, y esto por todo el quadrante, es señal que la graduacion esta bien hecha, y los agugeros y alidada del Astrolabio lo mismo, y de otra manera estarà falto en alguna de las cosas que auemos dicho.

CAP. XXVII. Que enseña como se hara un quadrante, con que se tomarà la altura del Sol, por grados y minutos.

VNOVE Para Pilotos los quadrantes no fon de prouecho, ni otro ningun instrumento fuera del Astrolabio, por q en la mar, no se pue de vsar de instrumento q no este colgado li-

bremente, y que no tenga perpédiculo, fino alidada; pero para los curiofos que en tierra quisieren hazer observaciones, se enseñará algunos quadrantes, que có ellos se pueda tomar la altura del Sol, sin error de tres, o quatro minutos a lo mas largo, que para tomar alturas de Polo pueden muy bien seruir, que para hazer observaciones, se vsará del quadrante q enseñamos al principio, para q con mucha justificacion se tomen las alturas, assi del Sol, como de los demas planetas, y estrellas, para q con seguri dadse pueda hazer dotrina por las tales observaciones.

Pone Pedro Nuñez en su libro de nauegacion vn quadrante, como se sigue: Sobre el centro, e, se haga el circulo, a b c d, el qual se dividirà con los Diametros, a c, b d, en quantro quadrantes yguales: en el quadrate, a d, se descriuirà la circunferencia, m n, la qual se parta en 90 partes yguales, y se ponga su numeracion, como se acostumbra. Pues dize, que en el mismo quadrante se descriuan 45. circunferencias, y que la primera


despues

despues de, m n, se divida en 89 partes y guales: y la segunda en 88: y la tercera en 87. y assi siempre la que se sigue en vna menos, hastallegar a la que se divide en 46. partes; y con esto queda acabado el quadrante. Pues puesta la alidada sobre el centro, el con la justificación que en el capitulo precedente se dixo, y colgado el Astrolabio del suspensario, a, y entrando el Sol por los agugeros de las pinulas, se vea la linea de la confiança de la alidada, que circunterencia de las q estan en el quadrante corta en grado justo, y ver quantos grados corta la alidada de la mesma circunferencia: porque la proporcion que tiene toda aquella circunferencia con los grados que della corta, essa misma tiene 90. con los grados que della corta. Pues por regla de proporcion vendre: mosen conocimiento de los grados y minutos, que corta de la circunferencia, que està dividida en. 90. partes. Pongamos vn exemplo, que tomando la altura, la alidada cortò por grado justo, a la circunferencia que està diuidida en 82. partes, y que cortò della.33. partes. Pues for marè vna regla, diziendo: Si. 82. me dan 33. que me dará 90, multiplicando 33: por 90 hazen 2970 los quales partidos por 82. viene al quociente, 36. que son grados, y sobraron 18. los quales se multipliquen por 60. y seran 1480.minutos, que partidos por los 82. viene al quociete 18. Pues dire que tuuo de altura el Sol 36. grados,18. minutos. Si el Astrolabio estuuiere bien graduado, y aniuelado, y bien medidas las circunferencias, y se tomare con cuydado la altura del Sol, faldra muy cierta.

Aunque Pedro Nuñez enseña este quadrante, no enseño como se auian de medir las circunferencias, por se es muy discultoso medir la circunferencia, que no tiene partes aliquotas, como es medir la circunferencia, que se tiene de partir en 89. partes; y la de 87. y la de 85. y otras desta manera. Pues queriendo hazer esto por arte, y M 2 con

SUP

con mucha breuedad, despues de dividida la primera circunferencia en 90. partes yguales, para la qual division se tendran dos compasses, despues de auer medido todo el quadrante en 9. partes yguales, con el vn cópasse dividirà cada parte destas por medio, y se quedarà este compas segun esta divisió: y con el otro compas se divida esta mitad, quale, s. grados, en cinco partes yguales, y quedarse ha este compas sixo, segun esta division. Pues co estos dos compasses, puestos en estas posturas, que va vale cinco grados, y la otra vn grado, segun que la primera circunferencia vale 90. grados, se podran dividir todas las demas circunferencias, segun y como se ha dicho. Para lo qualse divida el Semidiametro, e d, por medio, en, f, y la mitad, fo, se parta en 45. partes yguales:



y poniendo el pie del compasen el centro, e, por cada vna de las divisiones que estan en,f d,se hara vna circúferencia, y no passe del quadrante. Despues con el copas que diximos que su abertura vale. 5 grados, se yra midiendo cada vna destas circunferencias, començando de la linea, f d. Despues con el compas que diximos que su abertura valia vn grado, se yran midiendo los espacios que midio el otro compas, que en cada vno se hallaràn cinco grados: y solo con estas aberturas destos dos compasses, sin se mudar, se mediran las circunferencias; la primera en 89. y la segunda en 88. y la terpera en 87. y assi las demas sucessiuamente, hasta la posterera, que se diuidirà en 46 partes. Esta pratica de diuidir estas circunferencias, no tiene demostracion, pero al sentido no ay error sensible, por lo qual seguramente se puede vsar della.


CAP. XXVIII. Que trata de otro instrumento armilar, con que se puede tomar la altura del Sol en la mar.

L Melmo Pedro Nuñez enfeña otro instrumento, con que se toma la altura del Sol bien precisa. Hagase el circulo, a b c d, que tenga vna tercia de diametro, y de ancho vn dedo, y

de gruesso otro tanto. Pongamos el Suspensorio en el punto, a, y por la parte concaua se haga vna linea por medio del circulo, por la qualse diuidirà en quatro quartas, començando del punto, a, que seran, a m, m n, n o, o a: el quadrante, a m, se parta por medio en, b: y tomando, n c, ygual de, a b, sera todo el arco, b m n c, medio circulo, el qual se diuida en 90. partes yguales, y cada vna destas partes se podra diuidir en las partes que sus sere cada grado. Tomese, a d, ygual de, a b, en donde se hara vn agugero que passe por medio de la superficie concaua, por donde ha de ser muy pequeño: pero por la parte conuexa, ha de ser tan grande como muestran las lineas f g, q hazen angulo recto con, d. Pongase el suspensorio M 4 dere-

derechamente en el punto, a, de suerte que el circulo quede muy aniuelado.

El vso deste instrumento, es, que colgado libremête del
Suspensorio, y buelto el agugero, d, para
el Sol, y entre su rayo, y dè en la gradua
cion que està en la
parte contraria concaua, en el gradoque
el Sol tiene de altura. Si este instruméto estuuiere bien fa-




zonte,

bricado, dara la altura muy precisa, por ser los grados grandes, y que se puede diuidir cada vno en. 6. partes muy distintas.

Pedro Nuñez pone algo mas breuemente la fabrica deste instrumento, y sin demostracion: y aunque para los que fueren algo Geometras no es menester, pero para los que no lo fueren, pondre la demostracion en la figura siguiente. En la qual siendo el punto, a, el Suspenforio, y passando la linea, an, por el centro, e, que sera perpendicular al Orizonte;y fiendo,a b,a d, vguales; q la linea,b d, cortarà en angulos rectos a la linea,a n, por lo qual la linea, b d, representa la linea Orizontal. Y teniendo colgado el Astrolabio del punto, a, si quando sale el Sol entrassen sus rayos por el agugero, d, darian en b: y si tirassemos la linea, de, que haga angulos rectos con, t d, estando colgado el Astrolabio del punto, a, que llegando el Sol al Zenit, y entrando sus rayos por el agugero, d, que darian en, c, porque, dc, es paralela de an, que tambien viene del Zenit perpendicular al Orizonte, y la circunferencia, b p c, sera medio circulo, porque siendo el angulo, b d c, recto; la linea, b c, ha de ser Diametro del circulo que tocare a los tres puntos, b d c: y si del punto, d, por medio de la linea, b c, que es el punto, e, passare la linea, d e p, partira el medio circulo en dos partes yguales en el punto, p. Pues digo, que la quar ta de circulo, b p, que entrando el Sol por el agugero, d, no es mas de 45. grados. El angulo, b d p, està hecho en la circunferencia, sobre el basis, b p; y el angulo, b e p, està hecho en el centro, sobre el mismo basis, b p: y los angulos que se hazen en el centro del circulo, son duplos de los que se hazen en la circunferencia; teniendo por basis yn mesmo segmento de circulo: y el angulo, b e p, es yn quadrante de circulo: luego el angulo, b d p, no es

mas de 45. grados, que es la mitad del quadrante. Siendo a m, quadrate de circulo, sera, b m, su mitad, pues, a m, se partio en dos partes y guales, tirese, d m, sera el rayo del Sol que entrapor el agugero, d. El angulo, b d m, està en la circunferecia; y el angu



lo,b e m,està en el centro: luego el angulo,b e m, es duplo del angulo,b d m; y el angulo,b e m, es medio quadrante: luego el angulo, b d m, sera la mitad del medio quadrante. Teniamos que el angulo, b d p, era medio quadrante, y aora tenemos que el angulo,b d m,es la mi tad de medio quadrante: y los arcos,b m,m p, son y guales: luego toda la circunferencia, b p c, se dividirà en

90. partes yguales, porque lo que se ha demostrado destos dos arcos, se demostrara de cada yn grado.

CAP. XXIX. Donde se trata como por un quadrante se tomarà la altura del Sol, por grados y minutos.




ON Qualquiera Astrolabio, o quadrante, con que no tenga menos que vna tercia de Diametro, se podria tomar la altura del Sol, por grados y por minutos, muy precisamen-

te, con solo tener graduada vna quarta en 90. partes yguales. Hecho el Astrolabio con la justificació que atras fe dixo, colgado libremente del suspensorio, se tome la altura del Sol, como se acostumbra, y donde la alidada cortare la circunferencia de la graduación, se haga vna señal, sino cortare en grado justo. Pues tomese aquella parte que cortò mas que grado, muy justamente, con vn compas que tenga puntas de azero, y muy agudas: y con esta abertura de compas, por la misma circunferencia, se mida 60. vezes, y vease quantos grados ay en estas 60. medidas, que tantos minutos tuuo aquella parte de grado, que el Sol tuuo de altura mas que grado justo. Para que se entienda mejor, pondre vn exemplo: Sea el quadrante de algun Astrolabio, el circulo, a b, cuyo centro, e, y tomando la altura del Sol, la alidada cortò la circunferencia, ab, en, d, que son. 18. grados, y mas vna partezilla de grado. Pues tomese aquella partezilla con vn compas, y con esta abertura de compas, començan do del punto, b, por la circunferencia, fe mediran cinco medidas, que llegaràn al punto, m: despues se tome doze vezes el espacio, b m, y llegaran al punto, e, y sera el arco, be, 60. medidas de la partezilla de grado, elqualarco, be, tiene 44. grados, y algo mas: por lo qual diremos, que la parte de grado que la alidada cortò

corto mas que grado justo, fueron, 44. minutos,

Si este modo de tomar la altura, se hiziere có cuydado, no puede auer vn minuto de error, q para en la mar no es de consideració, ni aŭ en las observaciones q se hizie ren en tierra, como no sea para hazer dotrina por ellas.

Pondre la demostracion desta pratica, para que se tenga satisfacion della. Digo, que la partezilla de grado que cortò la alidada, si fuere vn minuto mas que grado susto, tiene la misma proporcion con todo el grado, q el mesmo grado con 60 partes yguales del mismo grado; porq si diuimos el grado en 60 minut. vn minuto tiene la mesma proporcion con vn grado, que vn grado con 60 grados: y dos minutos tienen la mesma proporcion con 60 minutos, que dos grados con, 60 grados. Luego si tomaremos con el compas vn minuto, y le midiere-



mos. 60. vezes por la circunferencia, hara vn grado, por lo qual diremos, que la partezilla era vn minuto: y fi la parte-

partezilla fuesse dos minutos, y la midiesse mos. 60. vezes en la mesma circunferecia, tomaria dos grados; por lo qual diremos, que era dos minutos: y si la partezilla fuesse 3 minutos, y medida 60. vezes en la circunferencia, tomaria tres grados. Y porque esto es cosa tan clara, no nos detendremos mas en ella, sino que la parte de grados se tome muy justa, que aunque en las operaciones Mechanicas no puede auer precision Matematica, pero hecha esta medida con el cuydado que se requiere, no puede auer error de vn minuto para adelante.

Es de aduertir, que si la alidada cortare menos que medio grado, mas que grado justo, entonces se tomará la parte restante del grado; y con esta abertura de compas, se haran las 60. medidas, como auemos dicho, y los grados que ocuparen tantos minutos, se quitaran de 60. y los que quedaren, son los minutos mas que los grados justos. Esto se haze, porque mejor se toma la parte ma-


yor que la menor.

CAP. XXX. En que se enseña la fabrica de otro quadrante, para tomar la altura del Sol por grados, y por minutos.

OS Quadrantes paffados aunque dan la altura por grados y minutos, pero con alguna dilacion, como auemos visto, en este quadrá te que aqui enseñaremos, subitamente se to-

ma la altura por grados, y por minutos. Hagase el quadrante, ab c; y la quarta, a b, se divida en 90. partes, como se acostumbra: despues se haga otra quarta, de, que se divida en otros 90. grados, y esta quarta ha de estar apartada de la primera, poco mas de dos dedos. Despues del principio del primero grado de la segunda quarta, al sin del primero grado de la primera quarta, se tiren lineas rectas,

rectas, que se pueden llamar Diagonales de los grados de entrambas quartas. Hecho esto, se diuida vn grado en quatro partes y guales, y del centro, c, por cada vna destas partes, se poga la regla, y donde cortare la Diagonal,



fe haga vn punto, poniendo el pie del cópas en el centro c,y el otro por los puntos q fe pusieron en la Diagonal, fe haran las circunferencias, m, n, o, con las quales quedá cada vna de las Diagonales partida en quatro espacios, que cada vno vale. 15. minut. Cada espacio destos se parta en. 5. partes y guales, y valdra cada parte. 3. minutos: y con esto queda acabada la fabrica del quadrante. El espacio que ay entre las circunferencias, b d, puede ser la quarta parte del semidiametro, b c, el qual semidiametro no requiere ser menor para este instrumento, que vna tercia de vara Castellana.

El vso deste instrumento, es facil, porque tomada la Natura

altura como se acostumbra, se vea en que parte corta la alidada a la Diagonal, que segun su diuision, veran los minutos que son mas que grados. Hizieronse estas Diagonales, por que para passar la alidada de vn grado para otro, ha de passar por toda la Diagonal, y como el grado es pequeño no sufretatas diuisiones como la Diagonal, y esta es la razon de la fabrica deste instrumeto. Assi deste como de los demas, podra elegir cada vno el que mas le agradare.

CAP. XXXI. En que se ponen algunas aduertencias de la aguja de marear.



Espues de auer tratado de la altura del Polo, y de los instrumentos que para la saber son necessarios, trataremos vn poco de la aguja de marear, que es vno de los tres instrumétos que diximos, que eran necessarios para

la nauegacion. Aunque algunos han querido dar reglas de lo que nordestea, o noroestea la aguja, porque esto es cosa incierta, como adelante diremos, aqui no se tratarà fino de cierta aduertencia, segun lo que della tengo conocido. La aguja de marear es vn instrumento, con que los Pilotos endereçan su nauio por el camino que tiené de nauegar; porque tiene tal propiedad, que estando ceuada con la piedra yman, siépre mira a la parte del Norte. En vnas partes del mudo se apartamas del gen otras: vna vez para Oriente, y entonces se dize que nordestea: y otras vezes para Occidente, y entonces se dize que noroestea: y en otras partes se fixa derechaméte para el Polo del mundo. Los lugares donde los Pilotos hallan que mira derechamente al Polo, es en el Meridiano de la isla del Cueruo, yna de las Terceras: y en el Meridiano que passa por Cartagena de las Indias, y por el Cabo de Buena Esperança, donde llaman el Cabo

74

Cabo de las agujas. Otros Meridianos ay donde se fixa, que son en la mar del Sur, no se tiene buena noticia por que lugar señalado passan. Del Meridiano de la isla del Cueruo viniendo al Oriente, la aguja nordestea hasta llegar al Cabo de las agujas: y de alli hasta la India Noroestea: y del Meridiano de la isla del Cueruo hasta Nue ua España, noroestea. En Lisboa tengo observado que nordestea cerca de 8 grados: en Madrid 9 grados y me dio: en Seuilla 6 y medio . Pues esto que nordestea, o noroestea, tienen necessidad los Pilotos de saber que tanto sea, en qualquiera lugar donde se hallaren, porque de otra manera no es possible que puedan guiar su nao, por el rumbo que pretenden.


Para que mejor se entienda, pondre aqui el instruméto de la aguja. Hazese vna caxa redoda, como, a b c d, y dentro della ponen vna roseta, como, a f, d e, la qual diuiden en 32. partes y guales: y del centro, a cada vna destas partes sale vna linea, que llaman Viento. En el vno dellos como en el punto, a, ponen vna stor de Lis, que representa el Norte, y el contrario el Sur, el punto, f, el Oeste, y el punto, e, el Leste; el punto, h, el Nordeste, el punto, g, el Noroeste, y los demas se nombran como en

otra figura tenemos dicho.

A esta roseta le ponen por la parte baxa vnos hierros a manera de lisonja, que las vnas puntas vienen debaxo la flor de Lis, las quales puntas fregá con la piedra ymã, y despues de fregadas tienen propiedad de hazer bol-

uer la flor de Lis a la parte del Norte.

Suelen los que hazen las agujas, poner los hierros defuiados de la flor de lis, a la parte donde se inclina la aguja, pero esto no puede servir sino para los que nauegan hasta las Canarias, y las terceras, o algo menos. Pero seria mejor poner los hierros debaxo la flor de lis, de tal mane ra, q se pudiesse mouer a la parte dode se inclina la aguja, N 2 y dalle




y dalle la variacion que se le hallasse por la parte donde nauegan: y para esto era necessario que se tuuiesse algun instrumento (como adelante enseñaremos) para tomar la variacion de la aguja, porq supiessen quanto auian de apartar los hierros de la flor de Lisique aunque los Pilotostienen sus roteros, q les dizen en todas sus derrotas la variación de la aguja, y segun esto le dan su resguardo. Pero estas reglas de sus roteros, son hechas tan gruessamente, q muchas vezes los engañan; y assi ellos quando han de tomar algun puerto, por mas seguridad se poné en la altura del tal puerto, y despues nauegan de Leste Oeste, q en esto no pueden errar mucho: pero esta nauegacion es algo peligrofa, por q no puede faber lo que nauegan, sino porfantasia, y suelen dar en algun baxo, o otro peligro: y si los Pilotos tuniessen certeza de lo que varia la aguja, no tenian necessidad de hazer rodeo, sino nauegar derechamente, por el rumbo que los lleua

lleua al puerto donde van, aunque algunas vezes no lo pueden hazer, por el viento, o corrientes, o baxos.

Para que la roseta ande ligera, y se mueua facilmente al Polo, la ponen sobre vn peon de laton, como estan las agujas de los reloxes de Sol, con su vidrio encima, tapadas las junturas con cera, porque el ayre no la perturbe. Demas desto, esta caxa con su aguja la ponen en dos circulos de laton, a manera de balançilla, para que aunque la nao se incline y haga balance, la aguja ande siempre derecha. Estos circulos con la caxa, poné dentro de otra caxa quadrada, como se parece en la figura siguiente.

La caxa quadrada, es, a b c d, e f g; la aguja, o u rt, està encaxada en vn circulo, en el qual está dos exes, o n, r m,



diametralmente puestos: y estos exes se meten en el circulo, n h l m, en el qual se rebueluen libremente: y el circulo, h m l n, tiene otros dos exes, p h, l q, diametral-N 2 mente

mente opuestos, que cada vno dista de los primeros por vn quadrante. Estan fixos en los lados de la caxa, en los puntos, p, q, y rebueluense libremente en el circulo, h l, y con esta disposicion de circulos, la roseta està siempre derecha, sin se inclinar a vna ni a otra parte: por que si la nao se inclinare a las partes, p, q, la caxa que tiene la roseta; con su peso juega sobre los exes, n, m; y si la nao se inclinare a las partes, n, m, la caxa de la roseta juega sobre los exes, p, q, y desta suerte queda siempre derecha.

Esta caxa quadrada va puesta en la popa de la nao, poniendo la vna frente della, de popa a proa, derechamente.

Esta inuencion de la aguja en Europa, no es muy antigua; dan por inuentor della vn Aleman, y a lo que entiendo, no se sabe cierto quien aya sido el primero que nauegò con aguja, que aunque en Europa es cosa nue-ua, pero en la China es cosa que ha muchos años que se vsa nauegar con aguja, aunque no esta hecha con tanto arte como la nuestra.

La aguja con que nauegan los Chinos, la lleuan en vna escudilla de agua: en la borda desta escudilla lleuan señalados los viétos, y la aguja es a manera de vn hierro de lanceta, que tiene punta por entrambas partes, y es vna chapa muy delgada. Està cauada con la piedra y mã, y ponenla encima del agua que està en la escudilla, y alli va nadando, y se buelue al Norte, como lo hazen las de por aca, y co esto gouiernan su nao para donde quieré.

Auemos descrito la aguja de marear, segun que la vsan los Pilotos; pero por mejor tendria que los vientos se pusiessen el fondo de la caxa, o mortero, y que encima anduuiesse vna aguja, como en los reloxes de Sol; dando a la aguja el resguardo de la variación que se la hallasse de nordestear, o noroestear.

CAP.

Nauegacion. 76 CAP. XXXII. En que se trata un discurso sobre la piedra yman.



ARTO Ha dado que dezir la virtud y fuerça de la piedra yman, queriendo dar las causas porquiene propiedad de mirar al Septentrion. Algunos han dicho, que en la tierra debaxo del Polo, estan vnas grandes montañas

de piedra yman, y que estas tienen tal fuerça y virtud, que llaman y atraen a las agujas que estan cebadas con la piedra, y aun a las mismas piedras, porque poniendo la piedra en vn corcho, en vna caldera de agua, se buelue la parte de la piedra donde està la virtud y propiedad de

mirar al Norte, para aquella parte.

Otros que les haparecido que esta opinió no es buena, dizen, que esta piedra tiene respeto a cierto punto del cielo que està junto al polo Artico, y que a esta causa, quando la aguja llega al Meridiano, que passa por el polo del mundo, y por el polo de la aguja, donde esta piedra tiene respeto, que mira derechamente al polo del mundo: y quado passa deste Meridiano a otro qualquiera, que la aguja no mira al polo, sino que se aparta del a vna, o otra parte, que es lo que dizen Nordestear, o Noroestear.

Los que dizen que el peñasco de piedra yman que està debaxo del polo, lleua la aguja para aquella parte, van muy suera de camino: por se las cosas elementares no tie nen tanta suerça y virtud, sel Peñasco de piedra yman que està debaxo del polo Artico, llame y atrayga la aguja que està en el polo contrario, como vemos por experiencia: por que las agujas de los que nauegan por cerca del otro polo, siempre miran al Septentrion, como lo hazen en esta parte. Si toda via pareciesse que podia te-

N 4 nei

ner tal fuerça, que el tal peñasco llama las agujas, traeremos otro argumento, para que aunque tenga ingenio

tan duro como el peñasco, salga de su error.

Donde quiera que està la aguja està paralela al Orizonte, con tal que los braços della sean yguales, y de vn peso: pues si el peñasco la llamasse, no seria possible estar paralela al Orizonte; porque llamandola el peñasco con su suerça, la punta de la aguja auia de mirar al peñasco que la llama, por linea resta, porque la naturaleza siempre obra por las lineas mas breues, como lo enseña Vitelion en el libro. 5. en la proposicion. 5. por lo qual se auia de hincar en la superficie donde està puesta, la qual es paralela al Orizonte. Otros muchos inconuenientes tiene dezir, que el peñasco que està debaxo del Polo llama las agujas, pero con esto me parece que queda bien claro que no ay tal peñasco que llame las agujas.

Los que dizen que està en el cielo el punto, a quien tienen respeto las agujas ceuadas con la piedra yman, les ha parecido que han dado en el blanco; folo dizen, que les queda por saber qual sea este punto, y q tan apartado està del polo del mundo, y que aueriguada esta distancia, se podrian dar reglas para que los Pilotos supiessen donde quiera que se hallassen, que tanto es lo que nordestea, o noroestea la aguja. Digo que estos andan tan errados como los primeros, por no aduertir de vna cosa bien facil. Si en el cielo huuiesse punto a quien las agujas tienen respeto, se seguiria, que en espacio de 24. horas, la aguja auia de nordestear, y noroestear, y fixarse dos vezes en el Meridiano: porque dando el primer mobil en veynte y quatro horas vna buelta, todos los puntos de los cielos que estan al rededor del Polo, hazen lo mesmo. Luego el punto a quien tiene respeto la aguja, vnas vezes estaria al Leste, otras al Oeste, y otras en el Meridiano, por lo qual la aguja le yria buscando: y la

aguja

Nauegacion:

77

aguja que aqui en Madrid Nordestea casi diez grados, en vn mismo dia auia de Nordestear otros tantos: de manera, que en vn mismo dia se hallaria, que de vna postura à otra, auria, 20 grados de diserencia, lo qual vemos que no es assi, sino que donde mira a la mañana, alli mira a la tarde: por lo qual no se deue de dezir, que ay puto determinado en el cielo, a quie la aguja tiene respeto.


Sola vna respuesta les queda, a los que dizen que la agusatiene punto en el cielo a quien tiene respeto, y es dezir, que este punto està en el cielo Impireo, y que como este es sixo, que el tal punto no se muda. Aunque esta Filosofia no es muy bien recebida, dezir, que el cielo Impireo tiene influencia particular sobre las cosas elementares: pero en las cosas Fisicas, el que quiere porsiar, siépre halla vn desliçadero por donde se huyr; por lo qual nos acogeremos a los argumetos Matematicos, en donde han de cosessa se pero donde se huyr.

Sea en la figura figuiente, la Equinocial, a b c d, el polo Artico el punto, e: descriuanse paralelos a la Equinocial, segun que enseñamos en lafabrica de nuestro Astrolabio. Tirese, aec, y pongamos que esel Meridiano que passa por la isla del Cueruo, donde es comun opinion, que se fixa la aguja en el Meridiano, sin que haga variació de nordestear, ni noroestear. Tirese, b d, en angulos rectos con, a c, pues sabemos que en Madrid nordestea casi diez grados, cuya longitud contada de la isla del Cueruo, es.25. grados, y la latitud es. 40. grados.22. minutos. Tomemos en el paralelo de 40. grados, 22. minutos, el arco, h l, de 25. grados, y tirefe la linea, le, que ferà el Meridiano de Madrid, respeto de, e c, que es el Meridiano de la isla del Cueruo. Tomemos el angulo, elm, de 10 grados, que es lo que Nordestea la aguja en Madrid, y tirese, lm. De suerte, que segun la opinion de los que dizen que el punto a quien tiene respeto la aguja, que

que està en el cielo, ha de estar en el punto, m, apartado del polo del mundo por el arco, e m: y fegun la opinion de los que dizen que està en la tierra, auia de estar el penasco de piedra yman apartado del polo de la tierra otro tanto. Pues quede esto assi, y vamos adelante, y es de aduertir, que aunq en estas longitudines se errassen tres, o quatro grados, para lo que se va tratando, no importa. Pongamos el Meridiano, e f, apartado del Meridiano, e c, 65. grados, a la parte de Lelte, que es la longitud de la isla del Cueruo, al cabo de Buena Esperança. Pues es cosa aueriguada por todos los Pilotos Portugueses, que quando llegan al cabo de buena Esperança, o mas adelante yn poco, al cabo de las Agujas, que las agujas no tienen variacion ninguna, sino que estan fixas en el Meridiano. Luego estando la aguja en el Meridiano ef, no mira al punto, m, por lo qual no se deue de dezir, que el punto, m, ni otro ninguno en la linea, e a, esa quie tiene respeto la aguja. Holoson a collectione del parent

Passemos masadelante, para que se vea que no ay puto determinado a quien la aguja tiene respeto. Tambié es cosa aueriguada, que passando del Cabo de Buena Es perança para el Leste, que la aguja noroestea, y en esto no ay que poner duda, porque antes de llegar al Cabo les nordestea, y passado el Cabo les noroestea. Podria ser que el Meridiano donde se les fixa, fuesse quatro, o feys grados antes, o despues del Cabo, pero para nuestro intento no nos importa, pues aqui no tratamos el quanto nordestea, o noroestea la aguja, sino prouar que no mira siempre a vn punto, mas antes a muchos, y muy diferentes. Pongamos algun lugar passado el Cabo de Buena Esperança, y lo que en el noroestea la agusa. Vicente Rodriguez, Piloto Portugues, de los que mas fe auentajauan en aquella carrera, y que avia hecho a la India de Portugal catorze viajes, me dixo, que desde que passauan passauan el Cabo de Buena Esperança, hasta que llegauan a Goa, que siempre nordesteaua con aumento. Y esto mismo dizen todos los demas Pilotos.

En la isla de Diego Rodriguez, que es 40. grados pas fado el Cabo de Buena Esperança, y tiene. 17. grados de



latitud Austral, noroestea la aguja. 20. grados. Y en Ormuz, que està casi en el mesmo Meridiano, con latitud Septentrional de 26. grados, noroestea casi otro tanto. Pues pongamos la isla de Ormuz, 40. grados del Meridiano, f g, que es el que passa por el Cabo de Buena Esperança, y en latitud de 26. grados, q seria en el punto, u; y que la aguja haga angulo de 20. grados de noroestear,

con el Meridiano, te, y el punto adonde la aguja mira feria el punto, q, bien diferente del punto, m. Luego por experiencia vemos manifiestamente, que la aguja no tie ne respeto a ningun punto particular del cielo, ni de la tierra, pues son tantos y tan diferentes los puntos a quié mira la aguja, segun las diferentes partes del mundo dóde se halla, segun las relaciones de los que nauegan, q no ay para q gastar tiepo en referillas para esta prueua; pues es euidente demonstracion ver, q del Meridiano de la isla del Cueruo, hasta el Meridiano del Cabo noro estea, y entre los dos Meridianos no ay mas de 65 grados de longitud: por lo qual es impossible que pueda mirar a vn solo punto, sino a muchos, y muy diferentes.

Tambien es de aduertir, que no guarda mouimiento regular la aguja, en el nordestear, ni noroestear, segun q se vee manissestamente por relació de los Pilotos, quando quieran dezir, que ellos no toman esto con precisió, caso que sea assi, como lo deue de ser: pero son tantas las diferencias que haze la aguja, que no se pueden atribuyr al error de los Pilotos. Por tanto seria necessario, que por donde quiera que se nauegasse, se tomasse la variación de la aguja con mucha precision, y esto se assentantes en su esta se para que siruiesse de regla a los que nauegan.

Aunque los Pilotos toman la variacion de la aguja, no estan preciso como seria menester para caminos tan largos y peligrosos, que como auemos dicho, caen en muchos peligros por no tener buena noticia de la variacion de la aguja, porque entienden que van pon vn camino, y van por otro. Es tan grossero el modo con que los Pilotos toman la variacion de la aguja, que es poco errar media quarta de viento. Adelante se pondran instrumentos, con que se sobre la variacion de la aguja; que tanto importa, como es saber la variacion de la aguja; q

por ignorarla se han perdido muchos nauios: y tambien resulta de no saber esta variación de la aguja, las varias opiniones de Pilotos en las nauegaciones que se hazen.

Todo lo que ay que aduertir de la aguja, tocate al arte de nauegar, es lo que se ha dicho. Otras propiedades y virtudes que tiene la piedra yman, las dexo para los Filosofos, los quales se fariga mucho en querer saber la cau sa por atrae el hierro, y porque la aguja ceuada con esta piedra, mira las partes del Septentrion; y despues que se han quebrado la cabeça en dar razones, no ha dicho nada, y no es marauilla, porque como dize el Eclesiastico, cap. 8. De las obras de Dios ninguno sabe la razon, y que quanto mas trabajare por buscarla, tanto menos la hallarà. Pues contentemonos con la experiencia, aplicado la al seruicio humano, de manera que se faluen los incouenientes que se pueden ofrecer.

De aqui se puede inferir, q los que dizen q saben grades secretos de la piedra yman para la nauegacion, son hóbres que saben poco, y pareciendoles q aunque digan muchos disparates acerca desta materia, que nadie los ha de entender, se atreuen a hazer grandes promessas: y assi estos como otros muchos que prometen grandes misterios, no se les deue dar credito, sino suere primero mostrando por obra lo que dizen, y que luego suessen examinados, y faltando de lo q promete los castigas sen: y desta manera estudiarian mas, y prometerian menos, y no auria tantos que vsurpassen el premio de los

que lo merecen.

CAP. XXXIII. Que trata de las crecientes y menguantes de la mar.



IENEN Los Pilotos necessidad de saber las crecientes y menguantes de la mar, assi para entrar las barras, y canales de los puertos, como

para se desuiar de las costas y baxos que ay en la mar: porque ay muchos puertos, que sino fuere en la mar creciéte no se puede entrar en ellos. Aunque es verdad, que el crecer y menguar de la mar, tiene cierto respeto al mouimiento de la Luna, segun q nos enseña la experiecia, porq si la suma creciente de la mar fuere en vn dia a las 12. horas, el dia figuiente serà quatro quintos de hora mas tarde; y otro tanto tarda la Luna en llegar al Meridiano de vn dia para otro: pero no anda tá regular este crecer y menguar de la mar con el mouimieto de la Lu na, q como algunos ha dicho, q quando la luna està en el Orizote, es la suma menguate, y quado està en el Meridiano, es la fuma creciente de la mar, pero en esto ay variació en diuerías partes de la tierra. En esta costa de España, el dia de la conjuncion, o opoficion de la Luna, es la fuma creciente tres horas despues de medio dia: y en algunas partes de Flandes, la suma creciente el dia de la conjuncion, o oposicion, es a las quatro de la tarde: y en otrasa las cinco, y en otrasa las seys, despues de medio dia, como lo escriue Aurigario en su libro de nauegació.

Tengo relacion de algunos Pilotos, que ay parte en la India Oriental, donde no crece ni mégua la mar mas de vna vez en 24. horas. Pues para poner reglas ciertas del crecer y menguar de la mar, era necessario saber, a que hora era la suma creciente el dia de la conjuncion, o oposicion, en qualquiera parte de la tierra, por que de otra manera no se puede dar regla que enseñe cosa precisa.

Pues porque no tenemos noticia que tanto tiempo despues de medio dia es la suma creciente el dia de la conjuncion, o oposicion, en todas las partes de la tierra, pondremos vna reglageneral, para q supuesto q se sabe la hora de la suma creciéte el dia de la conjunció, se pueda saber qualquiera otro dia, la hora de la suma creciéte.

Primeramente se sepa quantos son de Luna, y estos se

multipliquen por quatro, y el producto se parta por cinco, y lo que viniere al quociente, se añada a la hora que fuere la suma creciente el dia de la conjuncion, y la hora que saliere desta suma, es la de la suma creciente el tal dia. Exemplo, en Lisboa es la suma creciente el dia de la conjuncion, o opoficion, a las tres despues de medio dia, y quiero saber quando fueren 7. de Luna a que hora sera la suma creciente, multiplico los 7.por 4. y son 28. estos parto por cinco, y viene al quociente, cinco y tres quintos; los quales añado a las tres horas, y feran ocho horas y tres quintos de hora: y a este tiempo contado del medio dia, lera la suma creciéte el tal dia, y seys horas despues la suma menguante, que seria a las dos y tres quintos despues de media noche; y de alli a seys horas seria la otra suma creciente: y segun esta cuenta se puede saber en qualquiera dia, la creciente y menguante en que dia se haze ou mo redat obaseroup ses

Es de aduertir, que las aguas viuas, que son en la conjuncion y oposicion de la Luna, vna vez en el año, exceden atodas las otras, que acontece en Iulio : y las aguas muertas otra vez en el año, es la mayor menguante, que Saluage Separo acontece por Enero. La razon desto se dira en otro lu- esteinte. gar: mas es de aduertir, que las aguas viuas van siendo mayores cada dia, desde Enero hasta Iulio, quando son las mayores; y de alli van cada dia siendo menores hasta Enero: y por esta orden las aguas muertas.

CA P. XXXIIII. Que trata de la edad de la Luna.

ARA Saber las crecientes y menguantes se presupone, que era necessario saber la edad de la Luna; pues pondremos vnas tablas, fegun el Calendario Gregoriano, por las quales se sabra el dia de la conjunció de la Luna, de dode se seguirà, faber

faber la edad de la Luna qualquiera dia del mes, aunque esto se fabra mas precisamente por algunas esemerides: pero para lo que aquise va tratando, basta saber lo como por estas tablas se enseñare.

CAP. XXV. Como se sabra quantos son de Epacta en qualquiera año.



E Las dos tablas figuientes, la primera contiene las Epactas del año de 1582. hasta el año de 1699. La segunda las Epactas del año de 1700 hasta el año de 1899. En la primera coluna de la mano yzquierda, se ponen los

años que acaban en centena; y enfrente, los que sucessiuamente van discurriendo. Las Epactas se ponen en la

coluna de la cabeça de cada tabla.

Pues queriendo saber quantos son de Epacta este año de 1594, tomo los 1500, en la primera coluna, y enfrente por la coluna adelante, hallo los 94, y encima de ellos en la cabeça de la tabla está. 8, y tantos son de Epacta. Otro exemplo, quiero saber el año de 1650, quantos son de Epacta, començando por la coluna donde está el año de 1600, se yra discurriendo por todos los numeros, hasta hallar. 50, que está en la tercera coluna, despues de los 1600, y enfrente del. 50, en la cabeça

de la tabla, estan 27. pues tantos seran de Epecta el año de 1650.

(?)

Nauegacion.

бі

Tabla de las Epactas, que comiença de 15. de Otubre, del año de 1582. que fue el año de la correccion del Calendario, hasta el año de 1700.

Epactas	26	7	18	29	10	2 1	2	I 3	124	5	16	27	8	19	Υ	12	23	4	15
1500	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
1600		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	-	24	25	26	27	28	29	30	3 1	32	33	34	35	36	37	38
	39	-			42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	-						+	page	66		-	-	70		-	73	-		76
	58	-	-	-	-	1	-	-	85	-		-	89		-	92			95
	-	-	79		-	02	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	96	97	98	99			!	1			1		!	1		1	1	1	-

Tabla de las Epactas, desde el año de.1700.hasta el año de.1900.

Epactas	9	20	1	12	23	4	15	26	7	18	*	11	22	3	14	25	6	18	28
1700	0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33.	34	2.5	36	37
	38	39	40	41	42	4;	14	45	46	47	48	49	50	e i	52	53	5-1	55	<u>5</u> 6
	57	18	59	60	61	62	63	5.4	65	66	67	68	69	70	71	72	73	7-1	75
	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1800	95	<u>-</u>	97	198	99	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	111	112	13
	14	15	16	17	18	19	20	2:1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ζ I	32
	33	34	35	16	3.7	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	53
-	52	53	1-	55	56	57	58	-	1-	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
-	71	72	-		-	-	77	78	179	80	81	82	183	84	85	86	87	82	89
	-	191	192	103	194	95	96	-	98	-	-	-	-	-	-		-		-
-	90	91	192	95	1	-	1_	.	1-	-	-	-	-		-	1	weetweet	-	

C A P. XXXVI. Quetrata como se sabra en que dia del mes es la conjuncion de la Luna.



OR La tabla precedente se sepa la Epacta del año, quando se quiere saber la conjuncion, la qual Epacta se buscarà en la coluna primera de la mano yzquierda de la tabla siguiente: y el

mes en que quiero saber la conjuncion, se tome en la cabeça de la tabla, que caminando por la coluna del mes a baxo, y con la coluna de la Epacta para la mano derecha, donde se encontraren estarà el numero que muestra el dia del mes, que sera la conjuncion de la Luna.

Exemplo, fepamos este año de 1594. en que dia fue la conjuncion de la Luna en el mes de Enero: por la tabla precedente se sabe, que la Epacta deste año de 1594. es. 8. puestomado el mes de Enero en la cabeça de la tabla, baxando por la coluna abaxo, enfrente de la Epacta 8. estan 23. y a tantos dias del mes de Enero sue la conjuncion. Y esto no es segun la cuenta y precision Matematica, sino poco mas o menos; que la conjunció verdadera, o sue algo antes, o despues: pero para lo que toca a los Pilotos, no es de cosideració medio dia mas a menos.

Otro exemplo, quiero faber el año de 1620. en q dia del mes de Março fera la conjuncion. Por la tabla precedente, el año de 1620 fon 26. de Epacta, pues tomando el mes de Março en la cabeça de la tabla, y baxando por fu coluna abaxo, hasta llegar enfrente de 26. de Epacta, en donde se hallaran. 5. y assi dire, que el año de 1620. serà la conjuncion de Março, a cinco dias del dicho mes.

Pues sabido el dia de la conjuncion, facil cosa sera saber qualquiera otro dia del mes quantos son de Luna, porque contando del dia de la conjuncion, si suere passada, hasta el dia en que se halla los dias que huuiere, que tantos son de Luna. Es de aduertir, que en frente de algunas Epactas, debaxo de los meses ay dos numeros, que en vnas partes son. 1. 30 y en otras. 1.31 quiere dezir, que aquel mes aura dos cojunciones, que la vna es en.1. del mes, y la otra en.30.0.31.

> Tabla perpetua de las conjunciones de la Luna que acontecieren todo el año, supuesta qualquiera Epacta.

Dias Bne. 1.31 2 3 4 5 6 6 7 8 9	Dias Feb. 1	Dias Mar 1.31 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9	Dias Abr. 20 1.30 2 3 4 5 4 6	Dias May 29 30 1.31 2 3 4	Dias Iuni. 27 28 29 1.10. 2 3	Dias 1410 18 29 18 20 30 1031.	Dias Ago. 25 25 29 1.30.	Dias Sept. 24 15 26 27 28 29	Dias Otto 23 24 25 20 27	Non: 72 23 24 25 26 27	Dias Dic. 21 22 23 24 25
1.31 2 3 .4 5 6 6 7 8 9	1 2 3 4 5 4 5 6	3 4 5 6 6 7 8	20 1.30 2 3 4 5 4	29 30 1.31 2 3 4	27 28 29 1.40. 2 3	27 18 20 30 1031.	25	24 15 26 27 28	23 24 25 20 27	23 24 25 26	21 22 23 24 25
2 3 .4 5 6 6 7 8 9	2 3 4 < 4 5 6	2 3 4 5 6 6 7 8	3 4 5	30 1.31 2 3 4	29 1.10. 2 3	18 20 30 1031.	25	15 26 27 28	2.4	23 24 25 26	22 23 24 25
5 6 6 7 8 9	2 3 4 < 4 5 6	3 4 5 6 6 7 8	3 4 5	1.31 2 3 4	29 1.10. 2 3	30 [1:3]	29	26 27 28	25 20 27	24 25 26	23 24 25
5 6 6 7 8 9	4	4 5 6 6 7 8	3 4 5	2 3 4	3	30 [1:3]	29	27	20	25	24
5 6 7 8 9	4	5 6 6 7 8	4 4	3 4	3 2	1031.	29	28	27	26	25
6 6 7 8 9	5 6 7	6 6 7 8	4 -	4	3 2	1			-	-	-
6 7 8 9	5 6 7	7 8	4		2						
7 8 9	5 6 7	8	7		accommon.		30	28	20	25	20
8 9 10	17	8	-	-	1 2	3	1, 31,	29	20	27	-
10	7 8	9		6	4	4	2	1.10.		1 28	17
10	8		7	17	5	5	3	2	40		70
11		10	1-8-	8	6	0	4	3	1031	2.9	-
	9	111	9	9	7	7_	5	4	2	1.30.	30
12	10	12	10	10	8	8	6-	5	3,		1.31
13	1.1	13	11	11	9	9	7	6	4	3	2
14	12	14	12	12	10	10	8	7	5 6	4	1 -2
15	13	15	13	14	1 I	11	9	18		6	4
16	14	16		14	12	12		-		-	6!
17	15	17	-	15	13	13	-	-	hereasone.		7.
18	16	18	16	16	14	14	12	II	1	-	8
10	17	19	17	17	15	15	12	12	THE PROPERTY.		9
	18	20	1 18	18		-		1 2		-	10
***************************************	10	21	10	10	-					-	11
22	20	22	120	1 20	110			Terrano, results			12
23	21	23	21	21	19			16	-	1/4	13
24	22	24	22	22	20	20		17	-		14
	-	25	23	-	21	2.1		-	Secretary	177	15
26	-	26	-		2.2	22	~		18	1 7	16
27	-	27	25	25	2.3	harmon may		20		81	17
28	26	28	1.6	26	-	-		Personal Contraction	economismos		18
		29	1	27	25	1	1	22		20	10
	28		28	28	1 :6	26	-	23	22	2;	20
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	16	16 14 16 17 15 17 18 16 18 19 17 19 20 18 20 21 19 21 22 23 21 23 24 22 24 25 26 24 26 27 25 27 28 26 28 29 27 29	16 14 16 14 17 15 17 15 18 10 18 16 19 17 19 17 20 18 20 18 21 19 21 19 22 22 22 20 23 21 23 21 24 22 24 22 24 22 23 25 26 24 26 24 27 25 27 25 28 26 28 16 29 27 29 27	16 14 16 14 14 14 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 16 16 16 16 16 17 19 17 17 17 17 17 17 17 18 20 18 18 18 21 19 19 19 22 22 22 20 20 23 21 21 21 21 21 22<	16 14 16 14 14 12 17 15 17 15 15 13 18 10 18 16 16 14 19 17 19 17 17 15 20 18 20 18 18 16 21 19 21 19 19 17 22 22 22 20 20 10 23 21 23 21 21 19 24 22 24 22 20 22 20 24 23 25 23 23 21 21 19 26 24 26 24 24 22 20 25 23 25 23 23 21 26 24 26 24 24 24 22 27 25 27 25 23 23	16 14 16 14 14 12 12 17 15 17 15 15 13 13 18 10 18 16 16 14 14 19 17 19 17 17 15 15 20 18 20 18 18 16 16 16 21 19 21 19 19 17 17 22 22 22 20 20 10 18 23 21 23 21 21 19 19 19 24 22 24 22 20 20 20 20 24 22 24 22 20 20 20 25 23 25 23 23 21 21 26 24 26 24 24 22 22 22 27 25	16 14 16 14 14 12 12 10 17 15 17 15 15 13 13 11 18 16 18 16 16 14 14 12 19 17 19 17 17 15 15 13 20 18 20 18 16 16 16 14 21 19 21 19 19 17 17 15 22 22 22 20 20 18 18 1 23 21 23 21 21 19 19 17 17 17 24 22 24 22 20 20 20 18 18 1 24 22 24 22 20 20 18 18 1 25 23 25 23 22 22 20 20 18 26 24 26 24 24 22 22 22 27 25 27 25 23 27 21 19 28 26 28 16 76 <	16 14 16 14 14 12 12 10 9 17 15 17 15 15 13 13 11 10 18 16 18 16 16 14 14 12 11 19 17 19 17 17 15 15 13 12 20 18 20 18 16 16 16 14 13 21 19 21 19 19 17 17 15 14 22 22 20 20 10 18 1 15 23 21 21 21 19 19 17 17 16 24 22 24 22 20 20 10 18 1 15 24 22 24 22 20 20 20 18 17 25 23 25 23 23 27 21 19 18 17 26 24 26 24 24 22 22 20 19 18 27 25 27 25 22 23	16 14 16 14 14 12 12 10 9 8 17 15 17 15 15 13 13 11 10 9 18 16 18 16 16 14 14 12 11 10 19 17 19 17 17 15 15 13 12 11 20 18 20 18 16 16 16 14 13 12 21 19 21 19 19 17 17 15 14 13 22 22 22 20 20 18 18 1 15 14 23 21 23 21 21 19 19 17 17 16 15 24 22 24 22 22 20 20 18 17 16 15 24 23 25 23 23 21 21 19 19 17 16 15 15 25 23 25 23 23 21 21 18 17 16 15 26	16 14 16 14 14 12 12 10 9 8 7 17 15 17 15 15 13 13 11 10 9 8 18 16 18 16 16 14 14 12 11 10 9 19 17 19 17 17 15 15 13 12 11 10 9 20 18 20 18 16 16 16 14 13 12 11 10 21 19 21 19 19 17 17 15 14 13 12 22 22 22 20 20 18 1 15 14 13 12 23 21 23 21 21 19 19 17 17 15 14 13 12 24 22 24 22 20 20 10 18 1 15 14 14 25 23 25 23 23 21 21 19 19 17 16 15 12 25

Regimiento de CAP. XXXVII. Como se sabra quantos son de Luna de memoria.

ve de ano que corre. Tomense los dias del mes quando quieren saber quantos son de Luna, y los meses desde Março hasta el mismo mes, y la Epacta de aquelaño, y todo esto junto es la edad de la Luna: y si esta suma passare de 30. quitense los 30. y los que quedaren es la edad de la Luna. Pongamos q este año de 1601. son 26. de Epacta, y quiero saber en 21. de Setiembre quantos son de Luna; de Março hasta Setiebre son siete meses, juntados con 21. de Setiembre, son 28. y a estos sutada la Epacta, que son 26. hazen 54. quitados 30. que da 24. y tantos seran de Luna.

Otro exemplo, el año de 1602. en 10. de Mayo quieren faber quantos son de Luna, la Epacta deste año es 7. júto 10. dias de Mayo con tres meses, y seran 13. y a estos junto 7. de Epacta, y seran 20. y tantos seran de Luna.

CA P. XXXVIII. Que trata de la letra Dominicat.



ARECE Fuera de proposito enseñar a los Marineros la letra Dominical, pues para su nauegación no tienen necessidad della. Aunque esto es assi, peroporó nauegando puede acontecer, como cada dia lo vemos,

que la Quaresma, y otras fiestas mouibles, les toman en la mar, donde no ay Cura q les diga las fiestas, por esto me parecio que lleuen en su regimieto vna tabla, por la qual sepa perpetuamente, en q dias del año caen las fiestas mouibles, y para esto es necessario saber la letra Dominical, la qual por las tablas siguietes se sabra facilmête. Primera

													A .				-		**	
Primera tabla de los años de Christo.										Segunda tabla de las letras Dominicales.					ras					
_										1300	009	cb	A	g	f	e	d	С	Ь	
5200	4800	4400	4000	3600	3200	2800	2400	2000	1600	1200	200	ЬА	g	f	e	d	С	Ъ	A	
\$100	4700	4300	3900	3500	3.100	2700	2300	1900	1500	1100	400	AG	f	e	d	c	b	A	g	
									.,	1000	300	Gf	e e	d	C	b :	A	g	f	
2000	4600	4100	3800	3400	3000	2,600	2200	1800	1.	000	300	f e	d	С	Ъ	A	g	f	e	į
-	<u> </u>				-				1500	800	100	e d	C	Ь	A	g	f	e	d	
4900	4500	4100	3700	3 300	2900	2500	2100	1700	1400	200	0	dc	Ь	A	g	f	e	d	c	
1												Añ	I	2	3	4	4	5	0	0
	Transferred By and to											7	18	8	9	10	11	12		
												12	13	14	is	1.6	16	17		
												18	19	20	20	2 I	22	23		
												24	24	25	26	27	28	28		
												29	30	31	32	32	33	34		
													35	36	36	37	38	39	40	
	Tercera tabla de los años											40	41	42	43	44	44	45		
					ex	pa	nſ	os.					46	47	48	48	49	50	51	
	•											52	52	53	54	55	56	56	Ì	
													57	158	59	60	60	61	62	
													63	64	64	65	66	67	68	
													68	69	70	71	72	72	73	
													74	7.5	76	76	77	78	79	7
											w		80	80	81	82	83	84	84	
													85	86	87	88	88	89	90	
													91	9:	92	93	94	195	96	
													96	97	98	99	10	0 10	0	

Tomando los años que fueren por cétenarios en la tabla primera, y los años que fueren de vno hasta ciento en la tabla tercera, y en donde se encontraren los años centenarios, y los de la tabla tercera, alli estara la letra Dominical de aquel año. Exemplo, quiero saber que letra es Dominical el año de mil y seyscientos y dos, tomo los mil y seyscientos en la primera tabla, y los dos años en la tercera tabla, encuentranse en la segunda, donde està la letra, f, la qual serà Dominical el año de mil y seyscientos y dos. Y procediendo desta manera, si concurrieren los años de la primera y tercera tabla, donde estan dos años en la tercera tabla, vno tras otro semejantes, es año de visiesto, y le responden dos letras, que la primera sirue hasta la fiesta de santo Matia, y la segunda lo restante del año. Como el año de mil y seyscientos y quatro, tomando los quatro en la tercera tabla, y los mil y feyfcientos en la primera, encuentranse en la segunda, donde està la letra, D, y delante del quatro que està en la tercera, se sigue otro quatro, que frontero del qualen la coluna de mil y seyscientos esta la latra, C, y assi dire que el año de 1604. ay dos letras Dominicales, que seran D, C; y la, D, que es la primera, seruira hasta el dia de fanto Matia, y la, C, lo demas del año.

CAP. XXXIX. En que se pone una tabla donde se hallaràn las fiestas mouibles.



OMESE La Epacta del año que corre en la mano yzquierda de la tabla, y la letra Dominical de aquel año, la primera q fe hallare despues de la Epacta,y si frontero de la Epa-

cta estuuiere la letra Dominical de aquel año, no se ha de

tomar

Nauegacion.

tomar aquella, sino la otra primera que se siguiere frotero della, estaràn los dias en que se han de celebrar las siestas mouibles. Exemplo, El año de 1592 son de Epacta. 16. y letras Dominicales, F.D. Si la letra D. que es la postrera, se hallare debaxo de la Epacta. 16. la primera que ocurriere frontero della, se hallaràn las siestas mouibles. Es de aduertir, que en los años de visiesto, siempre se han de buscar las siestas por la postrera letra, añadiendo al dia de la Septuagesima vna vnidad, y al dia de la Ceniza, si cayere en Hebrero: y assi se hallarà la Septuagesima en. 26 de Enero, la Ceniza en 12 de Hebrero, la Pasqua en 29. de Março, la Ascension en 7 de Mayo, y assi las demas siestas.

Otro exemplo, Año de 1602. son 7. de Epacta, y letra Dominical F. busco los. 7. de Epacta, y debaxo della la primera letra F. que ocurre; y frontero della, a la mano derecha, estan los dias en que se celebran las fies-

tas mouibles, como la Septuagesima en tres de Enero, y en 20. de Hebrero la Ceniza, y en 7. de Abril la Pascua, y assi como se sigue las demas fiestas.

TABLA

TABLA DE LAS FIESTAS MOVIBLES.

	xxiij xxij xxj xx	d e f	18 Ene.	4. Febr. 5 6	22 Mar 23 24	30. Abr. 1 1. May.	o.Mar. 11 12	21.May.	28 28 28	29. No. 30. No. 5.Diz.
I	xix xviij xvij xvj	go A b c	21 22 23 24	7 8 9	25 26 27 28	3 4 5 6	13 14 15 16	24 25 26 27	28 28 27 27	2.Diz. 3.Diz. 27. No. 28. No.
	xv xiiij xiij xiij	d e f g	25 46 27 28	11 12 13	30 31 1.Abril.	7 8 9	17 18 19 20	28 29 30 31	27 27 27 27 27	29. No. 30. No. 1. Diz. 2. Diz.
	xj x ix viij	A b c d	29 30 31 1. Febr.	15 16 17 18	2 3 4 5	11 12 13 14	2 I 22 23 24	i. Iunio.	27 26 26 26	3. Diz. 27. No. 18. No. 29. No.
	vij vj v iiij	e f go A	3 4 5	19 20 21 22	6 7 8 9	15 16 17 18	2 5 26 27 28	5 6 7 8	26 26 26 26	30. Nc. 1.Diz. 2.Diz. 3.Diz.
	iiij iij j	b c d	6 7 8 9	23 24 25 26	10 11 12 13	19 20 21 22	29 30 31 Lunio	9 10 11 12	25 25 25 25	27. No. 28. No. 29. No. 30. No.
25	xxix xxviij xxvij xxvij	f gA b	10 11 12 13	27 28 1.Març	14 15 16	23 24 25 26	3 4 5	13 14 15 16	25 25 25 24	1. Diz. 2. Diz. 3. Diz. 27. No.
XXV	xxiiij	c d e f	14 15 16 17	3 4 5 6	18 19 20 21	27 28 39 30	6 7 8 9	17 18 19 20	24 24 24 24	28. No. 29. No. 30. No. 1.Diz.
		g A b c	18 19 20 21	7 8 9	22 23 24 25	3 t r. Iuni 2 3	10 11 12 13	2 I 2 2 2 3 2 4	24 24 23 23	2.Diz. 3.Diz. 27.No. 28.No.

Nauegacion.

85

CAP.LX. En que se trata, como las tablas que se hizieron de lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la altura del Polo, no son mas de para un cierto tiempo.



AS Tablas que auemos hecho, para faber lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella polar, para que quede la altura del Polo, no son mas de para vn cierto tiépo; por que se mudan las declinaciones de la estrella Polar, y Guarda delantera, y tambien las ascensiones rectas. La declinacion de

la estrella Polar, se va aumentando hasta que llega al primero punto de Cancer, y entonces no distarà mas de medio grado del Polo del mundo: pero la Guarda delantera va disminuyendo en la declinación, por lo qual se va apartando del Polo del mundo. Para que entendamos mejor como vnas estrellas van aumentando la declinació, y otras la van disminuyendo, sea en la figura figuiente, el Polo del mudo Septentrional, el punto, e, la Equinocial, a b e d, el polo del Zodiaco, m, la Eclyptica, so h d; sea el Coluro de los Solsticios, a se m e h: principio de Aries, d: principio de Libra b. Segun las observaciones de Ptolomeo, la latitud de la estrella polar, es,



66. grad. Septentrional, la qual nunca se muda, segun muestran las obseruaciones. Pues sobre el polo del Zodiaco descriuamos el circulo, po, se pongamos se la paralelo de latitud de la estrella polar, el qual passarà P

por encima del polo del mundo, e, medio grado: porque teniedo la estre lla polar.66. grad. de latitud, distarà del polo del Zodiaco, 24. grad. y tanto sera el arco de Coluro, mo: y el polo del Zodiaco dista del polo del mundo 23. grad. 28. minut. en este tiempo. Luego siendo el arco de Coluro, m c,23. grad.28.min.y el arco, m o, 24. gra, sera el arco, e o, 32. min. por lo qual quado la estrella polar llegare en principio de Cancer, estarà en su paralelo en el punto, o lo mas cerca q puede estar del polo del muste do: fila declinación del Sol no se variase estaria del polo, 32 minut. Pero porque la declinacion del Sol se varia, y puede el polo del Zodiaco apar tarfe del polo del mundo, puede ser este apartamiero algo mas y menos, fegun q menguare, o creciere la declinacion del Sol. Segun el monimieto de las estrellas fixas, llegarà la estrella polar al principio de Cancer, el año de 2200 poco mas o menos: y en este tiepo la declinació del Sol será 23. gra. 36. min. segun las observaciones de Copernico. Por lo qual la estrella polar no distará del polo del mundo mas de 24. min. pero apartãdose del principio de Cancer, se va apartado del polo del mundo; de manera q quando llegare segun longitud, al principio de Capricorno, estarà en su paralelo en el punto, p, y distarà del Polo del mundo el arco de Coluro, pe, que por lo menos feran 47. gra. 28. minut. Pues figuefe, q las eftrellas q tunieren latitud Septentrional, y estunieren en la mitad del Zodiaco ascendiente, que es de Capricorno, hasta Cancer, que van aumentando la declinación Pero las estrellas que estunieren en la mitad de Zodiaco descendiente, que es de Cancer a Capricorno, y tunieren latitud Septentrional, q van disminuyendo en declinacion: como si sobre el polo del Zodiaco descreuimos el circulo, q s, que pongamos que es el paralelo de la Guarda delantera, que tiene 72. gra. 40. minut. de latitud : pues quando estuuo en principio de Cancer la declinación era el arco de Coluro, e s, y aora que está en. 9. grados de Leon, su declinacion es yn arco de circulo mayor, que viene del polo del mundo, e, y passa por, x, el lugar de la estrella, y para en la Equinocial en el punto, A. Pues, e x, es may or q es, sera, Ax, may or que, cs. Lo mismo se prueua de la estrella polar, que quando está en 22. de Gemini (que en su paralelo de latitud estara en el punto, r) tiene menor declinacion que quando está en, o, principio de Cancer. Quando está en, r, su declinacion seria vn arco de circulo mayor,que fale del polo del mundo, y passa por, r, lugar de la estrella, y para en la Equinocial en, B. Quando la estrella está en, o, principio de Cancer, su declinacion es el arco de Coluro, a o: y siendo, e r, mayor que, e o, fera, Br, menor que el arco, a o. Luego las estrellas que tunieren latitud Septentrional, and ando en la mitad de Zodiaco, h d f, siempre se van llegando al polo del mundo, y en la otra mitad, fb h, se van apartando.

Al contrario se tiene de entender, quando la latitud de las estrellas es Meridional, que las que estan en la mitad de Zodiaco descendiente, se va llegando al polo del mundo; y las estrellas que estan en la mitad de Zodiaco ascendiente, se van apartando del polo del mundo, como clarame te se puede ver en la figura siguiente. Sea la Equinocial, a b. c. d.: su polo Austral, e: el Zodiaco, fb h d, su polo Austral, m: principio de Aries, d.: y la succession de los signos como parece. Sobre el polo del Zodiaco, m,

descri-

descrivamos los paralelos de latitud, o p, s q. Pues quando alguna estrella que tuniesse de latitud Austral el paralelo, o t p r, y la tal estrella andunesse en la mitad de Zodiaco ascendiente, h d f, andaria en su paralelo en la mitad, o t p; y quando estuniesse en, o, estaria lo mas cerca del polo de la Equinocial, y por todo el semicirculo, o t p, se yria apartando del polo, hasta llegar al punto, p, donde estaria lo mas lexos del polo d se mundo, e. Pues andando la estrella en la mitad de Zodiaco descendiente, f b h, andara en el semicirculo, p r o, viniendo del punto, p, para el



punto, r, y allegandose al polo del mundo, hasta venir al punto, o, don-

de estará lo mas cerca, y con mayor declinacion.

Pues por el monimiento que tienen las estrellas sixas, segun la sucesfion de los signos, se varia la declinación, por lo qual se varia la distancia de las estrellas al polo, y assi no pueden servir las tablas sino para

vn cierto tiempo.

Hizimos vnas tablas para diferentes tiempos, fegun la declinacion y ascension recta, que sale por la longitud que en sustablas les du Copernico, para los que dieren mas credito a su dotrina, que a las observaciones que auemos hacho en este tiempo, la qual pondremos ade-

lante. Aora se pondra la longitud, declinacion, y ascension recta, que tiene la estrella polar, y guarda delantera, en los años de 1640. y 1680.

Siguense las longitudines, declinaciones, y ascensiones rectas de la estrella Polar, y Guarda delantera, para los años siguientes, segun lo ponen las tablas por la dotrina de Copernico.

E L Año de 1640. tiene de longitud la estrella Polar, 81. grad, 55. minutos, contados de principio de Aries.

Tiene de latitud. 6 6. grad. Septentrional.

Tiene de declinacion Septentrional. 86.gra. 42.min.

Tiene de Ascension recta, 6. grados.

Este ano de 1640. tiene de longitud la Guarda delátera, 98 grad. 55. min. contados del principio de Aries.

Tiene de latitud Septentrional, 72 grad. 40. minut. Tiene de declinacion Septentrional, 75 grad. 25 minut.

Tiene de ascension recta,221.g/ad.46.minut.

Elaño de 1680. tiene de long tud la estrella Polar, 22. grad.22.minut.de Gemint, y de principio de Aries. 82.grad.22.minutos.

Tiene de declinacion, 86 grados 52. minuros.

Tiene de ascension rect/,7.grad.37.minutos. Este año de 1680. tiene de longitud la grarda delantera,9.grados,22.minutos de Leon, que son de princi-

pio de Aries,99.grad.22.minutos. Tiene de declinación,75.grad.20.mir utos.

Tiene fle ascension recta, 221. grad. 6. minutos.

De minera que la distancia de la estrella Polar al Polo del mundo, el año de 1640.es, 3. grados, 18. minutos. El año de 1680.la distancia de la estrella polar al Polo del

mundo, es, 3. grados, 8. minutos.

Cf 1640 diffaporticher 2.36

Sin falfof.

CAP

Dorrachary

Nauegacion.

CAP. XLI. En que se pone vna observacion de la estrella Polar, acerca de la distancia que tiene del Polo.

S De aduertir, que dize Rodrigo Zamorano en su Compendio de nauegación, que el año de 1582. no hallò mas de 3. grados. 8. minut. de quela offerus distancia de la estrella Polar al Polo del mun-

do. Pues nosotros auemos observado esta distancia en este año de 1598. y la hallamos como se sigue. Lo pri- Ha fa de 90 Tuch mero, tomamos la altura del polo de Madrid, en el pa Tiho la Polar dist dia del Solsticio yemal, quando la declinacion del Sol 2 si casi par che la con de del sol na la relación de descripar de de sol de vn dia para otro no es sensible, y hallamos, que la sejuda de deun d altura Meridiana aparente del Sol, era 26. grados, y mas ligit de Mudid e 7. minutos, a la qual añadimos tres minutos de paralaxis que tenia el Sol, y fue su altura verdadera. 26. grados, 10. minutos, a la qual añadimos la maxima declinacion del Sol, que en este tiempo es 23. grados, 2 Salina 26 7 45 December minutos que es todo 40 grados 28 minutos y tanto es 1 30 Marina

minutos, que es todo, 49. grados, 38. minutos; y tanto es la la eleuación de la Equinocial, la qual restada de 90. que quelos de 90 guedas dan 40. grados, 22. minutos, que es lo que ay del Zenit a la Equinocial, y otro tanto es la altura del polo sobre el Orizonte de Madrid. Pues en muchas noches que aue-

mos observado la altura Meridiana de la estrella polar, estando encima del polo, le auemos hallado que tenia de altura sobre el Orizonte,43.grados, 23.minutos: y estando la misma estrella en el Meridiano, debaxo del

24 polo, tuuo. 37. grados, 24. minutos: pues restando de 40 20 to anhu a h qualquiera destas alturas, la altura del polo, quedan ca-4

361 tres grados, y tanto es la distancia de la estrella po-59 3 dar del Polo del mundo. 52 2. 50. 45 la pore Tichora tomo 9 many conta mais 3 marine tomo 9 many marine to ma 9 marine to ma 9 marine.

Esta observacion se hizo con mucha diligencia, y con vn quadrante de metal q daua minutos, por lo qual entiendo, q Zamorano se deuio de engañar en alguna cosa, aunque no deuio de ser mucho, porq su observacion

26 & Ja Solit altitudes Harimudeline his 59 39 30 Squator.

To Roboth Mideid 1000 haberade el tol no geiesta for suinskum purpositiela an latin ghille jasisoforingum mal e such home chiefel an dios el instrumento conque observe gli autor por ser pequemo y laurer hecho mal

26 7 alpera 3 facalazis 26 10 18 refraccio

Polo le Madrid 40 . 22.

y en Hima Lycipai

40 celo year, otal fix

Spara Madrid repu devio Buelshme dela Bajce q of 41.38. Jeec 40 ja el gyacio inversió.

ma! la despación (Tipo si hijo lede el Al y la delina con aca grane to magne que alhera y priba no mes inframento de la cadicala observatione que y mas de menos que al alhera y priba no ha o as de cadinación y cu; el constante o de la Regimiento de de el you que el sol hand cación que que que y anjo la observación Regimiento de de el you que el sol hand que meny y hautende deuio de ler, 20 años antes que la nuestra, y en este tiem La teres me po la estrella polar se llegò al Polo. Cristoforo Rothma-Enguelquier meion no, en la ciudad de Caselas en Alemania, hallo año de nener y et altrin de golo y of: Madrid teden dely fo 22. 9-30 menogen Son 40. 13. cay CAP. XLII. En que se demuestra la longitud, y ascenghe bei fi lay dif blemany x winds sion recta de la estrella Polar, segun la latitud que tiene, l pot allure de poto por y la declinacion que se le ha hallado. Halberadick fol y a diffarache Total VES Segun la latitud que Ptolomeo pone a la estrella Po-lar, la qual todos tienen por invariable, y la declinacion que por observacion se le ha hallado, sepamos su longitud, y ashet polo pase alle u fobil et Africabe cension recta. Sea en la figura siguiente el Meridiano, a b c d, no Tehumed y intoca la Equinocial, fg, sus Polos, ir; la Eclyptica, a c, sus Polos, kifenia de trop po co d b;la declinación que se hallò por observacion, g l. Tirese, i r, que serà que a jufumili nose el exe del mudo, y, b d, que sera exe de la Eclyptica: tirese, l K, que sera el

budica allerat - Secon Diametro del paralelo de la declinacion, el qual corta al Diametro, ir, bor In mymey en, m, y fera, e m, seno de la declinacion . Tomese, as, de 66. grados, que es la latitud de la estrella, y sera su seno, ex. Tirese, s h, paralela de, a c, y sera, sh, Diametro del paralelo de la latitud, el qual corta al Diametro, b d,en,x. Sobre el punto,x,se descriua el semicirculo, szh, del punto,o. Donde se cortan los Diametros de la declinación, y latitud, se tire, o n, perpendicular fobre,s h,y fera,o n, la comun secion del paralelo de latigde de que for tud, y del circulo de longitud de la estrella : y el arco, z n, sera lo que està a cojumiton de B. apartada del principio de Aries. Porque en esta figura se supone, que el punto,e,es principio de Aries; y, c, el principio de Cancer. Estiendase, b d, hasta, z, y tambien se estienda, l K, hasta que corte, e z, en, p. En el tria-

Lel polo elde Madridgulo, emp, estan conocien al aprecio ilem dos rodos sus angulos, por que el angulo, em p, es re-Drie Viene bien de cto, y el angulo, p e m, es la 38 a 40.22 maxima declinacion del ndiferiade 1.16. Sol: luego por la. 32. del nele le das massi primero de Euclid. quecua dande cuadarà conocido el angulo vol Magio ihinuario mpx, que fera de 66.granla objennación de dos, 32 minutos, y su seno de 9 1729 partes de las q el ieno todo tiene, 100000. y el lado, em, seno de la declinacion de la estrella, es,99862. partes de las mis mas. Pues por dotrina de triangulos, como se han

en pocu difericia di


he jo yen check him

senero di altración

queste la dicha.

Bailelone due Eyes


bangolid acers



91729. seno del angulo, e m p, con. 99862. que es el lado, e m, assi se ha el seno todo con el lado, e p, que siguiendo la regla de proporcion, viene a ser, e p, 108866. partes de las mismas: pues restando, 9 i 354. que es, e x, seno de la latitud de, e p, queda. 17512. y tanto sera el lado, x p. En el triagulo, m x p, estan con ocidos los angulos con el lado, x p, pues como se han 39821. seno del angulo, x o p, con. 17512. que es el lado, x p, assi se han 91729. seno del angulo, x p o, con el lado, x o, que viene a ser. 40339. partes de las que, h x, seno de complemento de latitud, tiene. 40673. Pues quando, h x, semidiametro del paralelo, s z h, suere. 100000. será, x o, 99178. que por las tablas le responden, 82. grados, 39. minutos, y tanto es el arco, z n. Pues el punto, z, en el paralelo de latitud, responde al principio de Aries, tendra la estrella Polar, 82. grados, 39. minutos de longitud, contada del principio de Aries.

Pues fegun la declinacion, y latitud, sepamos la ascension recta, y sea en la figura figuiente el Meridiano, y las demas lineas, como en la figura passada; y el paralelo de la declinacion, Kulidel punto, o, donde se cortan los Diametros de los paralelos de latitud, y declinacion, se tire, o n, perpendicular sobre, Kl, y sera, o n, la comun seción del paralelo de la declinacion: y el circulo que passa por los Polos de la Equinocial, y el lugar de la estrella que está en el punto, n; y assi sera su ascension recta, el arco u n, el qual arco se conocera desta manera. En el triangulo rectangulo, ext, estan conocidos sus angulos, con el lado, ex, que es seno de la latitud: pues como se ha el seno del angulo, ex, que es 91729, con el lado ex, que es 91354. Assi se ha el seno todo, que ponemos, 100000. con el lado, ex, que siguiendo la regla de proporcion, viene a ser. 9959. el qual restado de, em, que es seno de la declinacion, viene a quedar, tm, de 271. partes. En el triangulo rectangulo, tm o, estan conocidos los angulos, có

el lado, tm: pues como se ha elseno del angulo, to mi que es. 39821. con el lado tm, que es, 271. assi se ha el seno del angulo, mto, que es. 91729. con el lado mo, que figuiendo la regla de proporcion, viene a fer. 624. partes de las que m I, seno de complemento de la declinación tiene, 5233. Pues quando, Im, es 5233. mo, es. 624. y quando, lm, semidiametro del paralelo, Kul, fuere, 100000. sera, m 0, 11924. de las mismas, a las quales les responden. 6. grad. 51.



minut. y tanto es el arco, u n, que es la ascension recta de la estrella Polar, por q el punto, u, es principio de Aries en el paralelo de la declinacion. P 4 En lo

En lo que dize Rodrigo Zamorano, que el año de 1580.hallo que la estrella polar distaua del polo. 3. grad. 8. minutos; esta misma distancia dize Simon de Touar, que hallò el año de 1560, el vno y el otro lo tomaron de Gema Frisio, que dize lo obseruò algunos años antes, y le hallò esta misma distancia.

Tambien observamos la estrella que llaman Guarda delantera, y quando estaua en el Meridiano debaxo del polo, le hallamos que tenia de altura sobre el Orizonte, 26.grados, 4 minutos, que restados de 40. grados, 22. minutos, que es la altura del polo de Madrid, donde se hizo la observacion, quedan, 14. grados, 18. minutos, y esta es la distancia de la estrella al polo; y el complemento para 90. que son, 75. grados, 42. minutos, es su declinacion.

Pues segun esta declinacion, y su latitud, que es 72. grados,40. minutos, procediendo como se ha hecho en la estrella polar, tiene de longitud, 128.grados, 15.minutos; y de ascension recta, 221. grados, 55. minutos. La estrella polar tiene mas longitud por nuestra observació, que la que le ponen las tablas: y por estar en la mitad ascendiente del Zodiaco, tiene mas declinacion; y la Guar da delantera tiene menos longitud, que la que le ponen lastablas: y por estar en la mitad descendiente, tiene menos declinacion; aunque esta estrella, assi en longitud como en declinacion, difiere poco de lo que le ponen las tablas.

Concuerda esta nuestra observacion, con la que hizo Gema Frisio desta misma estrella, el año de 1550. y dize que la hallò 3. grados, 8. minutos, distante del polo del mundo: y lo mismo hallaró otros observadores en aquel tiempo. Pues he querido poner las figuras siguientes. para el que quisiere dar credito a nuestras observaciones, que vse dellas, que entiendo se hallarà bien en tomar la altura del Polo, segun que este modo de tomar

altura lopide.

En la primera figura, se pone lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, estando la guarda delantera en qualquiera de los ocho rúbos principales, segun que los Matematicos imaginan los rumbos en el Polo del mundo.


En la segunda figura se pone, lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella polar, estando la Guarda delantera en qualquiera de los ocho rumbos, segun que los consideran los Pilotos, que imaginan los

rumbos en la estrella polar.

En latercera figura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella polar, estando ella mesma en qualquiera de los ocho rumbos, segun que los imaginan los Matematicos en el Polo del mundo.

Prime-


Primera figura, fegun los Matematicos, que imaginan los rumbos en el Polo: y nuestra observacion estádo la Guarda delantera en qualquiera de los ocho rum bos.



Segunda figura, segun la consideracion de los Pilotos, que imaginan los rumbos en la estrella Polar: y nuestra observacion estando la Guarda delantera en qualquiera de los ocho rumbos.

Now be

Tercera figura, segun los Matematicos, y nuestra observacion, estando la estrella Polar en qualquiera de los ocho rumbos.




Por la primera, y tercera figura, no se puede saber en que rumbo està la Guarda delantera, ni la estrella Polar sin instrumento, el qual enseñamos atras. Vemos puesto las tres figuras passadas, donde se pone lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella polar, estando la Guarda delantera en alguno de los ocho rumbos principales, segun nuestra observacion: pero para satisfacion de los que quisieren seguir la dotrina de las tablas, pondre las figuras siguientes. Las tres primeras serviran hasta el año de 1640. Las tres que se siguen, hasta el año de 1680.

Lastres postreras, hasta el año de 1720.

Assi en las figuras passadas, como en las quese siguen, (como auemos dicho) se consideran los rumbos en dos maneras: o en el Polo del mundo, o en la estrella Polar. En el polo del mundo, los confideran los Matematicos, y segun esta consideracion, es necessario algun instrumento para conocer en que rumbo està la Guarda delantera, porque el Polo no se vee. Este instrumento enseñamosatras. Tambien se consideran los rumbos en la mesma estrella polar, como lo hazen los Pilotos; y aunque ellos hazen el repartimiento de los ocho rumbos alojo, tendria por mejor vsassen de instrumento, porque el ojo les podria engañar. En la tercera figura se consideran los rumbos en el Polo, y quando la estrella Polar llega en qualquiera dellos, que para saberlo tambien es necessario instrumento, como lo auemos enseñado atras.


En esta figura se demuestra lo que se tiene de añadir, o quitar a la altura de la estrella polar, para que de la altura del Polo, estando la Guarda delantera en qualquiera de los ocho rumbos, segun que los consideran los Matematicos.

1600.




1600.

En esta figura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la altura del Polo, estando la Guarda del atera en alguno de los ocho rumbos, segun la consideración de los Pilosos.




1600.

En esta figura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, estando ella misma en qualquiera destos ocho rumbos, para que quede la altura del Polo.




En esta figura se pone lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la altura del Polo, estando la Guarda delantera en qualquiera de los ocho rumbos, segun la considerancion de los Matematicos:

1640:



1640.

En esta figura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la altura del Polo, estando la Guarda delantera en alguno de los ocho rumbos, segun la consideración de los Pilotos.




1640.

En esta sigura se pone, lo que setiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella e Polar, para que quede la altura del Polo, estando ella misma en alguno de los ocho rumbos que se consideran en el Polo.




En esta figura se pone lo que se tiene de añadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la altura del Polo, estando la Guarda delantera en alguno de los ocho rumbos, (egun la considerancion de los Matematicos.

1680.




1680.

En esta sigura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella Polar, para que quede la El altura del Polo, estando la Suarda del atera en alguno de los ocho rumbos, segun que los consideran los Pilotos.




1680.


En esta figura se pone, lo que se tiene de anadir, o quitar de la altura de la estrella de Polar, para que quede la altura del Polo, estando ella misma en alguno de los ocho rumbos que se consideran en el Polo.



CAP. XLIII. En que se pone un instrumento con que se puede saber facilmente en que rumbo està la Guarda delantera, segun que los Pilotos consideran los rumbos.



drado, que entre por el la vara de la ballestilla justaméte, y no es menester mas fabricas above to an years?




Elvso desta estrella es, que metida en la vara de la ballestilla, pongan la parte del Norte en la parte alca, de suerte que no se incline a vna ni a otra parte: y estando assi, vean si la guarda delantera y estrella Polar caen en algun rumbo : como si la guarda estuuiere en el

en el Norte, la Polar se vea por el Sur, y assi en los demas vientos: trayendo atras, o adelante la estrella en la vara, no pueden dexar de ver las estrellas.

CAP. XLIIII. En que se pone la fabrica de vn instrumento, con q se toma la variacion de la aguja de marear.

S Tan necessario saber la variacion de la aguja de marear, q por ignorarla se han perdido, y pierden muchos nauios: y porque el modo con q los Pilotos toman esta variacion es tan

grossero, y en q puede auer mucho engaño, me parecio que seria de mucha importácia hazer algunos instrumé tos, con los quales se tomasse la variación de la aguja con mucha precision. Hagase el circulo, a b c d, q tenga por Diametro vna quarta de vara. Dentro deste circulo se hagan las circunferencias, como en la figura parece : y diuidiendo este circulo en quatro quadrantes, con los Diametros, a c,b d, el circulo mas interior se dividirà en 360 partes, que cada quarta tendra 90. Hecho esto, auemos de entender, q la linea, g K, es la Equinocial: pues tomenfe losarcos, Klig m, cada vno de 23. gra. 28. minut. y tirese, ml, que serà vn Tropico. Despues, de los grados delarco, Kl, a los grados correspondiétes del arco, gm, se tiren lineas paralelas a la Equinocial, q estas seran los paralelos de la declinacion del Sol. En la mitad inferior desteinstrumeto, se haga vn hueco en q se ponga vna ca xa co vna aguja, y en el fondo se haga vna circunferecia, dividida en 360 partes, y fino huviere lugar, se divida en 180.y del centro desta circunferencia salgan los 32.vientos. Pongase la aguja en el centro, con su vidrio encima, como se haze en los reloxes de Sol. Ha se de poner el Norte de los vientos, a la parte del centro, e, en la linea, ac: la parte, a, es el Septentrion: y la opuesta



opuesta el Sur. Despues desto se haga vna alidada, no, que sea ygual de, db, con las pinulas, o p, nq, y la linea de la consiança sera, no: el cetro desta serà, t, donde se hara vn agugero ygual de otro q se hara en el centro, e; por los quales entrarà vn perno, que se entornillarà por la parte trasera, como se haze en los Astrolabios. Demas Q 3 desto

desto, se divida la linea, nt, en esta manera. Tomando en el semicirculo, f g h, de vna y otra parte del punto, g, 5. grados; y poniendo la regla por el fin dellos, donde cortare a la Equinocial, se hara vna señal, y assi se yra por todo el semicirculo señalando la Equinocial. Estas señales se passaran a la alidada, començando del punto, e: y en la alidada del punto, t, poniendo le sus numeros, començando del punto, t, como en la sigura parece. Los blancos, A, B, D, E, se pueden sacar suera. Este instruméto tiene de ser de laton, y como auemos dicho, de vn palmo de Diametro, y vn dedo de gruesso: y si estuviere bien aniuelado, puede servir de Astrolabio; y poniédo los arcos horarios, puede ser relox vniuersal.

Vso del Instrumento.

ON Este instrumento se sabe la variacion de la aguja, al tiempo que nace el Sol, o se pone. Tomese el instrumento, y pongase paralelo al Orizonte, de suerte que la aguja se mueua facilmente: y buelta la parte del Norte al Septentrion, al tiempo que el Sol sale, o se pone, se buelua la alidada, y se ponga en la circunferencia graduada, en la latitud ortiua que aquel dia tiene el Sol, si fuere Septentrional; y si Meridional, en la
quarta que le pertenece: y concertada la alidada desta
manera, se boluera el instrumento, hasta que el rayo del
Sol entre por entrambos los agugeros de las pinulas: y
estando assi quedo el instrumento, se vea la aguja quanto se aparta del Norte, que tanto sera la variacion de la
aguja; esta variacion sera segun a la parte que se desuiare del Norte.

Resta de dezir, como se sabe la latitud ortiua. Sepase la altura del Polo donde se tomare la variació, y vn grado mas o menos, no importa; y esta se cuente del punto, f,

para el punto, g, y en fin de la numeracion se ponga la alidada, y estando assi, se vea el paralelo de la declinació que aquel dia corre el Sol, donde corta la alidada, que el numero que estuuiere donde la cortare, mostrarà la latitud ortiua. Si la declinacion del Sol suere Meridional, la latitud sera Meridional; y si la declinacion del Sol suere Septentrional, sera la latitud ortiua Septentrional.

Los paralelos de la declinación no se ponen mas de a la vna parte, porque con esto basta; porque puesta la alidada en la eleuación del Polo (como està dicho) aunque la declinación del Sol sea Meridional, se puede contar por los paralelos que estan en la parte del Norte; que el paralelo de la declinación cortarà en la alidada, la misma latitud ortiua, que si estuuieran los paralelosa la parte del Mediodia.

CAP. XLV. En que se enseña la fabrica de otro instrumento, con que se toma la variación de la aguja a qualquiera hora del dia, como se vea el Sol.

A vi

AGASE El circulo, abcd, del tamaño de vn palmo de Diametro, y tiene detener casi medio dedo de quadrado: ha se de poner muy en redondo, y sea de buen laton, que es

la mejor materia para instrumentos Matematicos. Diuidase la quarta, a d, en. 90. partes yguales, començando del punto, d: y esta diuision se hara por la borda interior. En el punto, a, se ponga vn suspensorio: debaxo deste circulo, a b c d, se ponga el circulo, e f, bien ajustado con el, y que se pueda mouer al rededor con suauidad, de suerte que no se pueda salir suera del circulo, a b c d. Ha de auer otro circulo, g h Kl, que se meta debaxo del circulo, e f: ha de ser del mismo ancho que los otros, pero no muy gruesso. Este circulo, g h Kl, se diuirà por la parte con-

te concaua en quatro quartas: y en las dos opuestas, g, K, se clauara con dos exezillos en el circulo, ef, de manera que sobre estos exes se pueda moueral rededor. La quarta, g h, se diuida en quarenta y cinco partes y guales, y lo mismo la quarta, h K. Esta diuisson se hara por vna linea

que vaya por medio del ancho del circulo.


Hecho esto de la tabla de la declinación del Sol, se tomen los grados que tiene de declinacion el principio de cada signo, y se cuenten del punto, h, a la vna y otra parte, señalando con lineas donde es el principio de cada signo, poniedo los signos Septentrionales en la quarta,h K;y los Meridionales en la quarta,h g.En el puto,l, se hara vn agugero, como se haze el de las pinulas del As trolabio, ancho por la parte conuexa, y estrecho por la parte concaua. Demas desto, se ponga el circulo, m n, de manera que el centro del venga en el punto del Suspéforio. Este circulo se clauara en el circulo, a b c d. Tienese de dividir este circulo, m n, en 32. partes y guales: el punto,m,fera el Norte, y el punto, n, el Sur, que han de estar en el medio del circulo, a b c d. Sobre este circulo se pódra el Indice, p q: y en la linea de la conança se hara el agugero, o, por donde entrarà el perno del suspensorio. Todo estarà dispuesto de manera, que pueda jugar en el perno sin mucha premia. real anto ya se

Diuidale la quarta, gh, en 45. partes, porque se pone el agugero por donde entra el Sol fixo. La demostracion es clara: pongamos que estaua el Sol en principio de Sagitario, siendo el punto, l, la Equinocial: y el agugero mouible auiamos de passar al punto, r, que es la declinacion de Sagitario: y en la parte opuesta auiamos de tomar el arco, ut, ygual del arco, lr, y suera el punto, t, principio de Sagitario: pero estando el agugero sixo en l, entrando el rayo del Sol por, l, tiene de yr paralelo al rayo del Sol, que entra por, r; por lo qual el arco, r l, tiene

Nauegacion:

20

de ser ygual delarco, ts, y elarco, rl, era ygual delarco ut: luego elarco, us, es duplo delarco, ut, por lo qual la quarta, gh, se partio en 45 partes.



Vso del Instrumento.

Polo, donde se hiziere la observacion: y colgado libremente el instrumento del suspensorio, se buelua la parte, b, para el Sol, y traygase el agugero, l, a la parte del Oriente, si fuere antes de medio dia: y leuantese el agugero, o se baxe hasta que el rayo del Sol dè en su declinació en la parte opuesta: y estando esto assi, el circulo, a b c d, estarà en el Meridiano. Pues si se pusiere el Indice, p q, de popa para proa, en el circulo, m n, se verà en este

este circulo el rumbo por dode nauega la nao: y todo lo que apartare el tal rumbo en la aguja del Piloto del rubo que apopa a proa, es la variación de la aguja (para esta operació ha de estar los azeros debaxo la stor de lis) sera la variació segun a la parte que apartare. Esta observació sepuede hazer en qualquiera hora, como no sea cerca del medio dia; y es bien hazerla vna y dos vezes, hasta que sen en qualquiera del Polo se errasse vn grado en esta operación, no sera error sensible.

Este instrumento, y el que se sigue, son de mucha importancia, si en los Pilotos huuiesse tanta curiosidad, que se supiesse aprouechar dellos, que con solos ellos a falta de aguja, se podria nauegar por todo el mundo: pero pues no ay falta de agujas, seruiran para corregir sus variaciones, que es vna de las cosas importantes en la nauegacion; que hasta aora se ha tratado este punto muy grosseramente, y ha sido causa de perderse muchos

nauios.

CAP. XLVI. En que se pone la fabrica de otro instrumento con que se toma la variación de la aguja, mediante la estrella Polar, y Guarda delantera.

podia saber la variacion de la aguja, me parecio poner el instrumento siguiente, porque se trate en esta parte lo que se puede dezir de somar la variacion de la aguja en la mar; que prouando por vno y otro modo, si todos conforman, o alomenos discreparen poco, es señal que han obrado bien: y el Piloto no deuriatener en esto pereza, ni ser escaso en cóprar los instrumentos, pues le importa mas de lo que el piensa. Hagase el circulo, a b c, del tamaño que aqui parece,

rece, y en el se pongan las estrellas Polar, y Guarda delantera, con el arte que se pusieron atras, para conocer en que rumbo estava la Guarda delantera. Tambien se pondran en el las horas, poniendo las 12, en la linea, e a,

y las demas con el orden que aqui lleuan.


Hagase otro circulo, fg h K, en el qual se pondrá los espacios que aqui se muestran, y en ellos se pondran los meses có sus numeros, y en el espacio postrero los ocho vientos, poniendo el Norte enfrente de seys de Mayo. En el concauo deste circulo, fg h K, se tiene de encaxar el circulo, a b c, de manera que se rebuelua dentro del, sin que se pueda salir: y en el circulo, fg h K, se tiene de hazer dos muescas; la vna frontero de seys de Mayo, la otra en la parte opuesta. Demas desto, se haga el circulo l m, y partase en dos mitades en los puntos, l m, donde se haran otras dos muescas, que que pan el gruesso del circulo, fg h K, el qual se encaxará con el circulo, l m, de suerte que haga con el angulos rectos: y si se soldaré por los encaxes, sera mejor.

Hagase otro circulo, n p qr, que venga justo sobre el circulo, lm, y que este circulo se rebuelua dentro del circulo, n p q r, sin que se pueda salir del. Diuidase el circulo, n p q r, en quatro quartas; y la quarta, n p, se diuida en 90. partes, y se le pongan sus numeros, començando del punto, n, donde se pondra vn suspensorio, y debaxo deste suspensorio vn circulo pequeño, como en el instrumento precedente, y su Indice encima: en el circulo se pondran los vientos, poniendo el Norte encima de se ys de Mayo. La graduacion del circulo, f g h K, ha de mirar a la quarta, n p, ha de auer en los puntos, A, D, sendos

agugeros.


Regimiento de Vío del Instrumento.

Olgado el instrumento del suspensorio, y la quarta, n p, al rostro, y la parte, f, que conviene con la parte, l, puesta en la elevacion del Polo, se rebuelua el circulo, a b c, hasta que por el agugero, D, se vea la estrella Polar, y por el agugero, A, la Guarda delantera, todo a vn mismo tiempo: y estando en esta postura el



instrumento, se ponga el Indice de popa a proa; y en el circulo pequeño señalarà el viento por donde nauega la nao: y si en la aguja que lleua, el Piloto hallare que Nauegacion.

el mismo viento va de popa a proa, es señal que la aguja no tiene variacion: y todo lo que el tal viento discrepare de popa a proa, es la variacion de la aguja de Nordestear, o Noroestear. Demas desto se verala hora que corre, la qual señala el dia del mes; y la linea, e a, muestra el rumbo en que està la Guarda delantera: y la linea, e b, el rumbo en que està la estrella Polar. La industria del Artisice podra suplir la fabrica que con muchas palabras no se pudiera bienexplicar.



R

CAP

CAP. XLVII. Que trata del modo que se deue tener en echar punto en la Carta.



E Mucha importancia es al Piloto, saber echar punto en la Carta, para conocer el lugar donde està su nao, porque esto le sirue de saberse guardar de baxos, y bancos, y otros peligros que la Carta les enseña: y tambien si

alguna cosa de nueuo se hallasse que se huviesse de asfentar en la carta, se pusiesse en su verdadero lugar. Pues fuelen los Pilotos echar punto en la Carta, en dos maneras; la vna llaman de Esquadria; la otra por fantasia: la vna y la otra pondremos aqui, con mas claridad que fuele estar en otros regimientos. Pues sea en la figura figuiente, las lineas, a b, c d, los paralelos de la Carta; v la linea, a c, vn Meridiano: y pongamos en el punto a, vn puerto de donde sale vn nauio, y tiene de nauegar para el punto,d, por el rumbo, a d. Pues quando se quiere saber en que parte del rumbo, ad, se halla la nao, toma el Piloto la altura, la qual cuenta en el Meridiano graduado: pues abriendo el compas, y poniendo la vna punta en el punto, u, y la otra en el mesmo Meridiano, en el paralelo mas cercano, que pongo que fea en,a, pues lleuando la vna punta por el paralelo, a b. y la otra ygualmente apartada, saliendo del punto, u, y donde la punta que salio del punto, u, cortare al rumbo,a d, que sera en el punto, t, alli estara la nao.

Esto sera assi verdad, si el Piloto estuuiere cierto, que el rumbo por donde ha nauegado la nao, es la linea, a d. Pero suele auer algunas causas por donde la derrota que leuò la nao, no suesse la linea; a d. Lo primero, puede ser incierta la derrota, por no saber cierta la variacion de la agusa. Tambien puede ser incierta la derrota, porque alguna suerça de viento pudo hazer

decaer

decaer la nao de la derrota que lleuaua. Puede auer otro impedimento, que son las corrientes de las aguas. Qualquiera destas causas es bastante para hazer decaer la nao de la derrota que lleuaua, y aunque el que gouierna el timon tenga cuydado de que la proa vaya endereçada por el rumbo, a d, pero contodo esso auiendo alguna de las causas que auemos dicho, puede la nao decaer del rúbo, a d, y entonces vsan los Pilotos del punto de fantasia,

que llaman enmendarse. Con lo pap se de l'accessorate à


Pues digo, que saliendo la nao del punto, a, y nauegando al parecer del Piloto, por el rumbo, a d, puede hallarse en la altura del punto, d, y estar apartada del tal punto al Leste, o al Oeste, aunque el que gouierna lleue siempre endereçada la proa por el rumbo a d. Quando la nao parte del punto, a, puede ser que las corrientes sean de la parte del Norte, que aunque el viento la lleuasse por el rumbo, a d, que estas corrientes la passassen a la linea, go, paralela de, a d, y luego a la linea, o l, y de alli a la linea, l h, y despues a la linea, h K, y finalmente a la linea, Ke : y aunque la proa va endereçada por la linea, a d, segun que les enseña la aguja, no dexa la nao de caminar por estas lineas que auemos dicho, porque van equidistantes a la linea, a d, y fin que el Piloto sienta este decaymiento en su aguja, puede la nao por fuerça de la corriente passar por todas estas lineas. Esto mismo puede hazer la fuerça del viento, como quando nauega a orça. Tambien puede hazer esto mismo la variacion de la aguja, no lleuando el resguardo que tiene menester. Luego segun esto, bien puede estar la nao en la altura del punto, d, y auer nauegado al parecer del Piloto, por el rumbo, a d, pero no estar en el punto, d, sino en el punto,e. lagard by inclamate investition of the con

Pues quando el Piloto viere, que por alguna de las

causas la nao ha decaydo de la derrota, a d, tiene necessidad de echar punto por fantasia, parasaber donde està fu nao. Es de ver aora, como conocera el Piloto á la nao ha decaydo del rumbo, a d. Dos caminos ay por donde el Piloto puede faber si ha decaydo su nao del rumbo ad, pero el vno ni el otro, no son tá ciertos que por ellos se pueda saber el descaymiento có certeza: y destos dos caminos, aunque entrambos son inciertos, pero el vno tiene menos error que el otro. De le la contacto e

Puesel vn caminoferia, que sabiendo la hora que es quando se sale del punto, a, y quando llegasse al paralelo u t, tomasse tambien la hora, y viesse el tiempo que ay entre la vna y la otra; y que con algun instrumento sua piesse el tiempo que passò desde que partio del punto, a, hasta que llegò al paralelo, ut, la diferencia destos dos tiempos, sera la longitud que ay entre el Meridiano donde partio la nao, y el Meridiano donde se halla

en el paralelo, ut. Pues esta diferencia de tiempo, reduzida a grados de Equinocial, que feria, dando por cada quatro minutos de tiempo vn grado, y contados es tos grados por el paralelo, ab, fillegare al punto, x, y por alli fe tirare vn Meridiano xy, y efte paffare por many chang and, one mind of



el punto, t, es señal q la nao està en el puto, t. Puespor la altura està sabido q està en el paralelo, u t, yq nauegò por el rubo,a d:pero si los grados no llegare sin o al punto,t, la nao està en el Meridiano, rz: y sabido por la altura, q

està

està en el paralelo, ut, de necessidad estarà en otro punto fuera del punto, t, que seria en el punto, l, y sera senal que la nao ha decaydo del rumbo, a d. Si como eftà dicho, huuiera algun instrumento que midiera justamente el tiempo, desde que la nao sale de vn punto, hasta que llega a otro, fuera certissimo modo para saber en qualquiera tiempo, donde està la não. Pero es impossible que se halle en la naturaleza arte con que medir el tiempo justamente, y auiendo de error en vno o dos dias, media hora de tiempo, que es cosa muy possible, por muy regular que sea el instrumento, se erraràn mas de 120, leguas: y esto seria a bien librar, que alguna vez se errarà en el tiempo mas de vua hora, que serian mas de 240 leguas. Por lo qual, nadie se canse en buscar por esta via las longitudines, porque se cansarà en vano, como algunos en este tiempo lo han hecho. Los antiguos lo intentaron, vsando para esto de ampolletas de arena, y clypsedras, que espor decurso de agua, pero la experiencia los desengaño, que no corrian ygualmente, como es assi necessario; porque no se hallarà en naturaleza materia que no la altere el tiempo, y en este particular esto y bien desengañado.

Elotro modo de echar punto en la carta, espor fantasia, que es lo que hazen los Pilotos, porque auiendo tomado sualtura, que pongo que se hallen en el paralelo, ut, y que por el punto de esquadria se hallen en el punto, t, y para ver si esto es assi, o si la nao ha decaydo, toman la distancia, at, en el tronco de leguas, y si estas leguas les responden a las que ellos tienen en su fantasia que puede auer caminado la nao, dizen, que està en el punto, t, y que la nao ha nauegado por el rumbo, a d, sin que aya hecho decaymiento: pero si las leguas de su fantasia son menos que las si con-

R 3

tiene;

tiene, at, notablemente dizen, que la nao ha decaydo del rumbo, a d: y aqui entra el echar su punto por fantassa:

Ponen los regimientos que hasta aora traen los Pilotos, ciertas maneras que llaman de enmendarse, las quales allende que son embaraçosas, no tienen ninguna demostracion, ni la razon porque se haze de aquella manera. Pues quando el Piloto hallare por su fantasia, que las leguas que tiene nauegado son menos que las que se contienen en la linea, at, es señal que la nao ha decaydo del rumbo, a d, para la parte del punto, e. Y sabido por su altura, que la nao està en el paralelo, ut, tome las leguas de su fantasia en el tronco de leguas, hecho para aquella altura: (fegun que fe dira adelante)y puesto el compas en el punto, a, y donde el otro pie alcançare, en el paralelo, ut, que pongo que sea en el punto,l, allı estara su nao, y de alli començarà otra vezaendereçar su nauegacion para el punto, d. Pero si hallare que las leguas de su fantasia son mas que las que contiene la linea, at, es señal que la nao ha decaydo del rumbo, a d, para la parte del punto, b: y sabido por su altura, que està en el paralelo, ut, tomarà las leguas de su fantasia, y puesto el vn pie del compas en el punto, a, y donde el otro pie alcançare en el paralelo, u t, que pogo que sea en,q, alli estarà su nao; y deste punto podra endereçar su viaje para el punto, d.

Es de aduertir, que los Pilotos toman las leguas por el otronco que lleuan en su carta, el qual no puede seruir para todas alturas, como consta, y està demostrado en nuestra Hydrografia. Si las leguas de la fantasia del Piloto sueran ciertas, y tomadas de los troncos conuenientes, no auía que dudar, sino que el punto que se hallò era en el que estaua la nao: pero porque los Pilotos

fuelen

Nauegacion.

100 fuelen dar mas y menos leguas, en cada fingladura, de las que andala nao, no hallan el punto verdadero donde està su nao; mas con todo esso se acercan mas a la verdad, que por el otro camino que se ha dicho, y no es tan

embaraçofo, ni de tanto cuydado.

Quando acontece auer corriétes, o otras causas (como auemos dicho) que pueden hazer decaer la nao, luego los Pilotos las echan de ver, y el remedio que vían, es, nauegar por otro rumbo que estè mas llegado a la parte donde vienen las corrientes, que no el que los ha de lleuar a la parte donde van: como si el rumbo por donde se ha de nauegar fuesse, a d, Nordeste Sudueste, y las corrientes fuessen de la parte del Norte, entonces procurarian nauegar por Sudueste quarta al Oeste, algo mas o menos, segun que les pareciesse era necessario para rehazer lo que las corrientes les hazen decaer a la parte del Sur. Pues los Pilotos que son diestros en la nauegacion, quando se ofrece alguna de las causas por donde la nao puede decaer de la derrota que han de lleuar, se preuienen con los remedios que se han dicho, para hazer su nauegacion mas cierta: y si el Piloto se descuy da en hazer estas diligencias, se suele hallar en parte que no sabe donde està, como a muchos acontece, lo qual sueleser causa de perderse.

Quando el Piloto nauegare por paralelo, que es de Leste Oeste, es incierta la nauegacion, porque no sabe lo que tiene nauegado, y queda al suyzio del Marinero, y este se suele engañar en el numero de las leguas que le parece auer nauegado, por lo qual no podra estar

cierto del punto en que se halla su nao.

Pues para que con alguna mas certeza se sepa en que punto està el que nauega de Leste Oeste, hize vna rabla, donde se ponen las leguas que responden a cada grado

de paralelo. Auiendo sabido las leguas que el Piloto tiene nauegado por su fantassa, parta estas leguas por las que vale cada grado de paralelo por donde nauega, que en el numero quociente vendran los grados de longitud que ha nauegado, los quales si los contare del punto de donde partio, segun hizo la nauegación, donde feneciere el numero alli estará su nao: y sino quiere tomar tanto trabajo de hazer esta particion, yse del tronco de leguas conueniente altal paralelo.

Declaracion, y vso de la tabla figuiente.

N La coluna del titulo que dize, Grados de latitud, se busca la latitud del pueblo, cuyo grado queremos saber quantos minutos de Equinocial vale. Frontero del tal grado para la mano derecha, en la coluna del titulo que dize, Minutos de Equinocial, se hallaràn los minutos, segundos, y terceros de Equinocial que vale aquel grado. Y mas adelante, en la coluna del titulo que dize, Leguas, se hallaràn las leguas Españolas, y minutos de legua que vale el mismo grado. Danse por cada legua. So. minutos. Pues esta tabla enseña de vn grado de latitud, hasta. 90. y va de medio grado

en medio grado, cofa es bien vtil para los que nauegan, y para los que hazen Geografias particulares:

AT				10	
N	au	eg	ac	10	n

101

			-							~	-								-			-					
OLAUGS DE	aritud.		Minutos de	raninocial !	reguas E1-	pañolas.	Oranos de	Grados J		Minutos de	Equipocial	reguas.	Por se	Cracios ac	aticud.		Minutos de	Toning Cial	T.Eguas.		and conpre	atitud.		Minutos de	E	Teguas.	7
G	M	M	IS.	T	o	M	G	M	M	S	Ť	0	M	G	M	M	S	T	0	M	G	M	M	S	T	0	M
0	30	34	59	52	17	30	23	0	55	13	49	16	7	45	30	42	10	17	12.	15	68	0	22	28	35	6	33
1	0	59	59	28	17	30	23	30	55	1	24	15	3	46	0	41	40	47	12	9	68	30	2 1	59	25	6	25
i	30	59	58	46	17	30	24	0	54	48	46	15	59	46	30	41	18	5	12	3	69	0	2 1	30	8	6	16
2	0	59	57	49	17	29	24	30	54	35	52	15	55	47	0	40	55	12	11	56	69	30	21	0	45	6	7
2	30	59	56	35	17	29	25	0	54	22	43	15	51	47	30	40	32	8	11	49	70	0	20	31	17	5	58
3	0	59	\$ 5	4	17	28	25	30	54	9	18	15	47	43	0	40	8	53	11	42	7	30	20	1	42	5	50
3	30	59	53	-18	17	27	26	0	53	55	40	15	43	48	30	39	45	16	11	3.5	71	0	19	32	3 :	. 5	43.
4	0	59	51	14	17	27	26	30	53	41	46	15	39	49	0	39	2 1	49	11	28	71	30	19	2	18	5	33
4	30	59	48	55	17	26	27	0	53	27	38	15	35	49	30	38	58	2	11	21	72	0	18	32	27	5	24
5	0	59	46	19	17	25	27	30	53	13	15	15	31	50	0	38	34	3	11	14	72	30	18	2	33	5	15
5	30	59	43	26	17	24	28	0	52	58	-7	15	27	50	30	38	9	53	11	7	73	0	17	32	33	5	5
6	0	5 9	46	i7	17	24	28	37	52	43	45	15	23	51	0	37	45	34	11	20	73	30	17	2	28	4	58
6	30	5 9	36	52	17	23	29	0	52	28	38	15	18	5 1	30	37	2.1	3	10	53	74	0	16	52	18	4	29
7	0	59	33	10	17	22	29	30	52	13	17	15	14	52	.0	36	56	2.3	10	46	74	30	ı 6	2	4	4	4.1
7	30	59	29	13	17	20	30	ő	51	57	42	15	9	52	30	36	`3 I	33	10	30	75	0	15	3)	32	4	32
8	Ó	\$ 9	24	58	17	19	30	30	51	41	52	15	4	53	0	36	6	3 2	10	32	75	30	15	1	22	4	23
8	30	<u>-</u>	ż0	28	17	18	31	0	5 İ	25	49	15	00	53	30	35	41	22	10	24	76	0	14	3 C	55	4	14
9	0	59	15	41	17	17	31	30	51	9	3 1	14	56	54	0	35	16	Z	10	16	76	30	14	0	24	4	5
9	30	59	10	38	17	16	3 ż	-0	50	52	159	14	50	54	30	34	50	32	10	8	77	0	13	25	49	7	56
10	0	59	5	19	i7	15	32	30	50	36	13	14	45	55	0	34	24	53	10	00	77	30	12	59	3.1	3	47
- iô	30	58	59	43	17	13	33	0	50	19	13	14	46	55	30	33	59	4	9	52	78	0	12	2 2	2.9	3	38
i	0	58	53	52	17	ir	33	30	50	1	59	14	35	36	0	33	33	6	9	46	78	30	11	57	20	3	26
1					-				-												-		0		1		1

Grados |

19776			u		4-9	1.8
K	eo	1111	1	en	to	de
*	~ ~	AAAA	•	O'II	بدب	CLO

	Grados de	Tarismal	Minutos de	Equinocial.	Pres F	pañolas.	Con coo de	Grade de		Minutos de	3	Leguas:	1	County of the	Grados de		Minutos de		-chuga-	Tagrina	Grados de	latitud.	TATION OF THE PARTY OF THE PART	Minuros de		Leguas.	-
-	GIA	A N	1 5		-		G	M		-	T	0	M	G	M	M	-	T	0	M	G	M	M	-	T	0	M
	1 3	0 5	8 4	7 4	4 1	7 9	34	0	49	44	33	14	30	56	30	33	6	59	9	38	79	0	11	26	55	3	20
1	2	0 5	8 4	I 2	0 17	7	34	30	49	26	52	14	25	57	0	32	40	42	9	3/1	79	30	10	56	3	3	I
1	2 3	0 5	8 3.	4 4	0 17	5	35	0	49	8	56	14	20	57	30	32	14	17	9	24	80	0	10	25	8	3	2
I	3 (5	8 2	7 4	4 17	3	35	30	48	50	49	14	15	58	0	31	47	43	9	17	80	30	9	54	18	2	5
1	3 3	0 5	8 2	0 3	2 17	7 1	36	0	48	32	28	14	IC	58	30	3 1	2 I	0	9	9	81	0	9	23	10	2	44
I.	4 c	5	8 1	3 4	16	58	36	30	48	13	53	14	4	59	0	30	54	9	9	1	81	30	8	57	7	2	31
1.	4 30	5	8 5	2	011	5 56	37	0	47	55	6	13	58	59	30	30	27	9	8	53	82	0	8	21	2	2	21
15	0	5	7 5	7 21	0 16	54	37	30	47	36	5	13	53	60	0	30	0	0	8	45	82	30	7	49	54	2	1
15	30	5	7 49	5	16	52	38	0	47	16	51	13	48	60	30	29	32	44	8	37	83	Ð	7	18	44	2	8
16	C	57	40	3:	3 16	49	38	30	46	57	24	13	42	61	0	29	5	19	8	29	83	30	6	47	32	1	55
16	30	57	3	4	16	47	39	0	46	27	44	13	36	61	30	28	37	47	8	21	84	0	6	10	18	1	49
17	0	5	2 2	41	16	44	39	30	46	17	51	13	30	62	0	28	10	6	8	I 2	84	30	5	45	3	Y	40
17	30	57	13	23	16	41	40	0	45	57	46	13	28	62	30	27	42	18	8	4	85	0	5	13	46	1	31
18	0	57	3	49	16	38	40	30	45	37	28	13	18	63	0	27	14	22	7	56	85	30	4	42	27	1	2, 2
18	30	56	53	58	16	35	41	0	45	16	58	13	12	63	30	26	46	19	7	48	86	0	4	11	8	1	13
19	0	56	43	52	16	32	41	30	44	56	15	13	6	64	0	26	18	8	7	40	86	30	3	44	47	I	4
19	30	56	3 3	3 1	16	29	42	0	44	35	20	13	00	64	30	25	49	51	7	32	87	0	3	8	25		55
20	0	56	22	54	16	26	42	30	14	14	12	12	54	65	0	25	21	26	7	24	87	30	2	27	2		46
20	30	56	14	3	16	23	43	0	43	52	58	12	48	65	30	24	52	54	7	16	88	0	2	5	38		36
2 I	0.	56	0.	54	16	20	43	30	43	31	2 1	12	42	66	0	24	24	15	7:	7	88	30	1	34	14		27
2 I 2 2	30	55 55	49 37	30 52	16		44		43		- 1			66	30	23	55	30		58	89	3.0	1		50		18
22	30			59	16								21	671	30		5.7	39	- 1	41		00	0	31	25	- 1	90
		neti) pome		Triang age	,			Challeng S															(E	1	O .	-

Nauegacion:

CAP. XLVIII. Que enseña como se tienen de hazer los troncos de leguas en las Cartas de nauegar.



N Todas las Cartas de nauegar que hasta aorase han visto, solo tienen vn troco de leguas, y con este miden las leguas, assi de la Equinocial y Meridiano, como de qualquiera parale.

lo; lo qual es error manifiesto, como se demostrò en el fegundo, y tercero capitulo de nuestra Hidrografia: por que estando hecho el tronco, segun los grados de circulo mayor, no se pueden medir con el los grados de circulo menor. En la Carta de nauegar, los grados de circu lo menor, son yguales a los grados del circulo mayor. Por lo qual los lugares que estan en los paralelos, estan mas distantes vnos de otros en la Carta, que no estan en latierra: y porque los vnos y los otros grados, los Pilotos los miden con vna milma medida, vienen a caer en muchos errores. Pueden dezir, que quando los Pilotos nauegan por paralelo, que puede ser el error por no echar bien el punto de fantasia. Es assi verdad, que por no echar bien su punto se erraran, en no saber donde està su nao: y si a este error se le ajunta el que toman del tronco de leguas, sera mucho mayor el error que cometen. Sin ninguna duda se pierden muchas naos por semejantes ignorancias, porque es muy ordinario, quando los Pilotos van a demandar algu puerto, nauegar vna buena parte del camino por paralelo; y aunque segun este modo de nauegar, van mas ciertos de no errar el puerto, pero tambien van con algun riefgo de algun peligro, por no saber que tan lexos, o cerca estan del puerto, por las razones que auemos dicho.

Pues para que con mas certidumbre haga su viaje el Piloto, quando nauegare por paralelo, es necessario que en la Carta de nauegar se pongan diferentes troncos de leguas,

leguas, vnos para grados de circulo mayor, y otros para algunas alturas, que vsando el Piloto del tronco conueniente a la altura por donde nauega, si fuere diestro en echar su punto de fantassa, estarà muy cierto del lugar donde està su nauio: lo qual es de mucha importancia para saberse guardar delos peligros que puede ocurrir.

Porque esto se vea mas claramente, pongamos vn exemplo del que nauega por paralelo de 60. grados de altura, y fean dos pueblos, el vno delotro. 6. grados de longitud; claro està que del vno al otro ay. 52. leguas y media, porque cada grado deste paralelo vale ocho leguas y tres quartos de legua, y en la Carta de nauegar dista el vno del otro. 105 leguas. Pues si el Piloto nauegando por este paralelo, tuuiesse por fantasia que auia nauegado. 48. leguas, y tomando estas leguas del tronco que ordinariamente lleuan en su carta, y poniendolas como acostumbran en el paralelo de 60.grados, allegarian cerca de la media distancia que ay entre los dos pue blos en la Carta, y el Piloto pensaria, que su nao estaua en aquel punto, lo qual seria engaño muy grande: porque auiendo nauegado. 48. leguas estaria muy cerca del puerto; y pensando el Piloto que estaua tan lexos como hallaua por su cuenta, se descuydarian de dar el resguardo que conuenia, para librarse del peligro en que podia caer.

Aunque quedò dicho atras, como se podia saber caminando de Leste Oeste, en que parte del paralelo estaua la nao, y esto mediante el punto de fantasia, y la tabla
donde se ponen las leguas que responden a cada grado
de paralelo, pero para que los Pilotos no se embaracen
con numeros, enseñaremos como los Cosmografos que
hazen Cartas, sepan hazer los troncos de leguas, respeto
del grado que tuuiere la carta.

Para hazer el tronco de leguas de circulo mayor, se toman toman quatro grados de los de la Carta, y se diuiden en 70. partes y guales, y segun estas partes hazen todo el tróco: y quando los grados son tan pequeños que no se pue den diuidir en 70. partes, los 4. grados se diuidirá en 35. partes, y cada parte valdra dos leguas: y si las 35. partes se diuidieren en 7. partes, cada vna valdra diez leguas; y có este modo de diuidir se podran hazer los demas trócos, como mas claramente se puede entender de la fabrica de los troncos siguientes.

En los paralelos que son cercanos a la Equinocial, es muy poca la diferencia q ay de los grados de los tales paralelos a los grados de la Equinocial, y assi se puede comé car a hazer los trocos de leguas, desde los 20 grade latitud para arriba: y para que en qualquiera graduacion se pueda hazer con mas facilidad, se haran desta manera.

Tomen vna linea q sea ygual de 6 gra de los de la Carta, y siendo el troco para 20 gra de latitud, se dividirà en 98 partes yguales, y cada parte valdra vna legua: y si la linea de los .6. grados no sufriere tantas divisiones, se dividirà en 49 partes, y valdra cada vna parte dos leguas: y desta manera haran el tronco de 20 grad. de latitud.

El tronco para 25. gra de latitud, se hara, tomádo seys grados de la Carta; y poniédolos en vna linea, se dividirà 95 partes y guales, y cada vna valdra vna legua: y si esta linea se dividiere en 47. partes, cada vna valdra 2. leguas; y co esta medida se hara el troco del tamaño o quisiere.

Para el tronco de leguas de 30. grados de latitud, fe tomaràn seys grados, y poniendolos en vna linea, se diuidirà en 91. partes yguales, y si la dividieren en. 45. par tes, valdra cada vna dos leguas: y segu estas partes se hara el tronco.

El tronco para 35 grad. de latitud, se hara, tomádo vna linea del tamaño de 6 grados de los de la Carta, la qual se partiràen 86 partes y guales, y valdra cada parte vna le-

gua; y si se dividiere en 43 partes, cada vna valdra dos leguas: y segu estas divisiones se podra estender el troco.

En el tronco del paralelo de 40. grad. se tomara vna linea q sea ygual de 6. grados de los de la Carta, la qualse dividira en 80. partes yguales, y cada parte valdra vna legua; y si se dividiere en 40. partes, cada vnavaldra dos leguas: y con estas divisiones se hara el tronco.

En el paralelo de 45.grados, se tomarà vna linea del tamaño de seys grados, y se diuidirà en 74.partes yguales, y cada vna valdra vna legua; y si se diuidiere en 37. valdra cada vna dos leguas, y segun estas diuisiones se

hara el tronco.

El tronco para el paralelo de 50. grados de latitud, fe hara tomádo vnalinea ygual de feys grados, la qual fe partira en 68. partes yguales, y cada vna valdra vna legua; y fi fe partiere en 34. partes, cada parte valdra dos leguas, y fegun estas divisiones se hara el tronco.

Para el tronco de leguas de 55.grados de latitud, se tomarà vna linea ygual de seys grados, la qual se dividirà en 58.partes yguales, y valdra cada parte vna legua: y si se dividiere en 29.partes, valdra cada vna dos leguas:

y con esta division se hara el tronco.

En el paralelo de 60.grados de altura, se tomarà la linea ygual de seys grados, y se diuidirà en 52.partes yguales, y valdra cada vna vna legua: y si se diuidiere en 26. partes, cada vna valdra dos leguas, y segun esta diuision


se hara el tronco del tamaño que quisieren.

Pues con estas diferencias de trocos de leguas, podra medir el camino que huuiere nauegado por qualquiera paralelo, supuesto que el Piloto no se errò en el puto de fantasia; y quando el Piloto se errasse alguna cosa en el punto, midiendo las leguas con estos troncos, se llegaria mas a la verdad, y no se cometerian tan grandes errores entre Pilotos, como cada dia acontece.

Los troncos de leguas que se siguen, estan hechos segun el grado del padron ordinario de la carrera de las Indias, del qual grado, la linea, a b, tiene seys grados.


El tronco de leguas con que se mide el camino, quado se nauega por la Equinocial, o Meridiano, se haze, tomando vna linea que sea ygual de seys grados de los de la Carta, y diuidiendola en 105. partes yguales, cada parte valdra vna legua: y con esta diuision se hara el tronco para la Equinocial, y Meridianos, y otros rumbos, como diremos.

Tronco de leguas para la Equinocial, y Meridianos.



En el libro de la Hidrografia enseñamos la fabrica de la Carta de nauegar, donde mostramos, que en la Carta plana con que se nauega, que esimpossible poner tres colas juntas, que son, longitud, latitud, y distancia: y porque los que nauegan mares muy largos, tienen necessidad de nauegar por derrota, y altura, se ponen las dos cosas que son longitud, y latitud, y no la distancia. Por lo qual (como auemos dicho) se han hecho diferentes troncos para medir las distancias; y porque en estas ay mucha variedad, se pondra aqui vna aduertencia, de como se deue vsar destos troncos de leguas, que aunque estan hechos para los paralelos de la Equinocial, se podran acomodar a otros rumbos sin error sensible, como la distancia no sea muy grande, y la nauegacion muy apartada del paralelo.

En la nauegacion que se haze hasta estar apartados de la Equinocial cerca de 20. grados, se puede vsar del tronco de leguas que està hecho para la Equinocial; pero de allipara arriba, subiendo en mas altura, se vsarà de los demastroncos, segun en la altura que se hallaren. Si nauegaren de Leste Oeste, se tomaràn las leguas del



tronco que conuiniere a la altura por donde nauegare, pero si nauegaren por algun rumbo, suera del Meridiano, o Equinocial, se mediran las leguas desta manera. Sea en la figura siguiente, la linea, a b, vn paralelo de 40.

grados de latitud, y sea, OT, otro paralelo de 36. grados de latitud: tirese el Meridiano, A C, que haga angulos rectos con los paralelos, AB, OT. Tirefe, CD, que haga angulos rectos có, A C, partale, C D, en 80.0 cié partes yguales, y en las mesmas partes se divida, A C, de suerte que sean de vn tamaño las vnas de las otras partes. Con folas estas dos lineas, assi dispueltas, pueden seruir para faber las leguas que se caminan por cada rumbo (como luego diremos) pero porque sirua de exemplo se descri uiran los Meridianos, BD, QK, y los ochorumbos que ay en cada quarta de Orizonte.

Pues pongamos que estando vna nao en el punto, A, nauegò por el rumbo, A H, que es por el Sueste, y quando llegò en.36. grados de altura se hallò en el punto, T. Quiero saber aora las leguas que ay del punto, A, que es donde partio la nao, al punto, T, por el rumbo, AT, lo qualse hara assi. Tomese en la Carta de nauegar, en el paralelo de 36. grados de altura, la diftancia que ay del Meridiano donde partio, hasta el punto donde se halla lanao, que seria en la Carta vna distancia semejante de OT, y esta distancia se passe al tronco de leguas que conviene al paralelo de 36. grados de latitud, y se halla-

ràque es. 56. leguas y dostercios de legua.

Teniamos que el punto, A, estaua en 40 grados de latitud, luego la parte de Meridiano, A O, son. 4. grados. que en eltronco de leguas q sirue para la Equinocial, y Meridianos, son. 70. leguas: estas. 70. leguas las contare del punto, C, al punto, A, que se terminan en, N:y las. 56. leguas y dostercios que valia el paralelo, O T, se contaran en la linea, C D, que se terminan en, P. Pues si se tomare la distancia, PN, y se pusiere en la graduacion de leguas, C A, se veran las leguas que ay del punto, A, al pu to, T, que en este exemplo serian. 90. leguas. Pero si esta distancia se midiera segun que los Pilotos lo miden, con

vn mismo tronco de leguas, fuera la distancia, AT, mas de cien leguas; porque fegun su medida, tomaran la distancia, NR, que es semejante de, AT, y esta pusieran en el tronco de leguas que lleuan en su Carta, y les diera las cien leguas. Este instrumento sirue para el grado de

qualquiera carta.

Ay mas que aduertir en esto, que los que nauegan por el mar Mediterraneo, no vsan destos troncos, porque las cartas estan hechas por derrota, y distancia, y segun las distancias hazen el tronco, y assi no ay necessidad de mas de vn tronco. En todas las partes Septentrionales, començando del Cabo de Finis terræ, en la costa de España, tambien se nauega por derrota y distancia, y con vn tronco de leguas les basta. En la vna y otra parte, está lastierras tan cerca ynas de otras, que con solo conocer la derrota se nauega sin otro instrumento: de donde se sigue, que en las Cartas de nauegar del mar Mediterraneo, y partes Septentrionales, no estan los lugares puestos en sus alturas ni longitudines, como lo demostramos en la Hidrografia.

Vsamos desta figura, para conocer las leguas que se nauegan por cadarumbo, mediante los troncos de leguas que estan hechos para los paralelos, y Meridianos, porque si se huuieran de hazer troncos para cada rumbo de los que falen de diuerfas eleuaciones de Polo, fuera gran prolixidad, y confusion para los Pilotos ; y assi me parecio vsar deste medio, que esfacil y cierto, alomenos sin errorsensible. Paralos que tuuieren principios de Geometria, se pondran aqui delante algunos preceptos, con que se sabran estas distancias con mas

precilion.

Nauegando de Leste Oeste, es impossible que se pueda saber por ningun instrumento lo que se nauega, y assi esto ha de quedar a la estimativa del Piloto, q por mucho

que yerre, no sera tanto como si errara en los instrumetos que algunos con poca dotrina, y menos esperiencia han propuesto. Y para que conste desta verdad, hare aqui vn discurso, aunque parezca salir suera de proposito, en el qual qualquiera hombre de sano juyzio enten-

derà ser assi esta proposicion.

Ha me mouido a hazer esto, vn memorial que vn Matematico dio en el Real Consejo de las Indias, diziendo, que el sabia vn secreto para faber lo que se nauega de Leste Oeste, pero que no lo diria, si primero no le daua el Rey quatro mil ducados de renta perpetuos, y seys mil ducados luego. Quando suera verdad q el supie ra el tal secreto, el excesso de la peticion ponia sos pecha.

Discurso en que se demuestra, que nauegando de Lette Oeste, no se puede saber lo que se ha nauegado, y por el consiguiente tampoco las longitudines.

AR A Que mejor se entienda lo que se tiene de demostrar, dire el fundamento que es necessario, para que el que nauega de Leste Oeste, sepa lo que ha nauegado, y por configuiente, la longitud: y para esto pongo vn exemplo, y sea: Que estando vno en la isla Tercera, y quiere saber la longitud entre Lisboa, y la Tercera, que es nauegacion de Leste Oeste, para lo qual tiene necessidad, que tomando la hora que es en la Tercera, en aquel mesmo instante sepa que hora es en Lisboa: como si fuessen las onze en la Tercera, saber que entonces era las doze en Lisboa; y siendo assi, diria, que entre la Tercera y Lisboa auia. 15. grados de longitud, que corresponden a vna hora de diferencia de tiempo que huuo entre la vna y otra parte.

Pues digo, que el que pretende saber la longitudentre dos lugares, nauegando de Leste Oeste, o por otro qualquiera rumbo, tiene necessidad de saber esta diserencia de tiempo; la qual, o la tiene de saber por el mouimiento del Sol, o Luna, o estrellas: o la tiene de saber por el mouimiento de cosas elementares. Vamos examinando cada una destas cosas, y lo primero veamos, si por los monimientos que se hazen en el cielo, es

Possi.

possible hallar precisamente esta diferencia de tiempo, y hallaremos, que solamente por los Eclypses de la Luna se podria hallar, y esto aniendo dos diligentes observadores, vno en vn lugar, otro en otro lugar : y por diligentes que sean, pueden errar en el começar, o a cabar del Eclyple quatro minutos de hora que seria vn grado de longitud; y esto en breues distancias seria de consideració, por qua nauegando de Leste Oeste, si fuesse por cerca de la Equinocial, serian mas de diez y siere leguas de error de camino, que en vn dia ni dos de nauegación no errara tanto la fantasia del Piloto: en grandes distancias no es de consideracion vn grado de longitud. Estos Eclypses de la Luna, no siruen para saber la longitud de Leste Oeste, ni de otra qualquiera nauegacion, porque no acontecen fino de año en año, y algunas vezes mas tarde: y aunque acontecie ran cada dia, no feruian para lo que se ha propuesto, por ser necessario dos observadores, vno donde parte la não, y otro donde se halla; y aun co todo esto, no seruia para saber lo que tiene nauegado, por no poder comunicarse los dos observadores, para saber la diferencia de tiempo que huuo en el començar, o acabar del Eclypse entre los dos observadores. Por lo qual podemos concluyr, que para faber lo que se nauega de Leste Oeste, que los Eclypses de la Luna son inutiles, solo pueden seruir para

en grandes distancias, como auemos dicho.

Por el monimiento del Sol tiene mas dificultad, por el qual es imposfible que se pueda saber lo que se nauega de Leste Oeste, ni tampoco las longitudines, nauegando por otro qualquiera rumbo. Pongamos que estan hechas tablas para el Meridiano de Lisboa, por las quales se sabe alli cada dia el verdadero lugar del Sol: pues si vno quisiesse saber la longitud entre la isla Tercera y Lisboa, tiene necessidad de saber con mucha precission, la altura de Polo de la isla Tercera, para saber la declinacion que tiene el Sol quando llega al Meridiano, y en aquel dia, por el lugar que tiene el Sol en el Meridiano de Lisboa, sabra su declinacion, supuesto que esta sabida su altura de Polo, y por la diferencia de declinacion que hallare, fabra lo que el Sol ha caminado en el Zodiaco: y por esto, el tiempo que tuuo necessidad para hazer aquel monimiento. Si esta observacion la hiziera vn angel, bien creo que hallara esta diferencia de tiempo en que se hizo este mouimiento, pero como la tienen de hazer hombres, es impossible saberse. Pongamos que entre la Tercera y Lisboa ay vna hora de diferencia de tiempo: y pongamos que quando llego el Sol al Meridiano de Lisboa, estaua en el primer minuto de Aries, pues quando llegare al Meridiano de la Tercera, estarà en tres minutos y medio del mismo signo, que son dos minutos y medio mas ; los quales anduno el Sol en vna hora: y a estos dos minutos y medio, le responden en esta parte, vn minuto de declinacion. Pues que observador aura, y co que instrumento, que no se puede errar en vn minuto de altura en el Sol? y quando no se erralle sino medio minuto, serian siete grados y medio de error en la longitud, que son cerca de 130 leguas. Pues si haziendo la observacion en tierra, y conocida la altura del Polo del lugar donde se observa, ay tanto error, que seria en menor distancia, y en la mar, donde no ay feguridad para el assiento del instrumento, ni se sabe con precision

la altura del Polo donde se haze la observacion: por lo qual es absurdo muy grande, pensar que por el monimiento del Sol se pueden saber las

longitudines en la mar, ni lo que se nauega de Leste Oeste.

Passemos adelante, y veamos si por el monimiento de la Luna pode. mos saber estas longitudines. Pongamos que tenemos vnas tablas que me dan el verdadero lugar de la Luna, para vn cierto Meridiano, y que voy nauegando de Leste Oeste, o por otro qualquiera rumbo, y quiero saber el lugar de la Luna, el qual para saberse mas cierto, ha de ser estando la Luna en el nonagesimo grado del Orizonte, el qual se sabe, tomando vn hilo, y colgando del vn peso, y teniendo el hilo con la mano leuatada, y que cuelgae la pesa del hilo, y quando se viere que el hilo passa puntualmente por los estremos de los cuernos de la Luna, es señal que la Luna llegó al nonagefimo grado. Pues en el mismo instante se tome la altura que tiene sobre el Orizonte, que entonces no tiene paralaxis en longitud, que la que tuuiere sera en latitud. Si tuuieramos en este lugar conocida la altura del Polo, y la latitud de la Luna, supieramos su declinacion; y luego por las tablas de Monterregio; su verdadero lugar, que comparado con el que tuno para donde estava hechas las tablas que dauan el verdadero lugar de la Luna, supieramos la diferencia de monimiento, y por ella la diferencia de tiempo entre los dos Meridianos, de donde se figuiera, que se supiera la longitud y distancia: pero ignoramos las dos cosas, que es la latitud de la Luna, y la altura del Polo precisa, que en esta operacion es de mucha importancia, porque en la mar no se puede tomar muy precifa la altura de ninguna estrella, por auerse de obseruar con la vista. La latitud de la Luna tambien la ignoramos, porque esta no se puede saber sin saber el verdadero lugar de la Luna, y es este el que vamos a buscar: luego estamos impossibilitados de saber el verdadero lugar de la Luna, por lo qual tampoco fabremos la diferencia de monimiento entre el Meridiano para donde estaua hechas las tablas, y el Meridiano de la observacion: de donde se sigue, que no sabremos la diferécia de tiempo entre los dos Meridianos, por lo qual tampoco la longitad ni distancia. De suerte, que por el monimiento de la Luna no podemos faber la longitud, ni distancia entre dos Meridianes: y aunque la observacion se hiziera en tierra, no suera tan precisa, que para lo que se pretende huuiera error muy fensible, como lo podran juzgar los que tunieren vio de auer tratado instrumentos, y hecho continuas observaciones.

Resta examinar, si por el lugar de algunas estre llas sie podria saber el lugar de la Luna. Esto tiene mas dificultad que ningun modo de los passados silarazon es, porque no ay tablas que nos den los verdaderos lugares de las estrellas (como luego veremos) y asís por ellas no podremos saber el verdadero lugar de la Luna: y quando se tuniera tablas que die san los verdaderos lugares de las estrellas, la Luna tiene paralaxis en lon gitud, sino es quando està en el nonagesimo grado, y esta paralaxis no la podemos conocer que tanta sea. De suerte, que por la distancia de la Luna na a las estrellas sixas, no se sabra su verdadero lugar, por las razones dichas: pues ignorando el verdadero lugar de la Luna, no vendremos en conocimiento de lo que pretendemos, como queda dicho. Demas desto,

Nauegacion:

ic8

Longitud, y latitud, de algunas Estrellas fixas, para el principio del año de. 1587. segun las observaciones de Ticho Brahe, junto contos lugares, segun el calculo del Rey don Alonso y de Copernico.

Nóbres de lasEstrellas.		leruacio cho P			S	egun el (Alo		lon	Segun Copernico.						
"	Lon	gitud.	La	titud.	Lor	gitud.	Lat	itud.	Lor	gitud.	Latitud.				
	G	M	G M		G	M	G	M	G	M	G	M			
Oculus Tauri.	4	1 II	5	30 M	3,	511	5	10 M	3	57	5	10 M			
Cor Leonis.	24	687	0	27 B	22	55 81	0	10 В	23	4782	0	10 B			
Spica Virgin.	18	40	ì	59 M	17	50	2	o M	17	57 🕰	2	o M			
Cor Scorpij.	4	ı X	4	27 M	. 3	5 7	4	o M	3	57 Z	4	o M			
Canis maior.	8	22 5	39	3 ª M	8	55	39	10 M	8	575	39.	10 M			
Canis minor.	20	75	15	57 M	19	353	16	10 M	20	27 %	16	10 M			
Sinist.pes Or.	11	SII	31	11 M	9	3511	31	30 M	10	271	₹ ₹	30 M			
Lucida Hydr.	21	3482	22	24 M	20	25 81	20	30 M	2.1	17.9	10.	30M			
Arcturus.	18	27 ♠	31	2 B	17	25 V	31	30 B	18	17.	31	30 B			
Sinist.hu. Or.	15	11 [16	53 M	14	45 II	17	30 M	15	37 II)	17	30M			

Siguefe el lugar del Sol y dela Luna, para los dias figuientes, y horas despues de medio dia segun las observaciones de Ticho Brahe, y el Calculo del Rey don Alonso y de Copernico.

Enero	Tis	olis	Planetas	Obli	ruacion Bra		Ticho	Segun Copernico.								
10	110	Tiépo.		Lor	gitud.	L	titud.	Lo	ngitud.	Lai	ritud.	Lor	gitud.	Latitud.		
D	Н	M		G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
19	0	0	0	29	08	0	0	29	193	0	0	28	31 6	0	0	
19	6	58	3	I	30 II	4	28 A	2	001	3	49	I	+5 II	3.	50	
25	0	0	o	5	6 800	0	0	5	26 00	0	o	4	362	0	n	
25	15	5	0	25	388	4	19 A	24	3451	3	39 A	24	4251	3	38 A	

el verdadero lugar de la Luna se tiene de saber, estando en el Meridiano para saber la diferencia de monimiento entre aquel y el Meridiano con quien se compara, y entonces tiene la Luna paralaxis: y por no saber su verdadero lugar, tampoco sabemos su latitud; y assi por lo vno, como por lo otro, no sabremos su verdadero lugar.

Demas desto, no ay tablas que nos den los verdaderos lugares del Sol, ni Luna, ni de las demas estrellas, como se puede considerar en la tabla precedente, donde se ponen los verdaderos lugares del Sol, y Luna, y algunas estrellas, segun diferentes tablas, como son las del Rey don Alonso, las de Copernico, las observaciones de Ticho Brahe, calculadas para

el año de 1587.

Por las tablas antecedentes se vera la discrepancia que ay en los lugares del Sol, y Luna, y estrellas fixas, entre los autores por cuyas dotrinas estan hechas las tablas de los mouimientos de las estrellas fixas, y planetas. Pues porque auemos de creer, que dize mas verdad el vno que el otro, pues entrambos discrepan de la observacion de Ticho Brahe, que casi conviene con la q auemos hecho? Corpenico, y Vernero, el año de 1514. observaron la estrella que llaman Espica virginis. Vernero la hallò en 16. grados, 53. minutos de libra: y Copernico en 17. grados, 14. minut. del mismo signo, que entre la vna observació y la otra ay 21. minutos de diferencia. Estos dos artifices son tenidos entrambos por muy doctos y diligentes, y assi no sabremos determinar qual dixo verdad: luego por ningunas tablas podremos determinar el verdadero lugar de la Luna, ni de las estrellas fixas; por lo qual, ni tampoco nos podemos fiar de la observacion que por ellas se hiziere, porque para el intento de lo que se va tratando, muy poco tiempo que se hierre causa gran error, assi en la longitud, como en la distancia. Pues de lo dicho queda bastantemente prouado, que por los monimientos celestes no se puede saber lo que se nauega de Leste Oette, ni las longitudines, como qualquiera diligente Matematico lo puede entender.

Pues auemos prouado bastantemente, como por los monimientos celestes no se puede saber lo que se nauega de Leste Oste, ni las longitudines, resta que prouemos, que tampoco se puede saber por monimientos de cosas elementares. Despues que se descubrieron las Indias, principalmente desde el año de 1524, que es quando començó la competencia entre Castilla, y Portugal, sobre las islas de la Especeria, anda este quebra dero de cabeça, de querer saber lo que se nauega de Leste Oeste, y las longitudines, y como cosa que no es possible, ninguno ha acertado, ni acertará con el arte que para semejate cosa es menester. Aun muchos lo han intentado por diuersos modos, ignorando la razon porque no es possible, dire algunos de los que han venido a mi noticia, que destruy dos estos, quedarán sin suerça ni virtud para este este o, todos los initrumentos que de materia elementada se fabricaren para semejante ob-

feruacion.

Han querido algunos, que por la variacion de la aguja de marear, se supiessen las longitudines, diziendo, que auia vn punto en el cielo a quie tenia respeto, y este llamauan el Polo de la aguja, y que como suesse mi-

rando

rando a este Polo, que se podrian hazer tablas que enseñassen la variacion de la aguja, para qualquier grado de qualquiera paralelo. Sabido lo que el tal Polo estaua apartado del Polo del mundo, y tambien conocido el Meridiano que passaua por el Polo del mundo, y el Polo dela aguja, y lleuando estas tablas en los regimientos, y hallando el Piloto en donde quiera que estuuiesse, lo que variaua la aguja, por las tablas sabria lo que estaua apartado del Meridiano donde la aguja miraua derechamente al Polo. Cierto que si la aguja de marear mirara solamente a vo punto en el cielo, que fuera cosa facil hazer las tablas, y por ellas saber las longitudines, tomando muy precisamente la variacion de la aguja. Pero los que pensaron que auia en el cielo vn solo punto a quien la aguja tenia respeto, se han engañado, como lo muestra la experiencia, y assino ay que hazer caso de semejante imaginacion, porque la aguja mira a muchos puntos en el cielo, y no tiene mouimiento regular; como largamente queda demos-

trado en el capitulo. 31.

tos de legua.

Ha auido otros que han querido averiguar lo que se navega de Leste Oeste, y tambien las longitudines, por una ampolleta de arena, en esta manera: Toman una ampollera, o relox de arena, que corriesse una hora justa, y quando partiessen de algun puerto; tomassen por el Sol la hora justa, y entonces començasse a correr la ampollera, o relox de arena, y en acabando de correr la boluiessen de la otra parte, y assi sin cessar, la fuessen boluiendo, contando las vezes que la boluian, que a cabo de vn dia natural auria buelto veynte y quatro vezes. Pues queriendo saber entonces lo que auian nauegado, tomauan la hora que era en aquel paraje, y mirauan la diferencia de aquella hora, de la que muestran las horas que han corrido por la ampolleta, y reduziendo la diferencia de tiempo en grados, se sabra la longitud y distancia, reduziendo los grados a leguas del paralelo por donde nauegare. Como si partiendo de Lisboa para las Terceras, que es nauegacion de Leste Oeste, vn dia a las tres de la tarde, y començo a correr la ampolleta, y a cabo de veynte y quatro vezes que auia corrido, se tomo por el Sol la hora que era, y se hallò que eran las dos y cincuenta y dos minutos, y por la ampolleta eran las tres en Lisboa; porque començando a correr a las tres, y auiendo cortido veynte y quatro vezes, y cada vez es vna hora, claro està que serian las tres en Lisboa del dia figuiente, y por el Sol en aquel paraje donde llegò la nao quando acabó de correr las veynte y quatro vezes, no eran mas de las dos y cincuenta y dos minutos: luego la diferencia de tiempo son ocho minutos, que valen dos grados; y tanto se halla la nao

Si la ampolleta tuniera tan ajustada la arena, que no suera mas que la hora justa, y que la arena corriera ygualmente, y las horas que se

apartada del Meridiano de Lisboa, que reduzidos a leguas de aquel paralelo, fon veynte y fiete leguas, y veynte y quatro minu-

tomaron al tiempo que començo a correr la ampolleta, y la que se tomò nauegando suerantan justas, que ni sobrara, ni faltara nada, en tal caso suera cierta esta operacion: pero en todas estas cosas ha de auer falta de mas, o de menos, porque ajustar que vna ampolleta corra vna hora justa, sin que sea mas ni menos, solamente lo podria hazer vn Angel, que hombre no es possible. Y esto entendera bien, el que sue esta materiale de la comercia de la latura del Polo, y tomar muy justa la altura del Sol, en la qual tambien ha de auer error de mas, o de menos, por muy grande que sea el instrumento. Si despues con esta altura, queremos saber la hora por algun planisferio, tambien ha de auer algun minimo error: y si con esta altura del Sol queremos saber la hora por via de numeros, tambien se tiene de errar algo, por las muchas multiplicaciones y particiones que interuienen.

Pongo que contodos estos rodeos no se yerremas de medio minuto de hora, que antes sera mas que menos, en la hora con que se ajusta la arena de la ampolleta: pues boluiendola veynte y quatro vezes, aura doze minutos de tiempo de error, que serian tres grados, los quales el Piloto solo con su estimativa, en veynte y quatro horas no los puede errar, ni medio grado tampoco, si del todo no suesse norante el Piloto. Pues si en vn dia natural yerra dos grados, en seys, o

fiete dias que tanto le podria errar?

Tambien la ampolleta no puede correr ygualmente, a causa que el tiempo altera la arena, haziendose humeda, o mas seca vna vez que otra, o apretandose mas o menos, que todo es causa de no correr ygualmente, y assi no podra dar el tiempo justo: por lo qual, ni

tampoco la longitud, ni distancia.

Podria dezir alguno de los que tratan destas inuenciones, que ellos saben de vna materia que no la altera el tiempo. Digo, que quando esto suesse así (que no lo puede ser aunque se hiziesse poluo de diamantes) que se cometeria el error que diximos, por causa de no poder hazer ampolleta que haga hora justa: y si la ampolleta se hiziere que dure muchas horas, es peor, y corre mas desygualmente, porque la arena se comprime mucho, y vnas vezes mas que otras, por los golpes del nauio, y de las bueltas que se le dan, y otras muchas causas que impiden que no corra con ygualdad: lo qual tengo experimentado muchas vezes, que con vna ampolleta que duraua seys horas, algunas vezes diferenciaua media hora de vna vez para otra.

Otros han dicho, que en lugar de las ampolletas se lleuasse vn relox de ruedas, y que con este se mediria el tiempo. Bien les consta a los que tienen semejantes reloxes, que nunca les mide bien el tiempo, sino que siempre andan delanteros, o trasseros, y vn dia mas que otros porque como el muelle de azero, que es el que haze mouer las ruedas, el tiempo le templa mas vn dia que otro, y haze mas y menos suer-

ça, que

ça, que es causa que se mueua mas de espacio, o mas apriessa, por lo

qual no son de ningun momento para lo que se pretende.

Finalmente, en ninguna cosa elementada se hallarà que tenga mouimiento regular. Y si dixeren, que por decurso de agua se puede hazer lo que no se podia hazer con la ampolleta de arena, tambien tiene el mesmo inconueniente, y mucho mayor, porque el agua se va exalando, y cada vez queda mas gruessa, que es causa de no correr ygualmente: y el balance de la não es otro incoueniente, para que cotra vna vez mas que otra. Pues de todo lo dicho queda bien claro, que no se puede saber lo que se nauegade Leste Oeste, ni las longitudines, que es lo que se pretendia prouar.

CAP. XLIX. En que se enseña saber la distancia entre dos pueblos, que solo disteren en latitud, o en longitud.

VNQVE Por los troncos de leguas que auemos puesto, se puede saber la distancia de camino que ay entre dos pueblos, que solo difieren en longitud; pero para el que socre Matematico enseñaremos Geometricamente, lo que diximos se podia hazer por los troncos de leguas. Quando los lugares difieren solamente en latitud, es cosa facil saber la distancia del vno al otro,

que es dando 17. leguas y media por cada grado de diferencia: pero quando difieren en longitud, es necessario hazer reducion de grados de paralelo a grados de Equinocial, y sabran los grados de Equinocial que ay entre el vno y el otro: y dando a cada grado 17. leguas y media, se fabra la distancia q ay entre los dos lugares. La redució de grados de paralelo se hara por la tabla de atras. Tambien se puede hazer por la mesma tabla, dando a cada grado de diferecia de longitud, las leguas que le responden, y tendran la distancia que ay entre los dos lugares.


CAP. L. Que enseña demostrativamente la distancia que ay entre dos lugares, que disteren en longitud y latitud.



ONGAMOS Dos lugares en diuerfos Meridianos, y diuerfas latitudines. Sea en la figura figuiente, el vn Meridiano a b, y en el pongamos vn pueblo en el punto, d. Sea el otro Meridiano, a c, y en el pongamos otro pueblo en el púto, c, q tenga menos latitud q el pueblo, d. Tirefe, d e, b c, paralelas a

la Equinocial. Tirefe mas, df, e g, perpédiculares sobre, b c. Demas desto se tire, dc: y el arco, dc, el qual es vn circulo maximo, que passa por el

vno y el otro pueblo: pues conociendo los grados deste circulo, d c, se sabra la distancia q ay entre los dos lugares, dc. Pues dandose conocidas las longitudines, y latitudines, conocerse han por la tabla precedente los arcos de paralelo de cada pueblo que ay entre los dos Meridianos, que tantos grados valen de Equinocial: de donde se figue, que se conoceran sus cuerdas, de, bc. Las lineas df,eg, son y guales, porque son paralelas, y estan entre lineas paralelas. Tambien, db,ec, son yguales, porque son



cuerdas de yguales arcos. El angulo, b d f, es y gual del angulo, g e c, porque los angulos, b de, ce d, son yguales, de los quales quitamos cantida. des yguales, que fon los angulos rectos, g e d, f d e. Luego fiendo los dos lados, b d, f d, y guales de los dos lados, c e, g e, y el angulo, b d f, y gual del angulo, ce g. por la quarta del primero de Eucli. sera el lado, b f, yguat del lado, g c. Tentamos conocida la linea, d e, luego estarà conocida, f g, que es su ygual, tambien estaua conocida, b c, pues restando, fg, de, b c, quedarà lo que valen,b f,g c,que partido por medio, quedaràn conocidas, b f, g c. En el triangulo, b d f, estan conocidos los lados, b d, b f, luego por la. 47. del primero de Eucli. conocerfe ha el lado, df. En el triangulo rectangulo, dic, estan conocidos los lados, dif, cif, luego por la.47. del pri mero de Euclid.conocerse ha el lado, dc, el qual es cuerda del arco, dc. Pues conocidala cuerda de vnarco, conocerfe ha quantos grados tiene el tal arco. Luego multiplicados los grados del arco, d c, por. 17. leguas y media, se sabra las leguas que ay entre el lugar, d, y el lugar, c, que es lo que se propuso.


CAP. L1. Que enseña lo mismo que el passado, puesto que las latitudines sean a dinersas partes.



N Dos maneras se puede proceder, siendo las latitudines a diuersas partes. El vn modo es, poniendo que la latitud del vn pueblo sea mayor que la del otro: el otro es, que entrambas latitudines sean yguales. Pongamos lo primero, que la vna latitud sea mayor q la otra, sean los Meridianos, ab, ac,

y la Equinocial, h K. Sea el punto, c, el vn pueblo, apartado de la Equinocial por el arco,K c: y sea el otro pueblo el punto,d, apartado de la Equinocial a la otra parte, por el arco, h d, el qual fea may or que el arco, K c. Tirefe, de, bc, paralelas a la Equinocial. Por q, cb, es mas llegada a la Equi nocial que, de, sera mayor que, de: pues de los puntos, de, se tiren perpendiculares sobre, b c. Tirense tambien, d b,e c,d c,y descrivase el arco de circulo mayor, d c: y hecho esto, quedarà esta figura como la del capitulo precedente, por lo qual se seguira el mismo discurso. Pues estan conoci-

conocidas las melmas cosas, estado conocido el arco, d h, y el arco, K c, estarà conocido todo el arco, dh b; luego tãbien su cuerda, db: y siendo conocida. la longitud, seran conocidos los arcos de paralelo, de, bc, en la razon de circulo mayor, luego tambien sus cuerdas, de, bc. Las lineas, bf, cg, fon yguales, como se demostrò en el capitulo precedente: y la linea, fg, es y gual de de, que està conocida. Pues estando co nocidas, db, fb, porla 47. del primero de Euclid. conocerse ha, df. En el triãgulo rectangulo, dfc, estan conocidos los lados, df, cf, luego conocerfe ha el tercero, d c, que es cuerda del arco dc: por lo qual tambien quedarà conocido el arco, d c. Pues multiplicando los grados que tuniere el arco, de, por. 17.leguas y media, vendra la can-




tidad de leguas que tiene el arco, d c, que es la distancia que ay entre los

dos pueblos, dc.

Pongamos que los dos pueblos tienen ygual latitud, pero a diuerías partes: sean los Meridianos, a b, a c: la Equinocial, h K: el vn pueblo el pueto, d, apartado de la Equinocial, por el arco, h d: y el otro pueblo el punto, c, apartado de la Equinocial, por el arco, K c, ygual del arco, h d. Tirése

las paralelas, de, cb: tirense tambien d b, e c, las quales de necessidad han de fer yguales, assi por ser cuerdas de arcos yguales, como por estar entre lineas paralelas yguales. Demas desto, las lineas, d b, e c, hazen angulos rectos con las lineas, de, bc, porque siendo el arco, Ke, ygual del arco, Kc, la linea e c, cortarà la linea, h K, en angulos rectos: y siendo, de, b c, paralelas de, h K, tambien las cortarà la linea, e c, en angulos rectos. Pues siendo conocida la longitud que ay entre los Meridianos, adb, aec: y las latitudines, hd, K c, seran conocidos los arços de paralelo de, b c, y por la tabla precedente se reduziran a partes de circulo mayor, cuya cuerda es, de, bc, que por la tabla de senos seran conocidos. En el triangulo rectangulo, dbc, estan co-




nocidos los lados, d b, como cuerda del arco, d h b, y el lado, b c, por lo

que acabamos de dezir: luego por la 47. del primero de Euclid. se conocerà la linea, d c, que es cuerda del arco, d c: y por el configuiente, el arco, d c, en grados de circulo mayor, que multiplicados por 17. leguas y media, se sabra la distancia entre los pueblos, d c.

CAP. LII. En que se enseña a medir con compas y regla, la distancia que ay entre dos lugares, dadas sus longitudines y latitudines.

OR Satisfazer a todas inclinaciones, aunque parezca prolixidad, quife poner como con vna regla y compas se puede medir la distancia que huuiere entre dos pueblos, dada la longitud y latitud de cada vno dellos: o los pueblos difieren solo en longitud, o solo en latitud; o difieren en longitud y latitud juntamente. Para lo vno, y lo otro se harà la figura siguiente, y sepamos lo primero, quando difieren en longitud y latitud. Sea en la figura figuiente, el Meridiano fixo que passa por las Canarias, de donde comunmente se cuentan las longitudines, abcd: partase por medio con la linea,bd,la qual representa la secion de la Equinocial, con el plano del Meridiano, abc d. Pongamos el arco, b f, de 10. grados, que el vn pueblo tiene de latitud. Tirese,f g,paralela de,b d: partale por medio en, l, sobre el qual punto a cantidad de, lf, se haga vn medio circulo, fn g. Pongamos que la longitud del pueblo, cuya latitud es, b f, fon.60.grados, los quales contaremos en el medio circulo, fn g, coméçando de,f,y acabaràn en,r,tirefe,r s,perpendicular fobre,fg. Tomemos,bh,de 20. grados, que pongo que sea la latitud de otro pueblo, tirefe,h K, paralela de,b,d, partase,h K,por medio en el punto, m; el qual hecho centro a cantidad de, m h, se descriua el medio circulo, h o K: y tomese en este circulo el arco, h p, de 30. grados, que pogo que es la longitud del pueblo, cuya latitud era el para-



lelo, h K, y del punto, p, se tire, p q, perpendicular sobre h K: tirese, q s, y tomese, q t, y gual de, q s; y del punto, t, se leuante, t u, perpendicular sobre, h K, y que sea y gual de, s r, tirese, p u. Hecho esto con vn copas, se tome, p u, y se aplique al circulo, a b c d, como seria, b, x, y los grados que huuiere entre, b x, multiplicados por 17. leguas y media, daràn la distancia que ay entre los dos pueblos propuestos.

La demostracion desta pratica està facil de entender, si se imaginaren los medios circulos, si ng, ho K, leuantados sobre el plano del Meridiano, ab c d, de suerte que hagan angulos rectos con el, entonces estaràn los puntos, r, p, en la latitud, y longitud, que pusimos los dos pueblos, como si estuuieran en la Essera de la tierra: y las li-

T 4 neas,

meas, rs, p q, caeran perpendiculares sobre el plano del Meridiano, a b c d, en las lineas, f g, h K, que son las comunes seciones de los paralelos de latitud, f n g, h o K: y porque estas lineas, r s, p q, en el plano del Meridiano a b c d, auian de hazer angulos rectos, estando los circulos, f n g, h o K, en su propia postura; por lo qual tomamos, q t, y gual de, q s, y del punto, t, se leuanto la perpendicular, tu, y gual de, s r, y quedaron los pueblos, p u, en la propia postura q si estuuieran en la esfera de la tierra. Pues tomando la distancia que ay del punto, p, al punto u, y poniendola en el Meridiano, a b c d, se saben los grados de circulo mayor, que ay entre los dos puntos.

Resta de dezir, quando la longitud de alguno de los pueblos suere mas que 180. grados, contados del Meridiano de las Canarias, como se ha de proceder en saber la distancia Pongo que el pueblo que estaua en el paralelo, fin g, tenia 135. grados de longitud, que viene a ser todo el medio circulo, fin g; y mas el arco, g A: pues del punto, A, se tirarà vna perpendicular, A B, sobre, f g, tirese, g B, ytomese, q E, ygual de, q B: y del punto, E, se tire, E D, que haga angulos rectos con, h K, y que sea ygual de, B A: tirese, p D, se sta sera cuerda de vn arco decirculo mayor se passa por los dos pueblos. Pues si esta linea, p D, se aplicare al Meridiano, a b c d, que seria, b F, los grados que huuiere entre, b F, multiplicados por 17. leguas y media, daràn la distancia que ay entre los dos tales lugares.

Tambien puede acontecer, que la latitud de los pueblos fea a diuerfas partes: pongamos que vn pueblo tenia fu latitud en el paralelo, MN, a la parte contraria del pueblo que està en, r; para saber la distancia que ay entre los dos pueblos, descriuase el medio circulo, MGN, y tomese el arco, MG, ygual a la longitud del pueblo cuya latitud es, bM: del punto, G, se tire, GH, perpendicular

fobre

Nauegacion:

fobre, M N, tirese, S H, tomese, HK, ygual de HS, leuatese, K. L, perpendicular sobre, M. N, tirese, G. L, que esta sera cuerda de vn arco de circulo mayor que ay entre el pueblo, r,y el pueblo, G: y aplicando la linea, GL, al circulo, a b c d, que seria, b P: los grados que huuiere entre, b P, multiplicados por 17. leguas y media, daràn la dif tancia que ay entre los dos tales pueblos.

Si la longitud del pueblo, G, fuera mas de 180. grados, que pongamos era el arco, N G, entonces la perpendicular, K L, se auia de tirar a la parte contraria, y proceder en lo demas como està dicho. La demostracion destas dos segundas praticas, es como la de la primera, si se consideraren los circulos paralelos en su propia posició,

como acabamos de dezir.

CAP. L111. Donde se pone vna observacion, acerca de la refracion de los rayos del Sol.

VNQVE Parezca fuera de proposito, en regimiento de nauegacion tratar de la refracion de los rayos del Sol, para confirmacion de lo que se dixo en el capitulo tercero dette libro, pondrè vna obseruación, que es como se sigue. En. 20. de Diziembre, de. 1602. por la mañana, tomè la altura del

Sol sobre el Orizonte, con vn quadrante de laton, fabricado como se dixo en el capitulo tercero: y en la graduacion, hechas las diligencias que auemos dicho en los quadrantes del capitulo. 28. Tenía este quadrante dos palmos de semidiametro, por el qual tomamos. 9. grados. 52. minutos de altura, que añadida la paralaxis, que fon. 2. minutos, 54. legundos,

ferá la altura verdadera. 9. grad. 54. minut. 54. feg.

En el melmo instante tomamos el Vertical del Sol, desta manera: En vn plano equidistante al Orizonte, se descriuio vna linea Meridiana, con mucha justificacion, y comprouada por muchos dias, y descrita por diferetes modos, como lo enfeñamos en nuestra Gnomonica: y sobre este plano estava colgado vn vn perpediculo co vn hilo de laton muy delgado; y al tiépo q le tomaua la altura, en el mismo instante se pusieró dos pu tos en la fombra q hazia el hilo, distantes el vno del otro, y tirando vna li nea del vn puto al otro: la qual bie estédida en el plano, cortò a la linea Me ridiana: y tomádo el punto de la feció por centro, fe hizo yn circulo, cuyo femidiametro era ygual del que estaua en el quadrante: y tomando la parte de circunferencia, comprehendida entre la Meridiana y la linea de

la sombra del hilo; y puesta en la circunferencia del quadrante, se supo la distancia de la Meridiana al Vertical del Sol, que sueron. 45 grados, 40 minutos. Pues con esta distancia, y la altura del Sol, y su declinacion, que aquel dia sue. 23 grados, 27 minutos, 30 segúndos, (porque segun nuestras observaciones, el Sol estana en 28 grados, 33 minutos, 17 segúndos de Sacionio en el Meridia de Sacionio en

dos de Sagitario, en el Meridiano de Valladolid).


Examinemos si aquel dia tuuo alguna refracion el rayo del Sol, sea el Orizonte, a b c d, el Meridiano, a f c, la Equinocial, b p d, el Polo del mundo, e; el Zenit, f, apariado del Polo, e, 48. grados, 22. minutos, que tanto es el complemento de la altura de Polo de Valladolid. Tirese del Zenit el arco de circulo maximo, f m, que haga el angulo, c f m, de 45. grados, 40. minutos, y sera, f m, el circulo Vertical del Sol, y pongamos que estava en el punto, l, por el qual se tire el circulo, h I K, paralelo a la Equinocial, y sera el paralelo que aquel dia descrive el Sol. Tambien se tire del Polo del mundo, el circulo, el n, y sera el circulo Horario en que estava el Sol, y sera, e l, de 113. grados, 27. minutos, 30. segundos, porque, e q, que es del Polo a la Equinocial son, 90. grados: y juntandole la declinacion del Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, viene a ser de 113. grado. 27. minuto. 30. segundos el Sol, porque es Austrina, porque es Austrina, porque es Austrina, porque es Austrina, porque es Au

Pues sepamos, dado el Vertical del Sol, y su declinació, y la latitud de la region quanta altura tendra el Sol sobre el Orizonte, y si hallaremos la misma que por la observacion, no aura refració en los rayos del Sol: y si discrepare, la diferencia serà lo q causò la refracion del rayo del Sol:

estiendase el arco, m l f, has ta que del Polo, e, venga el arco, e o, perpendicular fobre, of. En el triangulo réctangulo, e o f, està conocido el angulo, e fo, contrapuelto al'angulo, mfc, que era de 45. grados, 40. minutos; el lado, fe, es 48.grados, 22. minut. Pues por la 16. del libro. 4. de los triangulos de Monterregio, el feno todo que ponemos. 100000. al seno del arco, ef, quees, 74741. es como el feno del angulo, efo, que es, 71528. al seno del arco,

Polo de Vielle de Olid

41.38.



o e, que figuiendo la regla de proporció, viene a fer el feno del arco, e o, 53460. partes de las que el feno todo tiene, 100000. y por las tablas el arco, e o, 2. grados, 19. minutos. Mas en el mismo triangulo, por la. 19. del libro. 4. de Monterregio, como se ha el feno de complemento del arco, e fal seno de complemento del arco, e o, assi se ha el seno de complemento del arco, o f, al seno todo: y conversamente, como se ha el seno de complemento del arco, e o, que es, 84510. con el seno de complemento del arco, e f, que es, 66436. assi el seno todo con el seno de complemento del arco, e f, que es, 66436. assi el seno todo con el seno de complemento del

arco.

arco, of. Pues figuiendo la regla de proporcion, viene a ser el seno de complemento del arco, o f, 78613. q por las tablas le responden, 51. grados,49 minutos, 33 legundos, que restados de 90 quedan 38 grados, 10. minutos, 27. segundos, y tanto es el arco, o f. En el triangulo, e o l, estan conocidos los dos lados, o e, le, con el angulo recto, o: luego por la 19.del libro quarto de Monterregio, como se ha el seno de complemento del arco, e l, con el seno de complemento del arco, e o, assi se ha el seno de complemento del arco, lo, con el seno todo: y conuersamente, como se ha el seno de complemento del arco, e o, que es 84510. con el seno de complemento del arco, el, que es 39807. assi el seno todo, que es 100000. con el seno de complemento del arco, ol: que siguiendo la regla de proporcion, viene a ser el seno de complemento del arco, o l, 47103. y por las tablas les responden, 28. grados, 16. minutos: los quales añadidos con 90. són 118. grados, 16. minutos, y tanto es el arco, ol: del qual fi quitaremos el arco, o f, que era 38. grados, 10. minutos, 27. segundos, quedarà el arco, fl, de 80 grados, 5 minutos, 33. segundos; los quales restados de 90. que es todo el arco, fm, quedará el arco, lm, de 9. grados. 54. minutos, 23. segundos, que es la altura verdadera que el Sol auia de tener estando en el Vertical, flm; la qual altura es ygual con la que se tomo por el instrumento, que solo difiere en 31. segundos. Pues de aqui se puede inferir, que no ay refracion de los rayos del Sol, que Yorece que Va confe perturbe de tomar la verdadera altura, aunque estè cerca del Orizon- la ufraccion te. Assientiendo, que segun esta observacion, y las razones que diximos en el capitulo tercero que Ticho Brahe, y los que figuen su opinion se engañan en pensar que la refracion de los rayos del Sol causen variedad en su altura.

Es de aduertir, que quando vn arco es mayor que 90 grados, que su seno de complemento es el arco que passa de los 90. y por esta razon los grados que respondieron al seno de complemento del arco, o l, se añadieron con 90. para tener todo el arco, o l. Esto se ha dicho para los

que no son muy Geometras.

Algunos hantomado ocafion de dezir, que los rayos del Sol hazen refracion, porque quando està cerca del Orizonte, parece mayor que quando esta bien leuantado. Y esto si bien lo consideran, no es la causa la refracion de los rayos del Sol, sino de los rayos de nuestra vista, que passando por los vapores que estan cercanos a la tierra los dilatan, por ser flacos, como lo hazen los antojos que hazen crecer la letra, de la qual no falentayos: y otros antojos ay que la hazen chica; de lo qual se puede bien inferir, que segun el medio por donde passan los rayos visuales, hazen diferentes esetos: y esto no lo causan las especies del objeto, porque ellas siempre estan de voa misma manera; lo qual es muy la ufraccion claro, porque con vnos mismos antojos, vnos vcen la cosa mayor, y otros menor. Tambien si se tomare la altura del Sol detras de vna vidriera, serà la mesma que la que se tomare en otra parte. Muchos exemplos se pudieran tracren este particular, pero esto se quede para otro lugar, y cada vno crea lo que mejor le pareciere, y hallare por experiencia.

'si offe auto supiera el Fron sio que dize Ne

Cristofo-

Cristoforo Rothomano dize, que estando vna estrella de la Ossa ma-yor, en la altura de tres grados sobre el Orizonte, le hallò que hazia de refracion nueue minutos y vntercio. Ticho Brahe dize, que estando esta misma estrella en la misma altura, le hallô 28 minutos de refracion, acerca desta materia de la refracion.

Fin del Regimiento de nauegacion.



SEGVNDA PARTE, ENQVE SEPONE VNA HYDROgrafia que mando hazer su Magestad a Andres Garcia de Cespedes, su Cosmografo mayor.

DIRIGIDA AL REAL CONSEJO DE las Indias, siendo en el Presidente el Conde de Lemos.



EN MADRID,

En casa de Juan de la Cuesta.

M. DCVI.



MVY PODEROSO SEÑOR.



VIEN DO Los años paffados Pedro Ambrofio Onderiz Cofmografo mayor de su Magestad, en las Indias Occidentales, dado vn memorial a V. Alteza, diziendo, que el padron de la nauegacion de la carrera de las Indias, que està en la casa de la Contra-

tacion de Seuilla, tenia muchos defetos y faltas, y lo mismo todo el Mapa vniuersal, por auerse preuaricado los Portugueses con sus pretensiones; y que por ser aora todo del Rey nuestro Señor, auria lugar de hazer la verdadera descripcion del dicho Mapa vniuersal. Despues de auer vuestra Alteza consultado el dicho memorial con su Magestad, se resoluio, que era bien se hiziesse la dicha enmienda y reformacion: para lo qual se le dio al dicho Onderiz, instrucion y recaudos, para que suesse a la ciudad de Seuilla, como parte mas acomodada para poder hazer la dicha enmieda, por el concurso de Pilotos que alli vienen, de quien se va han

han de tomar las relaciones de las alturas, y derrotas de lo que se nauega: que aunque ay derroteros y papeles de Pilotos passados por donde se pudiera hazer, pero como cada dia se van descubriendo nueuas cosas, es necessario tomar informacion de lo que vltimamen-

te se va descubriendo.

Aujendo dilatado Pedro Ambrosio la yda de Seuilla, acabò en Madrid con los trabajos desta vida, por cuya muerte, V. Alteza me propufo a su Magestad, para que se me diesse el oficio de Cosmografo mayor de las Indias, y que fuesse a Seuilla a hazer la dicha reformació, y enmienda; y asi su Magestad me hizo merced del dicho oficio, y me mandò hiziesse la dicha enmienda q estaua determinada. Para lo qual se me dieron los mismos recaudos, y instrució que estaua dada, mandando se me entregassentodos los papeles y libros que V. Alteza tenia dados a Pedro Ambrosio Onderiz; y en todos ellosno se hallò cosa q el dicho Pedro Ambrosio huuiesse hecho, acerca destaenmienda, ni en otra cosatocante a ningun genero de Matematicas. Pues auiendome V. Alteza encargado esta enmienda, he procurado con el cuydado y diligencia que es razon, de seruir a su Magestad, de trabajar, y poner en la mayor perfecion que ha sido possible, todo lo tocante a la dicha enmienda, conforme a la instrucion que se me dio, de lo qual dare aqui cuenta a V. Altezá: 15 Dindenhana voll labobet an a 11

Primeramente hize el Regimiento de los Pilotos, con nueuas tablas de declinació, hechas segun las observaciones que ha mas de 30. años que voy haziendo, con instrumentos muy grades de metal, y muy precisos, por auerlos hecho por mi mano, como en el dicho Regimies to doy cuenta y razon de la fabrica dellos, donde pongo las observaciones, y el modo como se hizieron, y todas las premissas que precedieron antes que se hiziessen

las dichas tablas. Todo ello està demostrado Matematicamente,para que conste con el fundamento que se hizieron, y que los mal intencionados (que nuncafaltan) no puedan poner objecion, que no se ha procedido con el discurso que en este caso se requiere. Ha se hecho vna tabla, para por ella graduar la ballestilla. Tambien se enseña, como se podra graduar por cantidades continuas, pero mejor es gradualla por tablas, y menos laboriofo.

Tambien tengo observado, que tan apartada està la estrella Polar del Polo del mundo, y hechatabla, para que estando la guarda delantera en qualquiera de los ochorumbos principales, se sepa que tanto està mas alta, o mas baxala estrella Polar que el Polo del mundo, para que los Pilotos puedan saber por su altura la del Polo. Esta misma tabla se ha hecho para las estrellas del Polo Antartico porque las vnas y las otras estan erradas en los regimientos que aoratraen los Pilotos, como lo tengo demostrado en el mismo regimiento.

Està respondido y satisfecho, a vna objecion que Pedro Nuñez pone, acerca de las tablas que para este efeto fe hazen: which were for an on our as me absenvers

Hizose tambien vn instrumento, para que por el puedan saber los Pilotos, quando la Guarda delantera llega a qualquiera de los ocho rumbos principales; y con este instrumento se podra saber de noche la variacion de la aguja, cosa de mucha importancia a los Pilotos, si quisiessen aprouecharse della, a considitte of

Hizose otro instrumento, para que de dia al poner, o salir del Sol, se pueda saber esto mismo. El dibuxo, y como se han de hazer, y vsar destos instrumentos, està en

elmismolibro del Regimiento.

Hizose modelo del tamaño que ha de ser la ballestilla: y lo mismo del Astrolabio en electrola como

Hizose vn modelo de aguja de nauegacion, con los azeros azeros mouibles debaxo la flor de Lis, para que el Piloto pueda dar el resguardo, que hallare en la variacion de . . . r gifterend her ref a post

la aguja.

Hizose finalmente el padron general de la Carta de marear, con los seys padrones particulares, como manda la instrucion; en los quales seys padrones particulares, se compartio todo el vniuersal, segun que parecio eran mas acomodados para la nauegación: y fi alguno quisiesse otra carta diferente de como estan los seyspadrones particulares, se podra sacar del general con muthe characterist granda carrier to mine cha facilidad.

Pues para que conste como se ha procedido en la descripcion del Mapa general, y de los particulares, escriui este libro, en el qual se pone la razon y fundamento con que se ha hecho: y aunque ha auido muchos que han esdito de nauegacion, ninguno que aya visto ha declarado la fabrica de la carta de marear. Verdad sea, que es pratica comun entre algunos, que las partes del Mapa que estan apartadas de la Equinocial, que en la superficie plana de la Carta de marear, vienen a ser mas distantes vnas de otras, que no en la superficie redonda del globo: pero como se ha de entender esto, y de que manera se ha de acomodar en la superficie plana de la carta de nauegar, nadie lo hatratado.

Todolo qual se tratarà aqui por el modo mas claro que pudiere, assi porque se entienda lo que hasta aora no està bien entendido, como por demostrar que la descripcion que se ha hecho de la Carta general de nauegar, y de las particulares, se ha procedido en ellas con buenfundamento, no apartandome de la comun opi-

nion de los nauegantes.

Hetomado por fundamento algunas dellas, para defcriuir las partes donde no auia observacion de Eclypse, acomodando las tales derrotas, con la observacion de los los Eclypses. Y si en la Carta general no estan guardadas algunas derrotas, en lo que se sigue adelante se pon-

dra la razon, y satisfacion dello.

o se han descrito las partes interiores de la tierra, porque en Cartas de nauegar no son necessarias mas de las costas y puertos; suera de que la descripcion del Mapa terrestre, es diserente de la que se haze en las Cartas de nauegar. Pero si para el gusto de su Magestad me mandaren que la haga, se pondra por obra en la superficie de vn globo, porque representarà lo natural, y en todo guardarè la orden que se me diere.

El padron particular del mar Mediterraneo, y el de la nauegacion del Septentrion, se diferenciaron: de lo que destas partes està descrito en la Carta general, en su

lugar se darà razon porque se hizo.

Dieronseme cedulas, para que el Doctor Simon de Touar, y el Licenciado Rodrigo Zamorano Cosmografo de su Magestad, y don Domingo de Villaruel, ayudassen a esta enmienda. De todos ellos, folo ha ayudado Rodrigo Zamorano, el qual ha assistido continuamente, con su persona, y papeles: los demas, el vno era muerto, y el otro ausente. Demas desto, se ha tomado el parecer y relaciones de otros Cosmografos, y Pilotos. Han se tenido papeles y derroteros antiguos, y modernos; y observaciones de Eclypses, como en el discurso se

yran citandolos que mas hizieren al proposito, y sueren de mas

credito.

the same of the other than the same of the 4-11-12-4-110-4-7-700100



CAPITVLO PRIMERO, EN QVE se demuestra que todos los que nauegan y andan por la tierra, se mueuen por circulo mayor.




NTRE Los antiguos huuo algunos que dixeron, que la tierra era llana, como fue Empedocles, y Anaximenes. Otros dixeron, que a a manera de vna piramide redóda, como fue Heraclito. Otros dixeron, que era concaua, como fue Democrito. Y otros, a manera de vna coluna redonda, como fue Anaximander. Y otros, que era infinita por la parte baxa, como fue Xenofanes. Pero los vnos y los otros andunieron errados, porque agua y tie-

rra hazen vna bola perfetamente redonda, como lo pruena Ptolomeo en el primero libro del Almagesto, y Copernico en el primero libro, capitulo tercero, sin otros muchos. Pues digo, que siendo la tierra redonda, como lo es, que todos los que nauegan, o camina por la tierra, se mueuen por circulo mayor, lo qual es cosa muy euidente: porque el hombre que anda por la tierra, siempre està perpendicular sobre su superficie, luego si de la cabeça del hombre se tirase una linea, que passasse por los pies, esta linea passaria por el centro de la tierra; y todo circulo mayor passa por el centro de la tierra, luego donde quiera que estè vn hombre tiene los pies sobre circulo mayor. Esto mismo se ha de entender del nauio, que siempre cae perpendicular sobre la superficie del agua, por lo qual ha de estar sobre circulo mayor. Pero assi el hombre en la tierra, como el nauio en la mar, cada passo que se mudan, passan de vn circulo mayor a otro, saluo si semouieren por la Equinocial, o Meridiano, que entonces no mudan de circulo. De manera, que caminando por qualquiera paralelo, o qualquiera otro rumbo, van cada passo de un circulo mayor en otro, los quales circulos son tangentes al tal paralelo por donde se nauegan, pero no al rumbo, fino antes se cortan.

Para que esto se entienda mas claro, pondre las dos figuras siguientes, y caminese en la primera por paralelo: Pues sea el globo de la tierra, a b c d:la Equinocial, b c, y el paralelo por donde se nauega, o camina, a d. Pongamos que vn hombre se ha de mouer por el paralelo, a d, y que tiene los pies en el punto, h, y como está dicho, ha de estar sobre circulo ma yor, el qual sera tangente al paralelo, a d, que pongamos que es el circulo, f. f. g.


lo, fh g. Poniendo el pie en el punto, K, en el mismo paralelo, no le tédra sobre el circulo, fh g., pues es tangente al paralelo, a d., sino sobre otro circulo mayor, que es tangente al paralelo, a d., en el punto, K, que sera el circulo, n K o. Pues poniendo el pie en el mismo paralelo, en el punto, n, le tendra en el circulo mayor, p l q:y passando el otro pie al punto, m, le pondra sobre el circulo mayor, r m s, tangente al paralelo, a d, en el punto m: y assi todas las vezes que muda el pie, le assienta en vn circulo mayor, diferente del que le leuanta, y tangente al paralelo; pero realmente el hombre siempre passa por el espacio, y distancia del mismo paralelo.



Esto mismo se ha de entender del nauio, que como quiera que se mude.va caminado de vn circulo mayor en otro, todos tangetes al paralelo por donde nauega, y assi va passando por infinitos circulos mayores, to- dos tangentes al paralelo por donde nauega. Pero el hombre que caminare por la tierra, por qualquiera rumbo, a ora sea por Meridiano, o la Equinocial, no va passando de vn circulo mayor en otro tangentes al rubo, como lo hazia quando caminaua por paralelo, por que todos los rumbos son circulos mayores: y siendo assi, el camina por la tierra por su circulo mayor, sin que aya inconueniente que le desnie del síaluo si caminasse por algun rumbo determinado, como si siempre huniesse de caminar por el Nordeste, que entonces ha de yr mundando circulos mayores, los quales se cortan vnos a otros, como es necessario.

Esto mismo hara la nao nauegado por la mar, comose demuestra en la si gura siguiete. Sea como en la sigura precedete, el globo de la tierra, a b c, la Equinocial, b c, el polo del mudo, a, del qual venga a la Equinocial los Meridianos, a d, a c, a s, a g. Pogamos en el puto, h, vna nao q quiere nauegar por el vieto Nordeste, descriuase por el puto, h, el circulo, h K c, q ha ga co el Meridiano, a h d, angulo de 45. grad. q es lo q el viento Nordeste està apartado del Meridiano. Pues nauegando la nao por el circulo, h K, quado llegare al puto, K, el circulo, h K c, no hara co el Meridiano, a K e, q es dode està la nao, angulo de 45. gra. por q mayor es el angulo extrinse co, a K c, q no el intrinseco, a h c. Luego es necessario q mude de circulo, para q haga con el Meridiano, a K e, angulo de 45. grados: sea el circulo,

Kln.

K1n, el que haze angulo de 45.grados, con el Meridiano a Ke, y mouiendose por este circulo, llegó al punto, l, en el Meridiano, a lf, donde el angulo que haze el circulo, Kln, con el Meridiano, a lf, es ma yor de 45. grados: luego es necessario, que nauegüe por otro circulo que haga angulo de 45. grados, con el Meridiano, a lf, que seria por el circulo, l mo; y llegando por este circulo al punto, m, en el Meridiano, a m g, el circulo, l mo,


no haze angulo de 45. grados, con el Meridiano, a m g, por lo qual ha de tomar otro circulo que haga con el los 45. grados. De suerte, que todo el tiempo que nauegare por el rumbo de Nordeste, en cada Meridiano que llegare, ha de caminar por otro circulo mayor, diferente del que lleuaua: y como por momentos va mudando de Meridiano, son infinitos circulos mayores los en que la nao se va mudando. Pero como el que gouierna tiene cuenta que la nao no se aparte de la derrota que lleua, los angulos de los circulos en que està la nao del ponto, h, al punto, m, no son de consideracion, para dezir, que del punto, h, al punto, m, aya mas camino que si todo sueste en circulo. Esto mismo se ha de entender del home que camina por la tierra, si lleuasse siempre va misma derrota, como se ha dicho de la nao. Pues por este exemplo se entendera el camino que haze la nao, nauegando por qualquiera rumbo, como no sea por la Equinocial, o Meridiano, porque entonces (como se ha dicho) siempre va por vn mismo circulo.

(AP. 11. En que se enseña la fabrica de la Carta de marear.


VNQVE Son muchos los que han eferito del arte de nauegar, hasta aora no he visto ninguno que declare como se ha de entender la superficie redoda de toda la tierra, y agua, estendida en plano, como lo està la carta de nauegar. Pues para la demostración que se pretende hazer, es necessario

que pongamos la propoficion figuiente.

Si muchos planos tunieren por comun fecion vna mifma linea, y los cortare otro plano que sea equidistante al plano de la tal comun fecion, las comunes seciones que el plano que los corta hiziere en cada vno de los planos, seran lineas rectas, y paralelas.

Sean pues los planos, a b, c d, e f, g h, y tengan to dos por comun fecion la linea, m l. Sea el plano, i K, paralelo del plano, a b, por lo qual ha de

cortar a los demas planos, y seran las comunes seciones que en ellos hiziere, las lineas, no, pq, rs, que por la tercera del vudecimo de Euclid. seran lineas rectas, las quales digo que seran paralelas entre si. Al plano c d, le cortan dos planos, a b, i K, que ponemos que son paralelos: luego por la 16. del vudecimo de Euclid. las comunes seciones, l m, no, seran paralelas. Demas desto, al plano, e f, le cortan los planos, a b, i K, que son paralelos: luego las comunes seciones, l m, pq, son paralelas. Tambien al plano, e h, le cortan dos planos paralelos: luego las comunes seciones, l m, rs, son paralelas. Pues las comunes seciones, rs, pq, on, son paralelas de la linea, l m: luego por la 31. del primero de Euclid. seran paralelas entres.



Pues apliquemos esto a nuestro proposito, los planos, a b, e d, e f, g h, supongamos que son planos de circulos Horarios, o Meridianos, que son vna misma cosa, de los quales la comun secion es en el exe del mudo, que aqui seria la linea, l m. Pues pongamos que el plano del Orizonte es, i K, el qual pongo que sea paralelo del exe del mundo, l m: luego por lo que se ha demostrado, las comunes seciones que el plano, i K, haze con los planos de los Meridianos, seran lineas rectas y paralelas.

Esto assi entendido, demostremos como el plano de la Carta de nauegar representa el plano del Orizonte, paralelo al exe del mundo. Para lo qual pongamos lo pri mero, que la nao nauega por la Equinocial, y que quiere nauegar por vn qualquiera Meridiano. El instrumento que tiene el Marinero, para que le enseñe el camino, y que no se desuie del Meridiano, es la agusa de marear. Pues aqui se han de considerar dos cosas, la vnaes, que en qualquiera punto que està la nao, en la superficie del agua, que es como vn plomo, el qual va a dar al centro

del mundo, por estar libremente suelta en la superficie del agua, y que si del arbol de medio de la nao, se echasse vn perpendiculo, yria paralelo a vn plano que passa por el centro del mundo, o por mejor dezir, por el mismo plano del Meridiano en que està la nao. Pues este perpendiculo, cae perpendicular sobre el plano del Orizóte; luego tambien passaria por el centro de la aguja, pues el plano della es paralelo al plano del Orizonte: porque andando el instrumento de la aguja libremente sobre el punto de vn peon, y ella fiendo equilibrada de todas sus partes, necessariamente el plano de la aguja ha de estar paralelo al plano del Orizonte; luego el plano de la Carta, y el plano de la aguja son vna misma cosa. Y como el peon sobre que està la aguja representa el exe del Orizonte, el qual corta a este exe en angulos rectos; y siendo la superficie de la aguja plana, y equidistante al plano del Orizonte, la secion que hiziere en los acimutales han de ser lineas rectas: por lo qual las lineas rectas q salen del centro de la aguja, son las comunes seciones de los açimutales, que representan los vientos co que se nauega: y porque donde quiera que està la nao la corta, alli imaginamos el centro de la aguja. Por tanto, de aquel punto auemos de imaginar, que salen otras tãtas lineas como estan en la aguja, correspondientes las vnas a las otras.

Auemos puesto que la nao vaya nauegando por la Equinocial pues por lo que ha demostrado, en qualquiera parte que hallare la não de la Equinocial, estarà en vn Meridiano, cuyo plano corta al plano del Orizote en an gulos rectos, por que como auemos dicho, la nao siempre cae perpendicular sobre el plano del Orizonte: luego el plano del Meridiano en que esta la nao, corta al plano del Orizonte en angulos rectos; y la aguja tiene su plano paralelo al plano del Orizonte. Luego la comun secion

del plano del Meridiano en que està la nao, corta a la aguja por el rumbo de Norte Sur; luego tambien a la carta de nauegar, que representa a la misma aguja. La secion del plano del Meridiano con el plano del Orizonte, es linea recta, por la 3. del onzeno de Euclid. y por ser el plano del Orizonte paralelo al exe del mundo, està demostrado, que las comunes seciones del plano del Orizonte, y los planos de los Meridianos, han de ser paralelas. Luego en la carta de nauegar, los Meridianos que en ella se senala, han de ser lineas rectas y pa-

ralelas, que es lo primero.

Lo segundo que se ha de considerar, que el plano de la Equinocial corta al plano del Orizonte, y la comun fecion es linea recta. La comun fecion del plano del Meridiano con el plano de la Equinocial, tambien es linea recta : y el plano del Meridiano con el plano de la Equinocial, haze angulos rectos: luego el exe del mundo, que cae en la superficie del plano del Meridiano, serà perpendicular fobre el plano de la Equinocial. Luego por la. 8. del vndecimo de Euclid.la comun fecion del plano del Orizonte, con el plano del Meridiano, caera perpendicular sobre el plano de la Equinocial. Por lo qual la comun secion del plano del Orizonte, con el plano del Meridiano, cortaràn en angulos rectos a la comun fecion del plano del Orizonte, con la del plano de la Equinocial. Teniamos prouado, que las comunes seciones del plano del Orizonte, con el plano de los Meridianos, que eran lineas rectas y paralelas: luego los Meridianos en la carta de nauegar, son lineas rectas y paralelas.

Demas desto se ha de considerar, que mouiendose la nao por la Equinocial, que donde quiera que està, cae perpendicular sobre el centro del mundo: ya auemos demostrado que la secion del plano del Meridiano en que està la nao, con el plano del Orizonte, que corta a la Equinocial en angulos rectos. Luego si la nao se huuiere mouido diez grados, estaràn apartadas las comunes seciones del plano del Orizonte; y los planos de los Meridianos otros diez grados, contados por la Equinocial. Pues auemos demostrado, que estas comunes seciones han de ser paralelas, luego los Meridianos en la carta de nauegar estaràn tan distantes por la parte de los Polos, como por la Equinocial.

Siguese de aqui, que poniendo los lugares en sus longitudines, y latitudines, que no estará en sus verdaderas distancias; saluo los que estuuieren en la Equinocial, y en vn mismo Meridiano: y quanto mas se apartaren de la Equinocial, serà mayor la diserecia entre la distacia verdadera, y la que ay en la Carta entre los tales lugares.

Resta demostrar, que los circulos paralelos a la Equinocial, en la carta de nauegar son lineas rectas, y paralelas a la Equinocial de la Carta. El plano del circulo de la Equinocial, y los planos de los circulos paralelos a la Equinocial, son paralelos entre si. Luego por la diez y seys del vndecimo de Euclid.las comunes seciones que hizieren con el plano del Orizonte, seran paralelas entre si: y estas comunes seciones que hazen los planos de los paralelos a la Equinocial, son los paralelos de la carta de nauegar. Luego en la carta de nauegar, las lineas que representan en la Esfera los paralelos a la Equinocial, son lineas rectas y paralelas; y en la misma distancia que los consideraremos en la Esfera, en essa misma estaran en la carta de nauegar. La razon es clara, porque siendo estos planos de los circulos paralelos, equidistantes entre si, y cortandolos el plano del Orizonte en angulos rectos, que tambien en el plano de la Carta estará en la misma equidistancia.

Pues de lo dicho queda aueriguado, que los lugares

que en la Carta estuuieren en vn mismo Meridiano, que estaran en la carta de nauegar en la comun secion que el plano del tal Meridiano hiziere en el plano de la Carta, que como està demostrado representa en la Carta, el Meridiano de la Esfera.

Pues auemos tratado de los Meridianos, y paralelos de la Carta, resta de tratar de las demas lineas que en la Carta se descriuen, las quales comunmente llaman Derrotas. Es necessario que aquile haga vna consideracion, y es, que estando la nao en la Equinocial, y que (como auemos dicho) està perpendicular sobre el plano del Orizonte el exe, o peon sobre que està el plano de la aguja, que si se estendiesse en infinito que passaria por el Zenit, y el Nadir, que son los Polos del Orizonte. Pues si por estos polos se descriuieren diez y seys circulos mayores, que corten por ygual la circunferencia del Orizonte, haran los planos destos circulos 32. seciones en el plano del Orizonte, que todas se cortaran en el centro del plano de la aguja. Pues estas seciones son los treynta y dos vientos, o rumbos que se descriuen en el plano de la aguja. Teniendo esta aguja vn hierro que està puesto derechamente debaxo de vna destas seciones que se hazen en el plano de la aguja, el qual hierro està tocado con la piedra yman; por cuya virtud se buelue siempre de Norte Sur: luego el viento que estuuiere encima del hierro, estara de Norte Sur, y el que cortare a este en angulos rectos, estara de Leste Oeste, y los demas corresponderan a seys partes. Pues el plano de la aguja, es el mismo que el plano de la Carta, las mismas seciones que diximos que hazian los 16. circulos en el plano de la aguja, essas mismas haran en el plano de la carra de nauegar. Siguese luego, que los Meridianos en la Carta, que son lineas de Norte Sur, que han de cortar a los paralelos

de


de Leste Oeste, en angulos rectos, como se cortan en el

plano de la aguja.

Teniamos que los Meridianos en la Carta de nauegar eran lineas paralelas, luego estos rumbos, o vientos cortarán a los Meridianos siempre con vnos mismos angulos, segun que cada viento se apartare del Meridiano, como el viento Nordeste, que se aparta del Meridiano por 45 grados. Pues si este viento se estendiere por toda la Carta, cortará a todos los Meridianos por angulo de 45 grados, por la 29. del primero de Euclid. Si los Meridianos no suessen en la carta paralelos, y cortassen a la Equinocial en angulos rectos, no podria la aguja ensenar el camino de Norte Sur, ni de las demas derrotas.

Para que esto se entienda mejor, hagamos la figura siguiente, en la qual sea el circulo, a b c d, en la Essera vn Meridiano, que su plano va paralelo al plano de la carta de nauegar: tirese, a c, por el centro, e, y sea, a c, la comun secion de todos los Meridianos, y los puntos, a, c, los polos del mundo, donde en la Essera concurren todos los Meridianos. Tirese, b d, por el centro, e, que haga angulos rectos con, a c, y sera, b d, la comun secion del plano de la Equinocial, con el plano del Meridiano, a b c d. Dieuidase, e d, en nueue partes y guales, y sean las diussiones los putos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, por los quales, y por los puntos, o polos, a, c, han de passar los Meridianos en la Essera, los quales hagamos cuenta que estan descritos en el cuerpo Esserico, como parece. Pues por lo que esta demostrado, si por los puntos, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, se tiraren lineas paralelas a la linea, a c, seran las comunes seciones de los planos de los Meridianos, con el plano del Orizonte, como atras queda demostrado.

Esto assi entendido, pongamos en la Equinocial, y en el Meridiano a 3 c, vn lugar. Pongamos otro lugar en el Meridiano, a 6 c, en la superficie de la Esfera, que sea el punto, 1, y estè en tal altura, que el circulo maximo que se tirare del punto, 3, y por el punto, 1, haga angulo de 45. grados con el Meridiano, a 3 c: tirese por el punto, 3, la linea, 3 l, que haga angulo de 45. grados con la linea, o 3 p: tirese por el punto, 1, el paralelo m 1 n, que cortara con su plano a la linea, 3 l, en, l. Tomesse otro lugar en la Equinocial en el punto, 4, tan apartado del punto, 6, como lo està el púrto, 3; y tirese el arco de circulo maximo, d 1, que haga angulo de 45. grados con el Meridiano, a d c: mas se tire, da, que haga angulo de 45. grados con, g d K, la qual de necessidad ha de cortar la linea, 3 l, en el punto l, porque los lados, 3 6, 16, son yguales entre si; y tambien son yguales a los lados, 16, ld: y los angulos, 13, 6, 1 d b, es cada vno medio recto, y los angulos, 16, 16, son rectos: luego cada vno es medio recto por la 32.



del primero de Euclid. por lo qual, las lineas, 3 l,d l, fe han de cortar con la linea, q 6 r, en el punto, l. Pues digo, que el lugar que en la superficie de la Esfera està en el punto, 1, que en el plano de la Carta ha de estar en el punto, l; el qual punto, l, está en la carta en la misma disposicion con los Polos, y Equinocial della, que el punto, 1, está en la Esfera. Porque nauegando por el arco, d 1, o el arco, 3 1, fiempre se tiene cuenta que la proa de la nao vaya con la inclinacion que el circulo por donde nauega tiene con los Meridianos por donde passa, la qual inclinacion enseña la aguja, gouernando de manera, que el rumbo de la aguja que reprefenta el arco 3 1, vaya con la misma inclinación del Meridiano que en la aguja va de Norte Sur, y este tal rumbo va de popa a proa. Luego quando la nao va nauegando por el circulo, 3 1, en la superficie del globo de la tierra, y agua, o alomenos por otro semejate, compuesto de arcos de circulo mayor, como se dixo en el capitulo primero, se ha de imaginar, que en la Carta se nauega por el rumbo, 3 l, el qual rumbo està descrito en la Carta, en la misma disposicion que el circulo, 3 1, en la superficie de la Esfera: y quando la nao ha llegado al punto, I, se ha de entender, que en la Carta está en el punto, l; porque quando la nao està en el punto, 1, està en el paralelo, m I n, descrito en la superficie de la Esfera, cuyo plano corta a la superficie de la Carta en la linea, m l n, y estando la nao en el punto, 1, està en el Meridiano, a 6c, cuya comun secion con el plano de la carta, es, r 6 q, las quales dos feciones del paralelo, y Meridiano en que està la nao. se cortan en el punto, l, y la linea, 1 l, es la comun secion del plano del Meridiano.

ridiano, a ic, y del plano del paralelo, m l n: luego el punto, l, en el plano de la Carta, está tan distante de la Equinocial, como lo está el punto, 1, en la superficie del globo del agua: y tambien estarà en la misma longitud en la Carta, del Meridiano, a e c, o de otro qualquiera, como lo está en la superficie del globo el Meridiano, a b c. Pues de lo dicho queda bien entendido la correspondencia que los Meridianos, y paralelos, y las demas lineas de la carta de nauegar tienen con los Meridianos, y paralelos,


y los demas circulos del globo terreftre.

Pues queda de aqui, que lo mesmo es nauegar por las lineas rectas de la carta plana, que si se nauegas por las circulares de la Esfera. Siguese tambien otra cosa de mucha consideracion, que nauegando por derrota y altura, que si la derrota que se lleuare suere cierta, y tambien la altura que tomaren los lugares que assi se hallaren, que esta ânten sus longitudines verdaderas, cosa que hasta aora nadie lo ha aduertido, ni demostrado. Por lo qual las longitudines que se han hallado por derrota, y altura, concuerdan con las longitudines que se hallan por los Eclypses: y si discuerdan en algo, es porque la derrota no feria tan cierta como pensua el Piloto, por no tener cierta la variacion de la aguja. Pero si lleuaren instrumento que les dè alos nauegantes la variacion de la aguja, fabran cierta la derrota que lleua, de donde se seguira, que pondran los lugares en sus verdaderas longitudines.

Tambien se sigue de aqui otra cosa, que si los que nauegaren pusieren en la carta de nauegar los lugares por derrotas, y distancia, que ni

los pondran en su longitud, ni laritud.

Pongamos desto yn exemplo en la figura signiente, y sean las lineas ab,hK, cd,paralelas a la Equinocial: tirefe, a c,e f,bd, que hagan angulos rectos con, a b, y seran estas lineas, a c, e f, b d, Meridianos en la carta de nauegar. Pongamos en los puntos, a, e, b, ciertos lugares que estara en vna milma latitud. Pongamos otros lugares en los puntos, g, f: irefe, a g, a f,y seran las verdaderas derrotas por donde se nauegan del punto, a, a los puntos, g,f: tirefe mas, g b,fb, y feran, g b,fd, las verdaderas derrotas por donde se nauega de los puntos, g, f, al punto, b: y esto nauegando por derrota y altura, como queda demostrado. Pero naueguemos por derrota, y distancia, y veremos como ningun lugar queda en su longitud ni latitud, nauegando del punto, a, al punto, e, en la carta de nauegar, que se nauega por altura y derrota: ay mas distancia que realmente ay en lo natural: pues el que nauega por distancia y derrota, no pondra el punto, e, en el Meridiano, e f, sino en el punto, m, tomando, a m, por la distancia verdadera.Lo mismo hara nauegando del punto, a, al punto, g, por la derrota, a g, que tomaria la verdadera distancia, a l: y el lugar, g, le passaria al punto, l. Tambien nauegando del punto, a, al punto, f, la derrota, a f, tiene mayor distancia q ay en lo natural: luego el q nauega por derrota y distancia, tomaria menor espacio q,a f, que seria, a o, y alli pondria el lugar, f, fuera de su longitud, y latitud. Demas desto no estarian los tres pueblos e,g,f,en vn mismo Meridiano, poniendolo en sus distancias, del punto, a, en los puntos,m,l, o: porquesi del punto, m, tiraremos,m n,paralela del Meridiano, e g f, no passara por los puntos, lo, pero sera tan poca la diferentia,



rencia, que aunque el que nauegare del punto, m, para los lugares, l,o, vaya de Norte Sur, no errarà de acertar con los lugares, l,o. Las derrotas que an de los puntos, g, f, al punto, b, fon diferentes de las que han de yr de los puntos, l,o, fi el lugar que está en,b, no se mudare: y la mudança ha de ser de tal manera, que las derrotas que sueren de los puntos, l,o, al lugar b, sean las mismas, que son, g b, fb, porque de otra suerte no encontrarian con el lugar, b. Pues de los puntos, l,o, se tiren lineas paralelas de las lineas, g b, fb, y feran las mismas derrotas que, g b, fb. Pues donde se cruzaren las paralelas que salen de los puntos, l,o, que es en el puto, p, alli estarà el lugar, b: y desta suerte quedara el lugar, b; en la distancia verdadera de los puntos, l,o; o alomenos proximamente, pero no en su longitud ni latitud.

Pues los que nauegan por derrota y distancia, que son los que nauegar el mar Mediterraneo, y las partes Septentrionales, tunieron este modo de nauegar, y assi no ay lugar en estas partes que en la carta de nauegar estè puesto en su longitud ni latitud. Este modo de nauegar, no se puede vsar sino donde los sugares estan muy cercanos vnos de otros, que en grandes distancias no dexaria de auer mucho error: pero como en el mar Mediterraneo, y en las partes Septentrionales, estan los sugares tan cercanos vnos de otros, que no passan veynte y quatro horas quo vecn tierra, y en tan pequeñas distancias el error es poco, y no pueden dexar de reconocer los sugares; y acertar con ellos: y en este modo de nauegar, las distancias ponen por estimativa, y no Geometricamente, por lo qual no se puede siar mucho de las distancias que assi se hallaren.

Pues queda segun esto, que nauegar por derrota y altura, es lo perseto: y que los lugares que segun este modo de nauegar se assentanten, estan en sus verdaderas longitudines y latitudines, pero no en sus verdade-

ras distancias.

Para los que no fueren tan Geometras, y especulatiuos, como para entender lo que se ha dicho se requiere, enseñaremos esto mismo por otro modo mas pratico.

Pues viniendo a declarar como la superficie plana de la carta de nauegar, concuerda con la superficie redonda de la tierra y agua, descriuamos la sigura siguiente, en la qual sea la superficie plana de la carta de nauegar, a b c d: y las lineas, a b, c d, sean yguales y paralelas, las quales se juntaràn con las lineas, a c, b d, haziendo rectangula la superficie, a b c d. Tirese por medio entre, a b, c d, la linea, e f, la qual represente la Equinocial del globo, y sea dupla de, a c. Diuidase, e f, en 12 partes yguales, y abriendo el compas desuerte que ocupe casi las nueue dellas, y con esta abertura, poniendo la vna parte en qualquiera de las diuisiones, y la otra fixa en la linea, e f, estendida de vna y otra parte lo que suere menester, se descriuiran las 12. tajadas como parece.


Pues si se juntasse el punto, e, con el punto, f, en circulo redondo, todas las partes de las tajadas que estan en la linea, a b se juntaràn en vn punto, que seria el polo Artico. Pues si imaginamos que se desplega la superficie del globo, todas las puntas de las tajadas que estauan en los Polos, se estenderan tanto como la Equinocial: por lo qual lastierras que estuuieren muy apartadas de la Equinocial, se estenderan mas de lo que naturalmente son; y las que estuuieren cercanas a la Equinocial no tanto; y las que estuuieren en la misma Equinocial no se alte-


raràn en nada.

Pero aunque todas las tierras que estan suera de la Equinocial, hagá esta extension, y vnas mas q otras, segu estunieren mas, o menos apartadas de la Equinocial, no se ha de entender que mudan la longitud: porque en la carta de nauegar los Meridianos son lineas rectas, y cortan a la Equinocial en angulos rectos: tambien la lati-

tud està claro que no la mudan. Sera necessario, que segun este modo de proceder demostremos, como en la carta de nauegar los Meridianos son lineas rectas, y que cortan la Equinocial en angulos rectos. Pongamos que en esta figura, el punto, l, es la isla de la Madera, en el Meridiano, h K. Bien consta por las nauegaciones que hazen todos los Marineros, sin quedar ninguno, que nauegando de la isla de la Madera a Tenerife, que siempre van Norte Sur, caminando por debaxo de vn Meridiano. Pues digo, que la isla de la Madera, y Tenerife, que estan en el Meridiano, h K, en la carta de nauegar, y assi la isla de Tenerife estarà en el punto distante del punto 1, por la diferencia de latitud que ay entre la Madera y Tenerife. Porque si en esta estension que auemos dicho de las tajadas, quisieremos dezir, q las tajadas, AD, BE, se juntan en el globo por los Meridianos, AGD, B G E, como esassi la verdad; y que en la superficie plana de la Carta son estos los Meridianos, esto no puede ser: porque laisla de la Madera auia de estar en alguno de los Meridianos, A G D, B G E, y lo mismo la de Tenerife. Pues siendo desta manera, no es possible el que partiere de la Madera, y nauegare Norte Sur, topar con Tenerife; porque si pusieren en la Carta la isla de la Madera, en el punto, r, y Tenerife en, t, en el Meridiano, BGE, el punto, r, y el punto, t, no estan Norte Sur; y no estando en la carta de nauegar Norte Sur, el Piloto mãdaria gouernar segun la derrota que hallasse en su Carta, que se corria de la vna a la otra parte, y assi no podria topar con Tenerife, el que nauegasse por otra derrota que de Norte Sur, como lo demuestra la experiencia. Luego siguese, que las partes que se hallaren nauegando Norte Sur, que estan debaxo de vn mismo Meridiano, y que este es linea recta en la carta de nauegar, y que corta a la Equinocial en agulos rectos. Por lo qual, todas

las





dianos paralelos entre si, claro està que en la carta de nauegar, que hallara entre dos pueblos mayor distancia de



lastierras que estuuieren en el globo debaxo de vn Meridiano, lo han de estar en la superficie plana de la carta de nauegar: y este Meridiano es linea recta, y corta a la

Equinocial en angulos rectos.

Demas desto pongamos, que por observacion de algun eclypse de la Luna, se hallaro dos tierras que tenian vna milma longitud: luego estan en la superficie redonda de la tierra, debaxo de vn mesmo Meridiano. Pues si estas dos tierras las pusiessemos en la carta en sus latitudines, pero no en vn mesmo Meridiano de los q se seña lan en la carta de nauegar, claro es, que el Piloto mandaria gouernar fegun la derrota que hallasse que yua de vna parte para la otra. Pues estando estas dos tierras debaxo de vn Meridiano, y nauegando la nao por otra derrota que no fuesse Norte Sur, no era possible encorrar con la tierra que yua a demandar. Luego figuefe, que las tierras que estuuieren en la superficie redonda de la tierra, debaxo de vn Meridiano, que tambien lo han de estar en la superficie plana de la carta de nauegar, porque el Piloto mandò nauegar de Norte Sur, y desta suerte toparà con la tierra que va a demandar. Otras muchas razones se pudieran traer, para prouar que las tierras que en la superficie del globo terrestre estan debaxo de vn Meridiano, que tambien lo han de estar en la superficie plana de la carta de nauegar; y que los Merinos de la carta han de ser lineas rectas, y corta a la Equinocial en angulos rectos de la companya en control be

Pues siguese de aqui, que las tierras que estan suera de la Equinocial, en la superficie plana de la carta de nauegar, han de estar mas estendidas de lo que naturalmente son, porque todos los paralelos a la Equinocial, son de la misma longitud que la Equinocial: y siendo los Meridianos paralelos entre si, claró està que en la carta de nauegar, que hallará entre dos pueblos mayor distancia de

la que realmente tienen. Y por no auer entendido algunos esto, se han aluzinado en algunas demostraciones que han querido hazer, como se entendera claro de lo que adelante se sigue.

CAP. 111. Que demuestra que nauegando por paralelo, o por otro qualquiera rumbo, como no sea por la Equinocial, o Meridiano, llega antes la nao al puerto, que no el Piloto con el punto en la carta.

E Lo que se ha dicho en el capitulo passado, està claro de entender lo que en este se propone; y de no lo auer entendido, se han dicho en este particular muchos errores, de que hasta aora no ha auido quien hiziesse

declaracion, siendo de importancia, assi para la verdadera descripcion de la carta de nauegar, como para lo que importa a los que nauegan. Pongamos que vno nauega por algun paralelo, como de la Tercera a Lisboa. Sea pues en el Mapaprecedente, el punto, m, la Tercera; y el punto, u, la la roca de Cintra: digo que entonces la nao no nauega mas que la parte del paralelo, m c, x u, y la cantidad, Ix, està mas en la carta, que no es la distancia entre la Tercera y Lisboa. Puesel Piloto va echando cuenta por singladuras el camino que haze, y como entra en esta cuenta la cantidad del paralelo, i x, la qual cãtidad la nao no nauega, necessariamente ha dequedar mas atras el punto en la carta, que no la nao; y assi llegarà mas presto la nao al punto, u, que no el punto en la Carta, las leguas que fuere la cantidad, ix, la qual cantidad le seria facil de saber al Piloto que fuesse curioso:porque en el paralelo de 39. grados, que es el que passa por la Tercera y roca de Cintra, cada vn grado es menor que el grado de la Equinocial 13. minutos, 22 segudos: pues Sabien-

127

fabiendo la longitud entre la Tercera y la roca de Cintra, y estos grados se multiplicaren por 13. minut. 22. segundos, y los grados que resultaren desta multiplicacion se conuirtieren en leguas, otras tantas llega la nao mas presto a la roca de Cintra, que no el punto en la Carta. Esto se entiende, haziendo el Piloto muy precisa la cuenta de sus singladuras: y porque esta cuenta no es possible que los Pilotos la hagan tan susta como lo piden las reglas Matematicas, puede ser no sea tan puntual como se saca por la cuenta, pero alomenos lle-

garfe han a la verdad.

Entendido lo que aqui se ha dicho, saldran de vna cófusion en que estan, que es lo que acabamos de prouar: porque amuchos Pilotos les he oydo dezir, que las Terceras auian de estar mas llegadas a la costa de España, porque hallan por experiencia lo que tenemos dicho, que la nao llega antesa tierra que no el punto en la Carta, donde quieren inferir, que las Terceras estan mas llegadas a España; pero si supieran la razon desto, entendieran que estauan bien puestas, o alomenos sino estauan bien, supieran como se auja de enmendar. Porque como algunos Pilotos dizen, que las Tercerasavian de estar mas llegadas a la costa de España: otros dizen, que auian de estar mas apartadas; diziendo, que partiendo de la Habana para las Terceras, despues que desembocan el canal de Bahama, para venir a las Terceras, que primero llega la nao a las islas, que no el punto en la Carta, lo qual es assi necessario, por las razones dichas. De manera, que viniendo los Pilotos, de la Habana para las Terceras, hallan que han de estar mas llegadas al Occidente : y partiendo de las Terceras para España, hallan que han de estar mas llegadas al Oriente, y esto fundandose en vna misma razon, pero en diferentes

y contrarios viajes. De lo qual se sigue, ser verdad que la nao llega antes a tierra, que no el punto en la Carta, y que las Terceras estan bien situadas en la carta de na-

uegar.

Demostremos esto mismo, nauegando por otra derrota que no sea paralelo, y pongamos que se nauega de la Tercera a la isla de San luan de Puerto rico, que pongo que està en el punto, p: tirese la linea recta, m n p, y sera en la Carta la derrota por donde se ha de caminar de la Tercera a San Iuan de Puertorico: la qual linea,m p, corta al Meridiano, AFD, en, n, y al Meridiano, GFH, en, y: pues todo lo que ay del punto, n, al punto, y, es mayor distancia en la carta de nauegar, que no lo que realmente camina la nao. Porque si imaginaremos, que en la superficie redonda de la tierra, se juntan los Meridianos, AFD, GFH, no sera el punto, y, el que se junta con el punto, n, sino el punto o, tan distante del punto, F, como el punto, n: luego lo que nauega la nao, son las lineas, m n, o p, las quales no son tan grandes como la linea, m p, porque, po, menor es que, pn : y por ser la demostracion clara no me detengo en esso. Luego lo que es mayor, pin, que, po, es mas larga la nauegacion en la Carta, que no lo que realmente nauega la nao. Que tanto sea menos lo que la nao nauega, se enseñara en su lugar . Pues queda demostrado que nauegando por qualquiera rumbo fuera de la Equinocial, o Meridiano, que la nao llega mas presto a tierra, que no el punto en la Carta, que es lo que atras se propulo.

Queda de aqui claro, que gouernando por la derrota, que en la carta muestra el camino de vna parte para otra, que la nao en la superficie redoda de la tierra sigue la misma derrota, porque partiendo la nao del punto, m,

quando

quando llega al punto, n, està en el punto, o; y el punto, o, en la superficie redonda de la tierra, se junta con el punto, n, luego la linea, po, se junta con la linea, p n: luego la misma derrota haze la nao en la superficie redonda de la tierra, que la derrota por donde la van gouernando en la Carta. Ha se de entender esto, con aquellas diferencias que dixe al principio, por razon que el que gouierna no puede yrcon tanto cuydado, que pueda remediar aquella variació que la nao haze caminando, como alli dixe.

Mas fe deue confiderar en la fabrica de la carta de nauegar, que como aqui auemos descripto doze tajadas en toda la carta, las quales bueltas en circulo, constituyen la superficie redonda de la tierra, se han de imaginar infinidad de tajadas; porque donde quiera que vno se halle, ha deentender que por alli passa vn Meridiano de los que se descriuen en la Carta, y que por alli fue la diuision de la tajada. Aqui solo se pusieron doze, para dar a entender la fabrica de la carta de nauegar, y como se han de imaginar todas las tajadas que quisieren, que para la demostración de lo que se ha propuesto estas bastan.

CAP. IIII. Que trata de la forma que se tuno para descriuir el Mapa vniuersal, y los puntos principales de las costas del mar Oceano, y del Mediterraneo.



O SE Ha tenido poca dificultad en descri uir lascostas del mar Oceano, por la poca noticia que de las mas dellas se tiene, y essa que auia, los Portuguesses la han querido es curecer, co intencion de que incluian detro

de la demarcació q a ellos lespertenece, las islas Molucas,

y rio de la Plata, acortando en las descripciones de los Mapas todo el viaje que ay de la costa del Brasil hasta la isla de Gilolo, caminando por la parte Oriental: y auiendose derramado estos Mapas por toda la Europa, los estrangeros creyendo q aquellos Mapas estauan bien descriptos, por auerlos hecho hóbres q nauegauan la mayor parte de la tierra, han seguido aquellas descripciones en sus Mapas y globos; aunq algunos, desengañados por las descripciones q modernamente se han traydo de la India, han enmendado alguna cosa, como luego diremos. Pero entiendo que vistas las razones, y demostraciones

que aqui se pondran, que mudaràn de parecer.

No han podido los Portuguesses ocultar ni encubrir la verdad, que el tiempo no la descubra, desde el año de 1524.que es quando por concordia entre Castilla y Portugal, se juntaron en Eluas y Badajoz juezes por la vna y otra parte, para que se determinasse lo q a cada Reyno pertenecia, para hazer sus nauegaciones, segun el contrato hecho entre Castilla y Portugal. Viendo pues los juezes que estauan de parte de Portugal, q si venian en competencia de razones, que auian de ser concluydos, y que no saldrian con su intencion, que era entrar dentro de su demarcacion las islas Molucas, acordaron de no se poner en esse peligro, sino que por otra parte se fuessen introduziendo, y que por entonces se quedasse el negocio sin determinacion. Desde alli adelante, y aun de ocho años mas atras, començaron a hazer los Mapas que he dicho, acortando todo el viaje que ay de la costa del Brasil hasta Gilolo: y hizieron de manera el acortamiento, que metieron las Molucas dentro de su demarcacion mas de diez grados, estando dentro de la demarcacion de Castilla mas de 24.grados, como demostraremos.

Aunque en este tiempose ha juntado estos dos Rey-

nos, y ha cessado esta competencia, pero para poder des creuir la verdadera situació de las costas del mar Oceano, y suslongitudines, es necessario traer a la memoria estas cosas passadas.

Pues fue la capitulacion entre Castilla y Portugal, en esta manera, que contando de las islas de Cabo verde, por el mismo paralelo en que estan 370. leguas al Occidente, y que por el fin de las 370. leguas passasse vn Meridiano, el qual dividiendo la tierra, la mitad que quedaua a la parte Oriental, fuesse para que los Portuguesses pudiessen nauegar, descubrir, y contratar: y la otra mitad de la tierra que este Meridiano dexaua a la parte Occidental, fuesse para que los Castellanos nauegassen, descubriessen, y contratassen. Pues reduziendo a grados las 370. leguas, contadas por el paralelo de la isla de San Anton, que es la mas Occideral de las islas de Cabo verde, y de donde se han de començar a contar las 370.leguas, como se dira adelante, segun lo prueua Pedro Ruyz de Villegas, vienen a ser. 22. grados, y casi vn tercio.

Todo esto assientendido, comencemos la descripció por la costa de España. Es cosa muy sabida, y en que no se pone duda entre todos los que nauegan, que partiendo de la barra de Lisboa para la isla de la Madera, se sigue la derrota de Nordeste Sudueste.

Pues pongamos el punto, b, en la boca de la barra de Lisboa, la qual està en 38. grados, 40. minutos de latitud, tirese, b a, paralela a la Equinocial; tirese, b m, que haga angulos restos con, a b, y sera, b!, el Meridiano que passa por la boca de la barra de Lisboa. Tirese, l.c., equidistante de, ab, y por 32. grados, 30. minutos, que tiene de latitud la isla de la Madera: pues estando el punto, b, en 38. grados, 40. minut. sera, lb, 6. grados, 10. minutos. Tirese, b c, que haga con, a b, angulo de 45. grados, que es el rumbo de Nordeste Sudueste, por donde se nauega del punto, b, a la Madera, y viene a concurrir con el paralelo, lc, en donde esta la Madera en el punto, c, en el qual de necessidad ha de estar la dicha isla. Pues por el punto, c, se tire, ca paralela de, b l, y sera, ca, el Meridiano que passa por la isla de la Madera, como queda demostrado en los capitulos precedentes,

tes, y concurrira este Meridiano con el paralelo, ba, en el punto, a. En el triangulo, bac, el angulo, a, es recto, y el angulo, a bc, es de 45. grados: luego sera de otros tantos el angulo, ac b, por lo qual los lados, a b, a c, son yguales. Pues teniamos que el paralelo, a b, passaua por 38. grados, y 40.minutos, y el paralelo, l c, por 32. grados, 30. minutos : luego la diferencia que son 6. grados, 10. minutos, es la linea, a b; y la longitud que ay entre la boca de la barra de Lisboa, y la isla de la Madera, segun que queda demostrado. En el segundo y tercero capitulo queda dicho, que todos los que nauegan hallan que la Madera y Tenerife estan debaxo de vn Meridiano, y que Tenerife tiene 28. grados de latitud, pues la Maderaestaua en el punto,c, en 32. grados, 30. minutos: tomemos, c d, y sera 4.grad. 30. minutos, y estará en el punto, d, Tenerife.

Esta cuenta que aqui se haze, es segu la fabrica de la carta de nauegar. Al fin del libro se pondra la demostracion de como se sabra la distancia entre dos lugares, segun que lo cuentan los Cosmografos en Geografia: pero en Hydrografia es assi necessario, segun queda demostrado en el capitulo segundo: y en quanto a la longitud tiene verdad esta cuenta,

pero no en la distancia, como atras queda dicho.


Tambien se halla por observacion, que la boca de la barra de Sanlucar està en 36. grados,40. minutos de latitud; pues tirese, f m, paralela de a b, y apartada a la parte del Sur. 2. grados, que es la diferencia de latitud entre la barra de Lisboa, y la barra de Sanlucar, y estara en el paralelo, fm,

También es cosa muy notoria entre todos los que nauegan la carrera de las Indias Occidentales, que saliendo de la boca de la barra de Sanlucar, gouernando al Sudueste, que van a dar a la punta de Naga, que es en

la isla de Tenerife. Pues tenemos conocido que Tenerife està en el Meridiano, a c d, en el punto d, tirese, de, que haga angulo de 45. grados, con, a d, que sera la derrota por donde se nauega de la barra de Sanlucar a Tenerife, y cortará la linea, de, al paralelo fm,en, e, en donde ha de estar la boca de la barra de Sanlucar.

En el triangulo, dfe, el angulo f,es recto, los otros dos son yguales, porque cada vno es 45.grados: luego los lados, df, ef, fon yguales: el lado, df, era por las observaciones 8.grados, 40.minutos, luego fera otros tantos el lado, fe, que es la longitud que ay entre Sanlucar, y Tenerife.

Demas desto, la gran Canaria se halla por observacion, que tiene la misma latitud que Tenerife, y de la costa Occidental de Tenerife, al medio de Canaria, hallan todos los que aquello



aquello nauegan, que ay 32 leguas, que alli son dos grados: pues tomemos, dg, que sean dos grados en el paralelo de Tenerise, y estará en el

punto, g, la gran Canaria.

Tambien es cosa muy averiguada, que de Canaria a San Anton se correla derrota Nordelte Suduelte, y la isla de San Anton està en 18 grados, pues Tenerife está en 28. grados en el Meridiano, a de tomemos, d n, de 10. grados, y por el punto, n, se tire el paralelo, n h, que estará en 18. gra dos de latitud: luego estarà la isla de San Anton en el paralelo, n h. De la gran Canaria, que es en, g, se tire el rumbo, g h, que haga angulo de 45. grados con, dg, y fera, g h, la derrota que se corre de Canaria a San Anton: la qual derrota concurre con el paralelo de 18 grados, en, h, en donde viene a estar la isla de San Anton. Tirese, gK, que haga angulos rectos con, dg, y fera, g K, el Meridiano que passa por Canaria, el qual concurre con el paralelo, hin, en que està San Anton en el punto, K. Pues d g, es el paralelo de 28. grados, y la linea, K li, el paralelo de 18. grados, fera, K g, 10. grados, y otros tantos, h K, porque en el triangulo rectangulo, h K g, los angulos, Khg, Kgh, son yguales por ser, gh, la derrota de Nordeste Sudueste. Teniamos que, d g, por oblervacion era dos grados: luego sera otros dos,n K, pues fon paralelas, dg,n K, y entre lineas paralelas: pues restando dos grados, que es, n h, de 10. grados, que es, h K, quedará, h n, de ocho grados que es la longitud que ay entre Tenerife y la isla de San Anton, la mas Occidental de Cabo verde. Pues contadas en el paralelo n h, las 370. leguas, fegun la capitulacion, contienen en el mismo paralelo.22. grados y vn tercio. Luego del Meridiano de la demarcacion, al Meridiano de la isla de Tenerife, son 30 grados y vn tercio de longitud: y del Meridiano de Tenerife al Meridiano que passa por la boca de la barra de Lisboa, aura 6. grados, 10. minutos. Luego del Meridiano que passa por la barra de Lisboa al de la demarcación, ay 36. grados, 30. minutos: y del Meridiano que passa por la barra de Sanlucar al de la demarcacion, ay 39. grados.

De suerte, que està sabida la longitud que ay entre el Meridiano de la demarcacion y el de Lisboa, y tambien al de Sanlucar: porque como queda demostrado en los capitulos de atras, la linea, b l, es el Meridiano que passa por la barra de Lisboa, y la linea, a d, el Meridiano que passa por Tenerise: y si se tirare otra linea por el punto, h, que suere paralela de, a d, suera el Meridiano de la isla de San Anton; y como todos estos Meridianos van de Norte Sur, cortan a la Equinocial en angulos rectos, y lo mismo a todos los paralelos de la Equinocial. Luego, a b, sera la longitud que ay entre Tenerise y Lisboa. Pues conocidos los grados que tiene, a b,

fe fabra las leguas que contiene en el paralelo de 38.grados, 40. minutos, porque en este paralelo cada grado vale 46.minutos, 71. segundos de Equinocial, como se hallarà en la tabla que para esto se ha puesto atras, la qual enseñaremos como se haze. Pues restemos 46 minutos, 51. fegundos, de 60 minutos, y quedaran 13 minutos, 9. segundos, y esto es menos cada grado del paralelo, ab, que el grado de la Equinocial. Pues multipliquemos. 6. grados,10. minutos que vale, a b, por 13. minutos, 9. segundos, que es lo que es menos cada grado destos, que no losde la Equinocial:y sera el producto,1.grado,21.mi nuto, s. segundos, que restados de 6. grados, 10. minutos, quedan 4.grados, 48.minut.55.segundos, y tantos grados de Equinocial valen los 6 grados, 10 minutos del paralelo, a b, que reduzidos a leguas de a 17 leguas y me dia cada grado, son 84. leguas: y tantas ay del punto, a, al punto, b. pero si lo midiera el Piloto en su Carta, hallara 108.leguas. De manera, que fila nao partiera del punto a, al punto, b, por el paralelo, a b, anduuiera menos 24.leguas que el Piloto echaua de cuenta, y assi llegara mas presto al punto, b, que el Piloto con el punto en la carta. Pues sabido que el lado, a b, es 84 leguas, y el lado, a c. 108. se sabra las leguas que tiene, b c, que es lo que ay de camino de Lisboa a la Madera. El triangulo, a b c, es re-Ctangulo: luego el quadrado de, b c, que se opone al angulo recto, vale tanto como los quadrados, a b, a c: y fiendo estos conocidos, tambien lo seran sus quadrados; los quales juntos, se sacara dellos la rayz quadrada, y esta serà el lado, b c, que sera 136. leguas y media, y tanto aura de camino de Lisboa a la isla de la Madera: pero por la cuenta de los Pilotos vienen a ser 152. leguas:por lo qual la nao anda fiempre menos leguas que el Piloto con fu punto en la carta. Esta diferencia entre lo que camina la nao, y el punto en la carta, es mas sensible quanto mas aparta-

131

apartados nauegaren de la Equinocial, que en la Equinocial no es ninguna.

CAP.V. En que se muestra la tongitud del Cabo de Buena Esperança.

OMO Los Castellanos no nauegan por la parte Oriental, auremos de seguir los derroteros y viajes de los Portuguesses, y entre todos elegiremos principalmete, vno q hizo vn

fidalgo llamado don luan de Castro, que sue dos vezes a la India, y el viaje que hizo el año de 1538. escriuio vn derrotero, contando cada dia desde que salio de Lisboa, hasta que llegò a la India, la derrota que lleuaua, y la altura en que se hallaua, conformandose en las alturas del Sol con el Piloto mayor, y con otra personaque yua en su nauio, a quie elllama el Doctor. Muestra en sus operaciones y discurso, que no solo era Marinero, pero Matematico, y dicipulo del Doctor Pedro Nuñez, de cuya mano lleuaua vn instrumento con que tomaua la altura a toda hora, y tambien la variacion de la aguja. El muestra ser bien curioso, por el cuydado y diligencia que siepre tenia en hazer sus operaciones. Quando llega con lu viaje al Cabo de Buena Esperança ; haze vna digression, en donde por losucedido en el viaje, pretende prouar, que el Cabo de Buena Esperança està mas Occidental, que lo que le ponen las Cartas, y porque haze a nueltro proposito lo que alli dize, lo pondre aqui por las mismas palabras que el habla.

Cousa he muyto manifesta, que atee sermos conterra do Cabo de Boa Esperança, jamas a proa de nosas naos vay sora de aqueles rumos que jaz en de Leste das Agulhas, atee o rumo do Sul por onde caminhando con ventos frios e tendentes;

dentes, que o Norte de nossas Agulhas indo cada vez fazendo mayores mudanças, para parte do Nordeste atee a cantidade de 20. graos, que valen pouco menos de dous quartas, e desde aby tornando dar a volta, e desandar o caminho pella mesma manera e graos que atee aqui forão sobindo. Quando chegamos a ponta primeyra da terra do natal fican as Agulhas fixas, ferindo verdadeyra e dereytamente nos verdadeyros polos do mundo. Orapoys todo o tem po que caminharmos por esta quarta parte de toda a circunferença da Agulha,a qual comprehende os rumos sobre ditos, partindo da costa do Brasil para o cabo de Boa Esperança. Quem duuidara que os pontos que os Pilotos vão pondo en suas Cartas, serem todos muyto mas dianteros è Orientaes por muytas legoas do que em verdade se deue fazer per reção do caminho que himos fazedo. Poys q gouernando a Les Sueste, na paragem que as Agulhas Nordesteao 15.e 20.graos achando hun grao na mudança da altura, contamos 46 legoas a singradura, e 42. na deferença dos Meridianos, sendo notorio, q o tal caminho foy quasi ao Sues te, por onde o grao vale 24. legoas e tres quartos, e a de fereça dos Meridianos 17. legoas e media. E assi mesmo leuado aproaa Leste quarta do Sueste, multiplicado na altura, hu grao, cotamos na singradura 90. legoas, e 88. na distaça dos Meridianos, não nos recatando qo tal caminho q fazemos for por amtre a mea partida de Les Sueste, e a quarta de Les te, qestà apar do Sul, por omde o grao vale muyto menos de 46. legoas, e o apartameto dos Meridianos não chega a 40. Estes enganos nos acompanhao todo tempo q caminhamos por dentro desta quartaparte da circunferenca de Agulha. Por omde caminhando tantos dias, e tantas noites, leuando en cada singradura erro tam notauel, causada da sobeja e não conhecida variaçam das Agulhas, faz que quãdo se ven a sentar estas terras no plano; pol las relazões e roteyros dos Pilotos, e nauegantes, he necessario meter a costa

do Cabo de Boa Esperança grandes espaços pollo Oriente a cima, e sicar entre ella e a costa do Brasil, tam comprida e disforme distança, como a o presente mostra en todos os planos: e de aqui vem, que fazendo as (artas este caminho tam comprido, considerando os Pilotos como imdo con suas jornadas contadas, fazendo se muyto arree do Cabo, se achao con ele ou auante, não atinado a causa donde lhe procede. (Tápoco la entendio el don luan de Castro) fazendo regra geral, a qual dão a cada huã das singraduras muytas mas

legoas do que o Solerumo lhes insina.

Esta operazao ou Nordestear, que fazen as Agulhas, partindo de Lisboa, acabao nesta ponta primeyra da terra do Natal, como ja tenho dito: mas passando por diante, caminhando para onde nace o Sol, começa a se hir fazendo outra que faz os efeytos contrayros, como querque passando daqui imdo rotabatida caminho da India, as Aguthas que en este lugar eran sixas, cemenção pouco a pouco a desuiarem o seu Norte, e frol de Lis do verdade yro poto para a banda do Noroeste, hasta chegar mas a costa da Imdia, onde varião ou Noroestão 11. graos, que valen hua quarta: e como eutodo este tempo e caminho que na viagem gastamos, leuamos a proa da nao na queles rumos que se contem dentro da quar ta parte de toda a circunferença da agulha, que comença do Norte, e acaba na linha de Leste, he necessario que en mu dança de un grao, por qualquer destes rumos que seja, por onde gouernamos, teremos andado menos caminho do que orumo para onde a proa de nosanao vay abiadanos demostra. Porque assi como quando a agulha nos Nordesteaua os rumos ordenados a esta ditaquarta, forçados de tal variacam, erao lançados fora de sus propios lugares, e hiao a ocupar outros estranhos a o verdade yro Leste mas chegados.

Assi aora esta variaçam he a contrayro, e totalmente cotraposta a outra, os mesmos rumos son tirados fora de suas casas e lugares, constituidos por caso de tal variaçam, e mu-

dança, e vão tomar outros mais chegados a o Polo do mundo , tanto espaço quanto he a cantidade que nas taes partes bachamos que as Agulhas Nordesteao: logo gouernando a o Nordeste na paragen questa variaçam vaie 11. graos, ou hua quarta, que he o mesmo, sen nenhua duuida faremos o caminho do Nordeste quarta do Norte : e assi gouernando a o Nordeste quarta de Leste, sicaremos fazendo o caminho do Nordeste franco: e po lo consiguiente nos acontecera o mesmo, leuando a proa por qualesquer dos outros rumos, que se conten nesta quarta parte de toda a circunferença da agulha: pe lo que fica claro, que todo este caminho que sazemos da ponta primeyra, atee as prayas da Imdia, damos mayores singraduras a nao, do que en verdade ela anda. E da quy vem, que estendido tanto este caminho, de necessidade no assentar das terras, ha deferença dos Neridianos a de ser mayor do que tem os lugares por muytos graos.

Despues de auer hecho este discurso por las razones que ha dicho, quiere concluyr que el Cabo de Buena Est perança està puesto en las Cartas, muy grande espacio a la parte del Oriente de lo que ha de estar, y va prosiguie do su argumento, y dize.

Nao deue nesta parte de ter menos authoridade que a demostração, a longa e contina esperiencia que de tantos têpos para aca atemos do comprimento deste caminho, especial mente datrauessa que ha da costa do Brasil, atee o cabo de Boa Esperança, a qual pode asirmar toda pessoa que por la passar, e tiuer onesto juyzo, e algua pratica do mar, que he mas pequena do que a faze todas as cartas de marear, mais de cento e cincuenta leguas, e a razon para isto ser assihe esta.

Tanto que a nosas naos se põem en a altura do Cabo Frio,

Frio, e començão a poer aproa caminho do Cabo de Boa Efperanca, na mesma hora se començão de armar os Pilotos para daren mayores singraduras a nao, do que por sua estimatiua soen, e o rumo por onde vão caminhando achão. E certamente que na minha nao oue muytas singraduras de 70. e 80. legoas, sin interuir para isto outra considerazão, saluo ventos un poco frescos, e nauegarmos por esta paragem, con os quaes en todo outro mar que não for este,não era justo darmos a cada hua das singraduras 40 legoas, porque esta jaa assentado por maxima nos mareantes, que neste caminho se han de contar mays legoas en cada hun dia natural, do que hacharen que a nao podia andar por qualquier via que fose. Ora poys, sinos vemos que de tantos annos a esta parte, atee o dia de oje, que este mar he tao laurado dos Portuguesses, e sempre jamays acontece hacharense as naos no Cabo de Boa Esperança, ou auante dele, fazendose os Pilotos muyto aree con seus pontos, e imdo contando en cada singradura muytas mas legoas do que eles mesmos saben, e creen que a nao pode andar. Que pode isto causar, se não ser este caminho. muyto mays pequeno do que esta posto nas cartas de marear. Oos exemplos que neste caso posso dar, son tantos quantos são as armadas que por aqui passão, pe lo que somente escriuirey de hu soo.

En hua armada que forge de Nelo veo por Capitao moor, aconteceo, que fazendose todos os Pilotos na ensenada de Neconicongo, hacharao hu nauio de Mozambique, que le disse estarem de dentro do Cabo das Correntes. Nao ha dunida que se não fossem os muytos sinaes de aues, pexes, heruas; e outras supersluydades que as terras, e mares produzen, os quaes nos aparecen quando somos tanto auante como o Cabo de Boa Esperança, que todos os Pilotos ficarião enganados en grande caminho, e jamays se farião con ho Cabo que 200. legoas, senão hachassen

auante, con tanto que den o caminho a nao conforme a altura que tomão, e rumo a que gouernão, o que ven destas duas costas do Brasil, e Cabo de Boa Esperança estarem

mays apartadas nas (artas.

A segunda vez que torney a Imdia, que soy o anno de 1545. estando tanto auante con o Cabo, mandey preguntar a Diego Garcia Piloto da Burgalessa, onde se sazia, mandoume dizer, que 155, legoas aree do Cabo: y esto era hu dia a tarde, que tomamos as vellas, e soramos de mar en traues, por nos dar hun pouco de leuante, e otro dia amanhecendo vimos o rostro do Cabo, estauamos ja dentro dele, o qual Diego Garcia he aora muyto antiguo Piloto, e experimentado nesta tarrera.

Esto mismo que dize que respondio Diego Garcia, ohi dezir en Portugal, delante el serenissimo Cardenal Archiduque Alberto, a Vicente Rodriguez Piloto, que auia hecho catorze viases a la India: y lo mismo dixo otro Piloto que se dezia luan Rodriguez, tambien Pilo-

to muy diligente.

A quien no considerare otra cosa mas delo que dize don Iuan de Castro en este discurso, le persuadirà lo que pretende prouar: pero cierto que holguè mucho quando encontrè con su derrotero, porque en todos los derroteros Portuguesses, no auia hallado orden por donde pudiesse assentar el Cabo de Buena Esperança en su verdadero lugar, mas del que comunmente se trae en las cartas de marear que hazen en Portugal, en las quales està puesto treynta y cinco grados distante del Meridiano de Lisboa. Pero porque esta situacion se tiene por sos pero los portuguesses han andado siempre con intencion de entrar las Molucas en su demarcacion, no dexaua de hallarme algo perplexo

134 en lo que auia de hazer : que aunque tenia las observaciones de vn Eclypse que se obseruò en Goa, y en Mozambique, como adelante diremos; y por este se sabe la longitud entre Goa y Mozambique, y la ciudad de Toledo: pero es de importancia assentar en su lugar el Cabo de Buena Esperança, para que se entienda el acortamiento que hizieron los Portuguesses en todo el viaje de la India, y de como le hizieron, y para que las costas y puertos de mar se pongan en sus verdaderos lugares. Pues por las mismas razones que don luan de Castro quiere prouar, que el Cabo de Buena Esperança ha de estar mas llegado al Occidente, de lo que le ponen las cartas de marear, por essas mismas demostraremos, que ha de estar mas llegado al Oriente de lo que le ponen las cartas Portuguessas irempos obienada, como lo discidas que guessas ana

Para que esto se entienda, se ha de traera la memoria, lo que se demostrò en el capitulo segundo y tercero, que si las naos caminaren por paralelo, o por otro qualquierarumbo, como no sea por la Equinocial, o Meridiano, llegan antes al puerto, que no el Piloto con supunto en la carta. Pues esto assi entendido, vamos con la nauegacion que hazen los Portuguesses, patiendo de la barra de Lisboa para la India, el qual viaje hazen, gouernando lo mas ordinario, Norte Sur, hasta que se ponen en treynta y cinco grados de altura a la parte Austral, y de alli tomansu derrota de Leste Oeste, hasta ponerse en el Cabo de Buena Esperança, que está en 34.

grados, 30 minutos ibani y soburio 8 non seurel .

Dize don Iuan de Castro, que estando en el Meridiano que passa por el Cabo de San Vicente, en altura de treynta grados a la parte Austral, començaron su derrota al Sueste, y siempre inclinandose al Leste hasta que estuniero en treynta y cinco grados, Norte Sur co las islas

Z 2

de Tristan de Acuña, y desde alli gouernaron siempre al Leste, hastallegar al Cabo de Buena Esperança: y dize, que en la derrota que ay del Meridiano que passa por el Cabo deSan Vicente, hasta el Cabo de Buena Esperança, que huuo de diferécia 155. leguas, aunque otros han hallado 200.y otros 150.leguas, y otros algo mas y menos. Pues de aqui quiere inferir don luan de Castro, que el Cabo de Buena Esperança està mas Occidental, que no le ponen las cartas de marear: pero si el entendiera la fabrica de las cartas de nauegar, por las razones, y exemplos de nauegacion que ha puesto; le huuiera de poner mas Oriental de lo que le ponen las cartas ATTOM STREET, STORY OF THE STATE

de nauegar.

Porque los Pilotos no dieron mas leguas de las que anduuo la nao, segun su cuenta y estimatiua, y està por muchos tiempos observada, como lo dize don luan de Castro, y como tengo dicho yolo he oydo alos Pilotos Portuguesses: luego en la derrota que ay del Meridiano que passa por el Cabo de SanVicente en treynta y cinco gados de altura,a la parte Austral, hasta el Cabo de Buena Esperança, llegò antes la nao al Cabo, que el Piloto con su punto en la carta, con 150.leguas. Luego por lo que se demostrò en el segundo y tercero capitulo, estas 150. leguas està mas estendido el paralelo de treynta y cinco grados en la carta, que no la distancia que ay entre los dos Meridianos, el vno que passa por el Cabo de San Vicente, el otro por el Cabo de Buena Esperança. Pues reduzidas a grados las 150. leguas, son 8. grados y medio, y en tanto excede la longitud que ay entre los dos Meridianos dichos, contadapor la Equinocial, a los grados de longitud, entre los mesmos Meridianos, contada por el paralelo de treynta y cinco grados:porque en la carta de nauegar la misma distancia ay entre dos Meridianos, contada por paralelo,

paralelo, que contada por la Equinocial, como està dicho.

Pues hagamos la cuenta, que tantos grados de Equinocial son menester para que excedan a otros tantos grados del paralelo de 35. grados, en ocho grados y medio:y para mas justificacion no pongamos que las leguas sean 150. sino 140. porque en esto concuerda la mayor parte; y tambien porque toda la derrota no fue por el paralelo de 35 grados, y alsi me parecio concordar con la opinion que pone menos leguas, por entender ser la que mas se llega a la verdad. De suerte que segun esto, fera la diferencia ocho grados: a cada grado del paralelo de 35. grados, le responden 49. minutos, 9. segundos de Equinocial: de manera que cada grado del paralelo de 35.grados, es menor que el grado de la Equinocial 10.minutos, 51. segundos. Puesformemos vna regla de proporcion, diziendo . Si 10. minutos. 51. segundos, me vienen de vn grado ocho grados de quantos grados me vendran: y siguiendo la regla de proporcion hallaremos, que los ocho grados vienen de 44. grados 14. minutos. De donde se sigue, que caminando la nao por paralelo de 35. grados, y partiendo del Meridiano que passa por el Cabo de San Vicente, y llegando al Cabo de Buena Esperança, antes que el Piloto con el punto en su carta, por 140. leguas, aura entre los dos dichos Meridianos,44.grados.14.minutos de longitud. El Meridiano que passa por el Cabo de San Vicente, casi es el mismo que passa por Lisboa, y assi diremos, que entre Lisboa y el Cabo de Buena Esperança, ay 44. grados. 14 minu. tos de longitud, que son mas de 9. grados lo que el Cabo de Buena Esperança ha de estar mas al Oriente, que no lo que ordinariamente traen las Cartas Portuguessas. Pues por las mismas razones que don Iuan de Castro pretende prouar que el Cabo de Buena Esperança ha de

estar mas al Occidente de lo que le poné las Cartas, por estas mismas tego demostrado claramete, auer de estar más al Oriete. Don lua de Castro se engaño, por no entender la fabrica de la carta de nauegar, y no es marauilla, pues tampoco la entendio su maestro Pedro Nunez, segun que consta de su libro de nauegació. Al don Juan de Castro le parecio, que porque la nao llegaua mas presto al Cabo, que no el Piloto con el punto en la Carta, que por esto el Cabo auía de estar mas llegado al Occidete,

siendo al contrario, como se ha demostrado.

Porque es de importancia entender bien este punto, para los que no son muy Matematicos, lo quiero poner en pratica, en la figura que queda atras, donde se demostrò la fabrica de la Carta. Descriuase el Meridiano, K. M, que passe por el Cabo de San Vicente; y el Meridiano V T, que passe por el Cabo de Buena Esperança. Tirese el paralelo, NP, que passe por 35. grados de latitud, y cortarà a los Meridianos, KM, VT, en los puntos, QR, luego fera, QR, la longitud que ay entre el Meridiano que passa por el Cabo de San Vicente, y el Meridiano del Ca bo de Buena Esperança, contada en la Equinocial. Pero la distancia de leguas que ay entre, QR, no estanta como corresponde a los grados de longitud de Equinocial, que ay entre los dos Meridianos; la qual longitud es ygual de, QR. Pues partiendo la não del punto, Q. para el punto, R, va caminando por la circunferencia de la agua, y lo que camina la não lo va contando el Piloto por la linea, Q R, la qual es mayor que la distancia que camina la nao:por lo qual,quando la nao llega al punto,R, la cuenta que lleua el Piloto con fus puntos, no ha llegado al punto, R, sino queda mas atras.

En este paralelo, y en esta distancia, segun dize don Iuan de Castro, y todos los Portuguesses, que el punto del Piloto està 150 leguas mas atras, que pongo sea en el

punto

punto, Y; luego sera, Q Y, lo que realmente caminò la nao por la circunferencia del agua : y la distancia, Y R, lo que el punto del Piloto quedò trassero, quando llegò la nao al Cabo de Buena Esperança. Pues teniendo conocida por observacion, la cantidad, Y R, en el paralelo de 35. grados, conocerse ha la cantidad, Q R; por la orden que atrasse ha hecho; y quedarà conocida la longitud que ay entre los dos Meridianos, K M, V T, que es lo que se pretende.

De aqui viene, que los Portuguesses hazen mas corta la costa que ay del cabo de las Palmas, hasta el rio de Camarones, los nueue grados que el Cabo de Buena Esperança ha de estar mas al Oriente de lo que le ponen en

sus cartas de nauegar.

En toda la costa de Africa, que ay del estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de las Palmas, no se muda nada de como lo traen las cartas Portuguessas, porque los Castellanos lo hallan assi, sin que en esso aya discrepancia.

C A P.VI. Enque se pone la descripcion del Cabo de Buena Esperança, hasta la India, segun longitud.

guesses nauegan este viaje de la India Oriental, y que residen en ella, no se ha podido saber que tengan hecho observaciones de Eclypses de Luna, que es el camino mas cierto para saber las longitudines de lastierras, y si los han observado los callan. Pero por los que se han observado en España, y en las Indias de Castilla, por orden y mandado de los Reyes

Indias de Castilla, por orden y mandado de los Reyes (como se dira adelante) se sabe la longitud que ay de Toledo hasta las Filipinas, contada por la parte Occidetal: luego el restante a cumplimiento de toda la circunferencia de la tierra, serà la longitud de Toledo a las Fi-

Z 4 lipinas

lipinas por la parte Oriental. Pues concordando las nauegaciones, y relaciones qué de la parte Oriental se hallan, se pondran sus longitudines, no alterando lo que co observacion de Eclypses, y verdaderas relaciones se tie-

ne hallado por las nauegaciones Occidentales.

Elaño de 1588. Iuan Bautista Becheti vn cauallero Flo rentin, viniendo en las naos de la India de Portugal, obferuò vn Eclypse de la Luna, que acontecio en doze de Março, y dize, que fue el principio del Eclyple a las 16. horas y un quarto, estando en altura de 24 grados, junto al Cabo de Corrientes. Este mismo Eclypse se obserud en Lisboa, por el Doctor Sobrino Capella del Rey, y fue su principio alas onze horas y 56. minutos, de suerte que huuo de diferencia de tiempo, entre el vn principio y elotro, quatro horas y vn tercio, que reduzidas a grados son 65. grados, y tantos ay de longitud entre Lisboa y el Cabo de Corrientes. Pues desde el Cabo de Corrientesa Mozambique, comunmente se ponen en las Cartas antiguas, 7. grados de longitud, y casi salen los milmos, si se hiziere la cuenta de la diferencia de latitud y del rumbo que se nauega del vno para el otro: por lo qual aura de Lisboa a Mozambique, 72. grados de longitud. Pues si destos se restassen quatro grados y medio, q ay de longitud entre Toledo y Lisboa, quedaran 67. grados y medio de longitud, entre Toledo y Mozambique. Resta de aueriguar la longitud entre Mozambique y Goa, para lo qualfe han de buscar relaciones de personas definteressadas, que en esta parte lo seran, los que no fueren Castellanos, ni Portuguesses, siendo las tales personas conocidas, y que en esta parte tienen credito.

Iacobo Castaldo Cosmografo Veneciano, pone en su Mapa vniuersal quarenta y dos grados y medio de longitud, entre Goa y Mozambique; lo qual dize lo hizo por relaciones de los que nauegan el mar Bermejo, y van

Tenia-

a la India por la Especeria. Iodoco Hondio Cosmografo Flamenco, en vn Mapa vniuersal que en este riempo se ha estampado, pone de longitud entre Goa y Mozãbique, 43. grados de longitud. Sebastian Caboto de nacion Ingles, Piloto bien conocido, en vn Mapaque dio al Rey de Castilla, pone la misma longitud. Sebaițiă del Cano que traxo la não Vitoria delde las Molucas a España, por el viaje que hazen los Portuguesses, pone la misma longitud, segun que lo tiene firmado de su nombre en el parecer que dio acerca deste particular, el año de 1524.en Badajoz. Esta misma longitud està puesta en vn libro antiguo de carras de nauegar, que fue hecho en Portugal para el Infante don Duarte de Portugal. Otros muchos Cosmografos ponen esta misma longitud, que por euitar prolixidad no los pongo. Concuerda con esto que se ha dicho, lo que dize Prolomeo en su Geografia, que pone el Promontorio prasso, que es lo que aora llaman Mozambique, 80 grados de longitud de 1as Canarias: de los quales 80. grados restados 11. grados, q ay de Toledo a ellas, quedan 69, grados de longitudentre Toledo y Mozambique, que casi sale lo mismo que por las otras vias se ha hallado. Que el Promontorio prasso sea Mozambique no ay que poner duda, porque en longitu y latitud, y en las demas señas concuerda con lo que dize Ptolomeo: y la isla de san Lorenço es la que Ptolomeo llama Menuchias, y le pone 85 grados de longitud, con doze grados de latitud Austral: y al Promontorio prasso le pone 15. grados de latitud Austral, que es lo que aora se halla: est sobere en mol obseren pupe a

Pues sabido que entre Toledo y Mozambique ay 67. grados y medio de longitud, si a esto añadimos 4.grados, 40.minutos que ay de longitud entre Toledo y el Cabo de San Vicente, seran 72.grados, 10. minutos de longitud entre el Cabo de Sa Vicente y Mozambique.

Teniamos que entre el Cabo de San Vicente, y el Cabo de Buena Esperança auia 44. grados, 14. minutos de lógitud: luego si restaremos la longitud que ay entre Toledo y el Cabo de Buena Esperança, de la longitud que ay entre Toledo y Mozambique, quedarán 27. grados y 56. minutos de longitud, entre el Cabo de Buena Esperança y Mozambique. Casi pone otros tantos lacobo Castaldo.

De suerte, que por las observaciones que han hecho los Portuguesses, tenemos averiguado las longitudines de los puntos principales, que ay de la barra de Lisboa hasta Goa. Resta de averiguar, la longitud que ay entre el Cabo de Comori y Malaca, la qual no ay otra orden de poderla saber, sino por las navegaciones de los Por-

tuguesses.

Parece que por lo que dizen algunos derroteros, y cartas, hechas en la India, que las descripciones que comunmente traen los Portuguesses en las cartas quese hazen en Portugal, que de industria estan hechas con el acortamiento que en todo este viaje hizieron, con la intencion que se ha dicho. Pues entre los demas derroterosque ponen las leguas que ay en el viaje que se haze de Comori a Malaca, es vno que hizo Pedro Vaz Fragosonatural de Biana en Portugal : el qual dize, que anduuo muchas vezes aquella derrota con las armadas de Portugal, y halla, que de las islas que estan Norte Sur co la punta mas Septentrional de Zamatra, hastallegar a la costa mas Oriental de Ceylan, que ay 200. leguas, que por aquel paralelo son 12. grados de longitud:y de la cos ta mas Oriental de Ceylan hasta Cabo de Comori, ay feys grados de longitud, como ordinariamente fe delcriue en las cartas. De la púta mas Septentrional de Zamatra a la isla de Gamispola, que està en el mismo paralelo, ay casi vn grado: luego del Cabo de Comori a Gamispola,

mispola, ay 19. grados de longitud. De Gamispola por el paralelo en que ella està hasta la costa de Malaca, ay seys grados largos de longitud, segun que comunmente se pone en las cartas de nauegar. Pues de la costa de Malaca, donde la corta el paralelo de Gamispola a Malaca, ay en las cartas y padrones de Portugal, mas de dos grados: de manera que viene a auer de Gamispola hasta Malaca,ocho grados y medio de longitud; y esto concuerda con lo que dize Pedro Vaz Fragoso, que pone mas de 100.leguas de las islas de Nicouar (que estan Norte Sur con Gamispola) hasta la costa de Malaca, contadas por el milmo paralelo. Esta milma distancia està en una carta hecha en la India, que estos años passados traxo de la India vn cauallero que se dize don luan de Mendoça. Ptolomeo pone en su Geografia, que la Aurea Chersoneso(que todos dizen sin ninguna contradicion que es Malaca) que tiene de longitud 160. grados, contados de las Canarias. Y segun el mismo Prolomeo (como se ha dicho) Cabo de Comori tiene 126. grados de longitud, de las mismas Fortunadas, que restada la mayor longitud de la menor, quedan 34. grados de longitud entre Cabo de Comori, y Malaca, que son mas de seys grados mas de lo que aqui hallamos, por las relaciones de los Portuguesses, que bien se puede creer que antes acortan el camino, que no le alargan, pues van siempre con la intencion que se ha dicho,

Puestos estos puntos principales en sus verdaderas longitudines, por las razones que auemos dicho, las quales longitudines concuerdan por la mayor parte, con las que Ptolomeo pone en su Geografia, y antes son meno-

resque no las de Ptolomeo.

Los puertos, bahias, bancos, baxos, calas, islas, y otras particularidades, fe descriuieron conforme las ponen las cartas Portuguessas, sin que aya variación en las latitudines,

titudines, porque estas no se pueden mudar de como las

tiene la comun opinion de los que nauegan. es obliganq

Podria dezir alguno, que las costas de Africa que está junto al Cabo de Buena Esperança, que estan muy distantes la vna de la otra: a esto respondo, que lo causan dos cosas: La vna es el encortamiento que hizieron los Portuguesses en aquella parte. La otra, que como el Cabo de Buena Esperança está en 34. grados y medio apartado de la Equinocial, de necessidad en la carta de nauegar se ha de abrir mas aquella distancia, de lo que está en la superficie redonda del globo de la tierra, como se dixo en el segundo y tercero capitulo. Pero todo lo demas de la India no corre, ni ha lugar lo que se demostro en aquellos capitulos, por estar toda ella tan llegada a la Equinocial, ni es sensible cosa lo que se estiende mas del natural, para que dexe de estar en su verdadera postura, casi como si fuera en superficie redonda.

Ha se de aduertir, que en las rablas de Ptolomeo estan erradas las longitudines de muchos lugares, como se halla en la longitud del Cabo de Guardas u. Pone Ptolomeo al Promontorio prasso, so grados de longitud: y al Cabo de Guardas u. 88. grados, lo qual no puede ser; porque por las nauegaciones que hazen los Portugues ses, hallan que ay entre el vno y el otro 18. grados. Pues por lo que queda dicho, el Promontorio prasso, se se Mozambique, tiene los 80. grados de longitud: luego tendra el Cabo de Guardas u., 98. grados, y no 88. de longitud, como po-

ne Ptolomeo.

De otras longitudines de pueblos del mar Bermejo fe aueriguarà lo mismo. Luys Gorje, natural de Lisboa, en vna descripcion que tiene hecha del Cabo de Buena Esperança al Cabo de Guardafu, pone mas de 47. grados de longitud: y del Meridiano de las Canarias al Cabo de Buena Esperança, ay 52. grados, segun que se

ha

8.30. 27.30.

ha demostrado, y se halla en los Mapas antiguos. Luego de las Canarias al Cabo de Guardasu, ay de longitud 98. grados. Hizo Luys Iorge esta descripcion por derro teros de Pilotos Portuguesses, de los mas diestros que andan en aquella Carrera.

Pedro Plancio Fiamenco, pone en vn Mapa general, hecho los años atras, del Cabo de Buena Esperança

al Cabo de Guardafu, 48. grados.

Siguese vna tabla donde se ponen las longitudines que ay de vnas partes a otras, desde el Meridiano de la Demarcacion hasta Malaca.

	Gr. Min.
De la linea de la Demarcacion hasta la isla de	
San Anton, seing with the deciment of the sand	22. 20.
De San Anton a Tenerife,	
De Tenerife al Cabo de San Vicente,	
Del Cabo de San Vicente a Toledo,	4.40.
De Toledo al Cabo de Buena Esperança,	39.34.
De Cabo de Buena Esperança a Mozambique,	27.56.
De Mozambique al Cabo de Guardafu,	19.10.
Del Cabo de Guardafu al Cabo de Rasalgate,	10. 10.
Del Cabo de Rasalgate al Cabo de Comori,	15.40.
II.	153.50.
Pues sumadas las longitudines de vnas partes	-
a otras, que ay del Meridiano de la Demarcacion	
hasta (omori, suman 153 grados, y 50 minutos.	
Del Cano de Comori a Gamiloola	7.0.00
Del Cabo de Comori a Gamispola,	19.00.

Entre Comori, y Nalaca, ay 27. grados, y 30 minutos de longitud. Ptolomeo pone mas de 34. grados: pero como aqui vamos segun las relaciones de los que lo han nauegado, tienese esto por mas cierto, por ser este mar tan trillado con las continuas nauegaciones, y nauegarse con mas arte que

no se hazia en tiempo de Ptolomeo.

De suerte, que sumando la longitud que ay del Meridiano de la Demarcacion, hasta Malaca, suma 181. grad y 20.
minutos: por lo qual todo lo que se cotiene entre los dos Meridianos, el vno que passa por 22. grados y 20. minutos al Occidente de la isla de San Anton, la mas Occidental de las
islas de Cabo verde: el otro, que passa vn grado y 20. minutos mas al Occidente de Oscalaca, pertenece al contrato y
nauegacion de los Portuguesses. Esto se entiende, nauegando de Occidente para Oriente.

CAP. VII. Que trata de la descripcion de la otra mitad de la mar y tierra, en que se contienen las Indias Occidentales.

N La Descripcion de la parte Oriental, auemos discurrido por las nauegaciones que han hecho los Portuguesses, assi porque ellos son los que nauegan estos mares, como porque

no se entienda que en esto ha auido passion, sino voluntad de acertar, y saber la verdad, y cumplir con lo que manda el Rey nuestro señor: que aunque su Magestades señor de lo vno, y de lo otro, pero por lo que conuiene a la seguridad de las nauegaciones, y que los globos y Mapas que de aqui adelante se hizieren, vayan con perfecion, conuiene que esto se haga con la mayor diligencia que ser pudiere. Demas desto es bien, que se se para entre Castilla y Portugal, donde llega el limite de

de cada vno, para que pueda hazer sus nauegaciones y contratos.

Pues assi como en la Descripcion de la India Oriental, se procedio por relaciones de Portuguesses, en la Descripcion de las Indias Occidentales se procederà por relaciones de Castellanos, que con tan continuas nauegaciones tienen aradas essas mares, fuera de que ay para esto, muchas observaciones de Eclypses de la Luna, con las quales se auerigua la longitud de las partes donde se hizieron: y las longitudines de las partes donde no huuiere observacion de Eclypse, se procederà por la distancia de camino que los nauegantes han hallado, tomando las relaciones que fueren mas comunes, y de Pilotos de quien se tiene mas credito: vsando en esto, de todos los medios que mas conuinieren para aueriguacion de la verdad.

Siendo Iuan Lopez de Velasco Cosmografo mayor desu Magestad, en las Indias Occidentales, hizo diligencia, para que en las Indias fe obferuaffen los Eclyp ses de la Luna que aconteciessen; y para esso hizo vna instruccion, del modo que auian de tener en hazer la observacion, y que hechas las observaciones, se embiassen por testimonio, hecho por ante escriuano y susticia del pueblo. Demas desto, que se embiasse la diligencia que en hazer la tal observacion se hizo, pintada en vn papel, para ver si se procedio conforme à la instruccion : porque segun esta observacion se supiesse la hora que començo el Eclypse, y a que hora acabo.

El Consejo Real de las Indias hizo imprimir esta instruccion, y la embiò a los Gouernadores que está en las Indias, y les mandò hiziessen las diligencias que mandaua la instruccion, con mucho cuydado. Lo qual todo se cumplio como yua en la instruccion, y se hizieron las Aa 2

observaciones por los mas diestros que en cada lugar auia, y se embiaron al Consejo Real de las Indias.

Estas observaciones se me entregaron, para que segun la diligencia que se hizo en la observacion, aueriguasse la hora quando començo el Eclypse . Estas mismas diligencias que se hazian en las Indias, se hazian en España de los mismos Eclypses, principalmente en Ma drid, y en Toledo, por el mismo luan Lopez de Velasco, y otraspersonas diligentes. Auiendo visto las vnas y las otras observaciones, auerigue la hora en cada obseruación, quando començo, o acabó el Eclypse. En el fin del libro pondre la instruccion que se dio para que se hiziessen las observaciones, y el modo que tuue en saber la hora de la observacion, segun la instruccion de las obferuaciones:porque en la instruccion q dio Iuan Lopez de Velasco para la observacion del Eclypse, no pone el modo de saber la hora por la tal observacion: y el que segun aquel modo de proceder huviere de saber la hora, procediendo Matematicamete, no ha de auer trabajado poco en Geometria, como se vera en la demostracion, que se haraen su lugar : aora pongamos las obseruacionesde los Eclypses.

Elaño de 1577.en 26. de Setiembre, se observo vn Eclypse de la Luna, el qual acabò en la ciudad de los Angeles en Nueua España, a las 7. horas de la noche, y

mas 36. minutos.

En Toledo acabó este mismo Eclypse, a las doshoras y 12. minutos despues de media noche: observole luanelo,y Alcantara. Es la diferencia 6. horas, y 36. minutos:de suerte, que por la observacion deste Eclypse parece, que entre Toledo y la ciudad de los Angeles, ay 99.grados de longitud.

Este mismo Eclypse obseruò en Madrid Iuan Lopez de Velasco, y acabò segun su observacion, a las dos

horas

horas y 16. minutos, y segun esta observacion viene a estar la ciudad de los Angeles, casi vn grado de mas longitud de Toledo, y en tanta distancia no es elerror sensible: porque entre la observacion de Toledo, y la de Madrid huuo quatro minutos de tiempo de diferencia: y aunque es verdad que Toledo es mas Occidental que Madrid, pero no contanta diferencia; y assientre la observacion de Toledo y Madrid, deuio de auer dos minutos de tiempo de error, los quales no son de mucha consideracion para lo que se va tratando; antes es indicio que los observadores sueron diligentes. En Valladolid acabó a las dos y ocho minutos despues de media noche: observole el Doctor Sobrino. En Seuilla acabó a las dos horas y quatro minutos despues de media noche: observole Rodrigo Zamorano.

No pongo aqui otras observaciones que se hizieron en las Indias, y en España, porque para lo que se va tra-

tando no nos haze al caso.

Este mismo Eclypse se obseruò en San Iuan de Lua, y se acabo a las 7. horas y 50. minutos despues de medio dia: por lo qual, la diferencia de tiempo que ay entre Toledo y San Iuan de Lua, son seys horas y 22.minutos, que reduzidas a grados, son 95.grados y 30.minutos, y tanta es la longitud entre Toledo y San luan de Lua. Teniamos del Meridiano de Toledo al Meridiano de la ciudad de los Angeles, que auia 99 grados de longitud: luego de San Iuan de Lua a la ciudad de los Ange les, ay tres grados y medio de longitud. De la ciudad de los Angeles a la ciudad de Mexico, ay vn grado de longitud, antes mas que menos: lo qualfe sabe por la distancia de camino que ay de la vna a la otra parte, y estar entrambascasi en vn paralelo. Pues siguese destas obseruaciones, que del Meridiano de Toledo al de Mexico, ay 100. grados de longitud.

El año de 1578. en 15. de Setiembre, acontecio otro Eclypse de la Luna, el qual se observo en la ciudad de los Angeles, y acabo a las seys horas y 46. minutos despues

de medio dia.

Este mismo Eclypse obseruò luan Lopez de Velasco en Toledo, y acabò fegun fu obferuacion, a la vna hora y mas 20. minutos, despues de media noche. De manera que entre la vna y la otra observacion ay seys horas y 34 minutos de diferencia de tiempo, que reduzido a grados son 98. grados y medio, que es la longitud que ay entre Toledo y la ciudad de los Angeles, que es medio grado menos de lo q se hallò por la otra obseruacion del Eclypse passado: que como està dicho, en tanta distancia no es error sensible, y el mas diligente obseruador se puede engañar en dos minutos de tiempo, en el acabardel Eclypse, antes es muy gran concordancia entre la observacion del vnaño al otro. De donde se puede inferir sin error ninguno, que entre Toledo y Mexico, ay 100 grados de longitud. Pues si restaremos 11.grados de longitud que ay de Tenerife hasta Toledo, de los 100.grados que ay entre Mexico y Toledo, quedarà la longitud de Tenerife a Mexico, que fera 89.grados: y si destos restaremos 30.grados, 20.minutos, q ay de longitud entre Tenerife y el Meridiano de la demarcacion, quedarán 58. grados, 40. minutos; y tanto aura de longitud entre el Meridiano de la Demarcacion y Mexico.

De Mexico al puerto de la Nauidad, ay cinco grados de longitud, lo quales cosa muy sabida, por las leguas que ay de la vna parte a la otra, y estar casi en vn paralelo.

Desde el puerto de la Nauidad, que està en 20. grados de latitud, hazen los Pilotos al principio sus nauegaciones, a las islas Filipinas: aora salé del puerto de Acapulco,

cafi

casi por vn paralelo, por lo qual ha sido dificultoso de saber con precision, las leguas que ay del puerto de Nauidad a las Filipinas. Pero de algunos años a esta parte ha sido tan cursada aquella carrera, y hazerse el viaje de ida y buelta por diferentes derrotas, que aunque ay diuersos pareceres entre los Pilotos, de las leguas que ay del puerto de la Nauidad a las Filipinas, con todo esto tomando la mas comun opinion, y el medio entre los estremos diferentes, se podra aueriguar las leguas que ay de la vna parte a la otra, sin que en esso aya error sensible. Pues no ay observacion de Eclypse, aurase de proceder por el medio que fuere mas llegado a demostracion: de suerte, que tentando por vias diferentes, si entrambas conuinieren, sera senal que son verdaderas.

De los viajes que se han hecho del puerto de la Nauidad a las Filipinas pondre vno, que me parece se hizo con cuydado, porque se yua con aduertencia de saber la

distancia deste camino.

Lunes a nueue de Iulio, de 1565, el Capitan Felipe de Salzedo, hijo de Miguel Lopez de Legaspi, General de la armada que salio del puerto de la Nauidad para las Filipinas, pidio al Pstoto mayor, y a los demas, que tanteassen el camino que auia desde el puerto de la Nauidad a la isla de Zubu (vna de las Filipinas) conforme a sus cartas de marear: y que tambien se declarassen en la opinion que cada vno tenia, acerca del dicho camino, porque conforme aora se hallasse que se nauegana desde sa dicha isla de Zubu al puerto de la Nauidad, se entendiesse el dicho camino mas verificadamente, y para que mejor relacion se pudiesse hazer a su Magestad.

Luego el Piloto mayor, y los demas, tantearon y midieron por sus cartas de nauegar las leguas que auia. El Piloto mayor dixo auer 1750. leguas: y dixo mas, que conforme a lo que auia andado, segun el punto que auia traydo desde el dicho puerto de la Nauidad, hasta la isla de Zubu, que està en altura de diez grados y medio a la parte del Norte, le pa

recia que auria andado 2000. leguas, poco mas o menos.

El Piloto Rodrigo de Espinosa, dixo auer nauegado 2030. leguas. Francisco de Astigaribia, dixo que hallaua, que desde el puerto de la Nauidad a la isla de Zubu, auia 1750. leguas, empero conforme al punto que auia tray do, hallaua auer nauegado 2000. leguas. Todo lo qual passo ante Asensio de Aguirre, Escriuano de la nao San Pedro, y lo firmaron todos de sus nombres.

En esta armada sueron dos naos, y vn galeoncete, y vn patax, y vn barco.La nao Capitana, Ilamada Sa Pedro, de porte 500. toneladas: el Piloto mayor, Esteuan Rodriguez vezino de Guelba, y por su compañero Pierres Plin Fraces: por Maestre Martin de Ybarra vezino de Bilbao:la nao Almiranta, llamada San Pablo, de porte de 400. toneladas, por Piloto Iuan Martinez Fortun, y Diego Martin de Triana: y Maestre, Iuan Maria. El galeoncete de porte 100 toneladas, llamado San Iuan: el Piloto Rodrigo de Espinosa: el Maestre, Iulian Felipe vezino de Triana. El patax sellamana San Lucas, de porte 40. toneladas; el Piloto, Lope Martin vezino de Ayamonte: el Maestre, Nicolao Griego. En el armada yuan 200. soldados, sin la gente de la mar, q serian, 150. hobres. Era el Capitan general Miguel Lopez de Legazpi:el Mastro de Capo, Mateo del Sauz. Partieron del puerto de la Nauidad,a 21. de Nouiembre, de 1564. De manera, que los Pilotos desta armada se resoluieron, que tomando el camino derecho que ay del puerro de la Nauidad a la isla de Zubu, fon 1850. leguas.

Pues reduziendo estas leguas a grados de a 17. leguas y media cada grado, son 100. grados: pero estos contados por la linea derecha que vadel puerto de la Nauidad a la isla de Zubu, en la carta de nauegar: mas si contaremos por el paralelo que està entre los Meridianos del puerto de la Nauidad, y la isla de Zubu, no son mas de 99. grados. Y porque la derrota que lleuò la nao, no sue siempre por la linea derecha que ay del puerto de la Nauidad a la isla de Zubu, quitaremos vn grado, y quedarán 98. grados, y esta sera la longitud entre el puerto de la Nauidad y la

isla de Zubu.

Del Meridiano de la Demarcacion hasta el puerto de la Nauidad, hallamos que auia 63 grados y 40 minutos de longitud, como se demostrò por los Eclypses: luego del Meridiano de la Demarcacion a la isla de Zubu, ay

161.grados y 40.minutos de longitud.

De la isla de Zubu a Malaca, es derrota muy fabida, assi de los naturales como de los Portuguesses: y en las Cartas hechas en la India, y aun en las que aora hazen en Portugal, se ponen 18. grados y 30. minutos de longitud: luego del Meridiano de la Demarcació a Malaca, ay 180. grados y diez minutos de longitud, contados por la parte Occidental.

Del mismo Meridiano de la Demarcacion, por la parte Oriental, auemos demostrado que ay 181. grados y 20. minutos de longitud: luego segun estas dos maneHydrografia. 14.

ras de contar las longitudines, por la parte Oriental, y Occidental, se excede a toda la la circunferencia de la tierra en vn grado, y mas 30. minutos, lo qual no es error fensible en tan varias observaciones : que aunque estas observaciones fueran hechas todas por Eclypses de Luna, pudiera ser auer mas error. Pues juntaremos los dos excessos, que es vn grado y 20. minutos, por la cuenta q se hizo por la parte Oriental, con 10. minutos, que sue el excesso de los 180 grados, por la cuenta que se hizo por la parte Occidental, y sera vn grado y 30.minutos; que partidos por medio es la mitad 45 minutos. Estos restaremos de los 181. grados y 20. minutos que auia de longitud entre el Meridiano de la Demarcacion y Malaca, por la parte Oriental, y quedaràn 180. grados y 35. minu tos de longitud, entre el Meridiano de la Demarcacion que està en el Occidente, hasta Malaca.

De suerte, que el Meridiano de la Demarcación que passa por 370. leguas mas al Occidente de la isla de San Anton, vna de las de Cabo verde la mas Occidental, dando buelta a la circunferencia de la tierra, passa 35. minutos antes de llegar al Meridiano de Malaca, caminando por el Oriente. De donde se sigue, que Malaca cae dentro de la Demarcación perteneciente al Reyno de Castilla, por 35. minutos: y por el consiguiente todas las islas que ay de alli a la parte Oriental, en que se incluyen las Molucas, Filipinas, China, nueva Guinea, con todas las islas adjacentes, y gran parte de la Zamatra.

Ptolomeo pone mas longitud de las Canarias a Malaca, que fale por las observaciones que aqui se han visto. Pero aunque la autoridad de Ptolomeo es muy grande en lo que hizo por las relaciones de Marino, y otros que en aquellostiempos nauegaron la parte Ories tal, no se le puede dar tanto credito, como a las nauegaciones que aora se hazen: porque las nauegaciones que

fe hazian en tiempo de Ptolomeo, eran muy fin arte, porque ni lleuauan aguja, ni Astrolabio, sino que nauegauan por las costas, y segun los dias que tardauan, echauan de cuenta lo que podrian auer caminado; y como no lleuauan aguja, no caminauan sino quando tentan viento en popa para la parte donde yuan. No lleuando Astrolabio no podian saber las alturas, ni menos las longitudines; mas Ptolomeo como gran Matematico, con las relaciones tan confusas como le dieron, acomodò las longitudines de manera, que no discrepan mucho de las que aora se hallan, las quales estan hechas con la diligencia y arte que se ha visto.

En las partes que eran proximas a la ciudad de Alexandria, que era donde Ptolomeo viuia, bien es de creer que el haria sus observaciones de Eclypses de Luna, y las compararia con otras observaciones de los mismos Eclypses que tendria encomendado en las tierras donde Alexandria tuviesse contratacion, como seria en toda Europa, y principalmente en España, por començar el a contar las longitudines de las islas de Canaria cercanas de España, en la parte Occidental. Assi que todo lo que suere mar Meditarraneo, y partes Septentrionales, en quanto a las longitudines no aura discrepacia sensible de las que pone Ptolomeo, porque todos siguen su opinion, o alomenos varian poco.

Por lo qual en estas partes se seguirà la comun opinion de los Mapas que aora se hazen, guardando las longitudines, y latitudines que poné, y esto sera en la Carta general, que en las particulares por donde se nauega el mar Mediterraneo, y las partes Septentrionales, se lleuara otra orden, en quanto han de seruir para nauegar se por ellas, como se dira en su lugar.

Siguense las longitudines que ay de Toledo hasta Malaca, por la parte de Occidente.

The state of the s
D. C. L. L. M. Gr. Min.
De Toledo a Mexico, ay 100. grados de longitud. 100.
De Toledo a Tenerife. sa sunda flod affect to and temple (11.
Luego de Tenerife a Mexico, ay 89 grados. 89.
De Tenerife a la isla de San Anton, ay 8. grad. 8.
De la isla de San Anton al Meridiano de la De-
marcacion, a to construit a sunagiobic a se cun a 22.20.
Luego de Tenerife al Meridiano de la Demar-
cacion, ay men ner any hacht of the add the affalul colo 30. 20.
Restados estos 30. grados y 20. minut. de 8 g. gra-
dos que ay de Tenerife a Mexico, quedan 58.
grados, y 40.minutos, que ay del Meridiano de
la Demarcacion a Mexico. 58.40.
De Mexico al puerto de la Navidad.
Delpuerto de la Navidad a la isla de Zubu, 98.30.
De la isla de Zubu a Malaca, 18.
Luego del Meridiano de la Demarcacion a Ma-
laca, ay 180 grados, y 10. minutos. 180.10.

En las latitudines no se muda nada de como lo traen las cartas, hechas en cada tierra; ni tampoco en la forma y figura de los puertos, baxos, bancos, islas, y otras menudencias que se ponen en las cartas de nauegar: porque en esto se ha de dar credito a los que continuamente lo nauegan, allende que seria mucho inconueniente, el no poner las cosas en sus latitudines.

Aunque por lo que se ha dicho queda bien provado, la distancia de leguas que ay del puerto de la Navidad a la isla de Zubu, pero para mas confirmacion, quiero poner vn viaje q hallèen vn derrotero de la Filipinas al puerto de la Navidad. El nombre del Piloto que le hizo, no de

dize,

dize, pero conforman las derrotas que dize, con las que comunmente se


Pues dize, que saliendo de la isla de Zubu, vna de las Filipinas, estando en altura de 12. grados, mandò gouernar la buelta del Nordeste, y que sue por esta derrota, 742. leguas, hasta ponerse en altura de 42. grados: y despues sue al Leste quarta al Sueste, 800. leguas, hasta llegar a vista de la costa de Nueua España: y entonces se haliò en altura de 33. grados, y de alli sue al Sueste, corriendo la costa de la Nueua España, hasta ponerse en el paralelo del puerso de la Nauidad, que està en 20. grados de altura, y corrio por esta derrota, 321. leguas. Despues sue al Leste, hasta llegar al puerso de la Nauidad, y anduno 100. leguas.

Pues contadas todas estas leguas por el camino que las anduno, suman 2033, leguas: pero por el camino derecho son muchas menos, co-

mo en la figura siguiente declararemos. With Mand In

Sea la Equinocial, a b:del punto, a, se leuante, a c, perpendicular sobre la Equinocial: tomese, a c, de doze grados, y pongamos en el punto, c, el lugar donde el Piloto comiença a contar su viaje, que es cerca de la issa de Zubu, donde salio el Piloto. Tirese, c d, que es el rumbo del Nordeste por donde nauegô el Piloto, y pongase el punto, d, en 42 grados de altura: tirese, de, de Leste Oeste, y sea 70. leguas: despues se tire, e s, rumbo de Leste quarta al Sueste, hasta que llegue a 33 grados de altura: tresse mas, f g, rumbo de Noroeste Sueste, hasta llegar a 20. grados de altura. Vltimamente se tire, gh, de Oeste Leste, y sea 3, 100. leguas. De manera, que la nauegación que hizo el Piloto, sue del punto, c, al punto, d, por 742. leguas: del punto, d, al punto, e, 70. leguas: del punto, e, al punto, s, 800. leguas: de, s, al punto, g, 321. leguas: del punto, g, al punto, h, 100. leguas.

Pues por estas derrotas, y numero de leguas, aueriguemos la longitud que ay entre la isla de Zubu y el puerto de la Nauidad: y fabida la longitud que ay entre estos dos lugares, se sabran las leguas contadas por sus paralelos. De los puntos donde mudó derrotas, se tiren perpen-



diculares a la Equinocial, que feran los Meridianos de los tales puntos en la carta de marear, y de los tales puntos fe tiren paralelas a la Equino, cial. Acabamos de dezir, que por la derrota que nauego este Piloto, que hallò auer nauegado 2033, leguas, pero si se contaren por camino derecho, como acostumbran los Pilotos, de la isla de Zubu al puerto de la Nauidad, son 1709, leguas. Porque auiendo nauegado por el rumbo ed, hasta el punto, d, sera, e K, el camino derecho, entre los dos Meridianos, e a, dl: y en su tronco de leguas hallan, que, e K, es 525, leguas, y, de, es 70, leguas. Nauegando por el rumbo, es, hallarán en el tronco de leguas, fn, que es el camino derecho entre los dos Meridianos, e m, son que son, se m, son que se el camino derecho entre los dos Meridianos, fo, gq, que es el camino derecho entre los dos Meridianos, fo, gq, que es 228, leguas: y, gh, es 100, leguas, que sumadas todas estas leguas, hazen 1709, leguas: y tantas dira el Piloto que ay de la isla de Zubu al puerto de la Nauidad, contadas por el camino derecho, segun las derrotas que hatraydo.

Diximos atras, que fegun la relacion de los Pilotos que fueron en la armada que lleuô Miguel Lopez de Legazpi, auia del puerto de la Nauidad a la isla de Zubu, 1750. leguas. Por la relacion deste Piloto se hallan, por las derrotas que hizo de la isla de Zubu al puerto de la Nauidad, 2033, leguas. La diferencia entre estos dos viajes, es, que el vno sue por paralelo a la Equinocial, y el otro por derrotas diferentes. Pues de aqui viene auer diuersos pareceres en la distancia de camino que ay de vna parte a otra: y porque es mas cierta la longitud que se halla por derrotas que no sean paralelos, haremos la cuenta deste se

gundo viaje, que es como fe figue.

Saliendo del punto, c, por el Nordeste, c D, tirando, c K, paralela de la Equinocial, hasta el Meridiano, d I, hazese el triangulo rectangulo, cKd, en el qual estan conocidos los angulos con el lado, c d, que son las 742. leguas que nauego el Piloto. Luego conocerse ha el lado, c K, que sera, 525, leguas, de las que, c d, son 742. Pues en el paralelo, c K, las 525. leguas reduziendolas a grados de la Equinocial, hallaremos, que entre el punto, c, y el punto, K, son 30. grados: y porque entre los dos Meridianos, ca, dl, se comprehenden tantos grados en el paralelo, c K, como en la Equinocial, comprehendida entre los mesmos Meridianos, sera treynta grados la parte de Equinocial, al, ygual de, c K. Despues nauegò por el paralelo, de, setenta leguas, segun su cuenta, que son quatro grados, y tanto sera la parte de Equinocial, Im. Tambien siendo, ef, 800. leguas, y estando conocidos los angulos del triangulo rectangulo, enf., se conocera el lado, nf, que sera, 787, leguas de las que, ef, era 800, que reduzidas à grados de Equinocial, son quarenta y cinco grados; y tanto sera la parte de Equinocial, mo, comprehendida entre los Meridianos, e.m, fo.

Tambien siendo, fg, 321. leguas en el triangulo rectangulo, fqp, estan conocidos los angulos: luego conocerse ha el lado, pg, que sera de 227. leguas, q reduzidas a grados de Equinocial, son 13. grados, y otros tantos sera, o q, contenida entre los Meridianos, fo, gq. Vltimaméte dize, o gh, sueron 100. leguas, q reduzidas a grados, son casi 6. grados; y otros

tantos ferà, q b. Pues las partes de Equinocial, a l. m, m o, o, q, q b, que es la longitud que ay entre el Meridiano que passa por la isla de Zubu, y el Meridiano que passa por el puerto de la Nauidad, son casi 98. grados : y tanta longitud diremos que ay entre estos dos lugares. Teniendo por mas cierta esta cuenta que no la otra, que casi se nauega por paralelo, me allegue a esta postrera relacion, aunque la diferencia de longitud entre la vna y la otra es poca, y de la conformidad de entrambas, se puede entender ser esta la verdadera longitud, poco mas o menos, que en distácias tan remotas, no es error sensible vno, ni dos grados de diferencia.

Iuan Lopez de Velasco Cosmografo mayor, y Coronista de las Indias, en la descripcion que haze de la nauegacion de España a las Indias Occidentales, pone estas mismas longitudines, poniendo el Meridiano de la Demarcacion entre Castilla, y Portugal, que passa por la parte

Oriental, por la ciudad de Malaca.

CAP. VIII. En que se pone lo que Pedro Ruyz de Villegas natural de Burgos, y vno de los seys juezes nombrados para la determinación de las diferencias entre Castilla y Portugal, acerca de la longitud de las Molucas.

ESPVES De auer puesto Pedro Ruyz, de Villegas algunos presupuestos, que para tal negocio le parecio eran necessarios, dize assi.

Presuponese mas, que la mayor diligencia q por los Eclypses està hecha hasta aora, que yo sepa, alomenos acerca desto, es la que hizo hazer don Antonio de Mendoca Virrey de Mexico, por la qual se entendio, que Mexico dista 103. grad. de logitud, del Meridiano de Toledo para el Occidente, que no dos ciudades de las señaladas del mundo. Asi Mexico viene a distar de Tenerise, la quartaparte del mundo, que so grad. y Mexico dista de Gilolo, que tiene por el Catigara, donde Ptolomeo acabò su Oriente, otros 90. grados, que se la otra quarta parte del mundo para el Occidete: Pues por el consiguiente, de Tenerise al dicho Gilolo, ha de auer otros 180. grados por la parte Oriental, con quamplen los 360. grados, quanten et oda la circunserecia de la tierra y agua suntos. Pero esto aunque sea assi, no satisfaze a entrambas

trambas las partes, y si satisfaziessen, quedana concluyda la diferencia, y notorio, que las islas de Maluco se incluian con muchos grados en la Demarcacion pertenecion te al Rey de Castilla nuestro senor, y por esso se ha de recurrir a otros medios, por los quales parecera lo mismo.

De los dichos presupuestos se figue, que necessariamente se ha de recurrir a los Itinerarios, y vias por donde se camina, y que angulos, y que cortaduras hazen los caminos con los Meridianos y paralelos por do passariy estos tales caminos tomados de relaciones, y cartas de marcar, por la mayor parte hechas en Portugal, en tiempo que no auia sospecha que se subtraxesse la verdad, para ningú sin: esto concordandolo lo mas proximo y cercano a lo que escriuio Prolomeo, Plinio, Estrabon, Antonio, Pio, y los otros antiguos. Y porque en la verdad, en estas vias de házia donde van, o a que rumbo se corre, se hallan menos diferencias que en otras cosas, entre los marcantes y cartas de nauegar, me parecio tomar esto por principio.

Primeramente pues se ha de presuponer, por donde se ha de echar la linea de la Demarcacion, y la capitulación entre los dos Principes, que son 370 leguas derechas al Occidente, desde las islas de Cabo verde, tomadas, o por grados, o singladuras, y que donde se acabaren, alli se tire

vna linea que vaya de Polo a Polo.

Lo primero pues que se dudò, sue, de qual de las islas de Cabo verde se auian de començar a contar las 370. leguas, y es cosa llana que de la mas Occidental, que es de la de San Anton, y assi se concluyò por razones Iuridicas, y es facil de fundar en derecho. A qualquiera desapassionado le parecera, que para faber quato ay de España a las Canarias, se ha de contar de lo mas Occidental de España para las Canarias, y no de lo mas Oriental della, de manera que en la cuenta se incluyesse el largo de España. Lo mismo para medir lo que ay de España a Italia, que se auia de contar donde se acaba España hâzia Italia, hasta donde comiença Italia: de manera que en la tal cuenta no se auia de incluyr España, ni tampoco Italia, fino folo lo que ay del fin de España halta el principio de Italia, que es lo que ay del termino à Quo, al termino ad Quem. Assipues, auiendose de medir las 370. leguas de las islas de Cabo verde, que es el termino à Quo, ha se de començar de la mas Occidental dellas, hasta donde se cumplen las 370. leguas derechas al Occidente, que es el termino ad Quem: lo qual fundò muy bien el Licenciado Pisa, gran Iurista; y el Licenciado Giron, y los Letrados que alli se hallaron: y siendo necessario, es muy facil de fundar siempre que dello se dude, aunque no pende dello el intento principal tocante a las islas de Maluco.

Luego despues se puede dudar la medida de la legua, para ver hasta donde llegan las 370 leguas, que se han de medir de la isla de San Anto, porque legua es medida moderna, de que los antiguos no supieron, auna

que los mas do cos tienen por cierro ser, parasanga, que se dezia antigua

mente.
Gada legua, segun que las midio el dicho Pedro Ruyz de Villegas, tiene 18000, pies de marco, de los quales, tres hazen vna vara de medir Castellana, y son algo menores estos pies que el Romano: de manera, que 16. destos, hazen 17. Romanos: pero al fin no se puede negar, sino que en esto ay dificultad de liquidar, a satisfacion de las partes, el tamaño de la legua; por que no vnas partes son mayores, y en otras menores, y aun dentro de vn mismo Reyno, y de vna provincia misma. Demas desto, esta medida no se podia hazer assi por mar, como se ha de hazer desde la isla de San Anton: y assi la dicha Capitulacion declaro, que se avian de medir por grados, o singladuras, que es termino de Marineros, segun los quales comunmente está recebido; que por circulo mayor responden, 17. leguas y media a cada grado, y assi se ha de passar con ellas en esto, aunque auria en ello que altercar en savor del derecho de Castilla.

Esto presupuesto, es luego de ver, quantos grados haran las dichas 370. leguas: y por configuiente, quantos grados distarala linea de la De-

marcacion, de la isla de San Anton, derecho al Occidente.

Para lo qual se presupone, que la isla de San Anton (segun todos) está en 18. grados de altura: y assi porque estas leguas se han de medir por el mas derecho camino, que es por circulo mayor, responderan por el dicho paralelo a las 370. leguas, 22. grados y 18. minutos, que son casi un tercio de grado.

Luego tras lo dicho es de ver, quanto dista la dicha isla de San Anton, de lo mas Occidental de España, para que se entienda quanto es mas Occidental la dicha linea de la Demarcacion, que lo mas Occidental de

Efnaña.

Hallase pues, que de la boca del rio Tajo, que es junto a Lisboa, a la isla de la Madera, es derrota muy sabida, y se va al Sudueste derecho: y caminando por este rumbo, baxan de la dicha boca, que està en 39. grados, a la dicha isla, q está en 32. grados de altura, y 7. grados de longitud: y por este rumbo, reduzido al redondo en forma Geometrica, como ha de estar, se desuia 8. grados, 40. minutos de longitud. Y porque esta isla de la Madera està vn poco mas Occidental que no el medio entre Canaria y Tenerife, y el Cabo blanco, y el Cabo verde, lo qual todo està en vn Meridiano, se infiere, que el dicho Cabo blanco, y Cabo verde, estan mas Occidentales que el Cabo de San Vicente, y vltimo de España, 8. grados.

Del dicho Cabo verde, que está en 14. grados, y 30. minutos de altura, se corre a la dicha isla de San Anton, al Oes Noroeste: y la dicha isla de San Anton, está en 18. grados de altura, y 9. grados mas Occidental que Cabo verde. Y assi, porque como auemos dicho, de la dicha isla de S. Anton a la linea de la Demarcacion, ay 22. grados y vn tercio de longitud, se sigue, que està la dicha linea de la Demarcacion, mas Occidental que el Cabo de San Vicente, o boca de Tajo, y postrero de España, 39. grados y vn tercio.

Estose confirma y corrobora, porque de la boca de Tajo, que es Occidental, como el Cabo de San Vicente, a la isla de Mayo, o Buena vista,

se va al Susueste derecho, y el vieto queda Oriental cerca de vn grado. y de alli a San Anton ay cerca de seys grados de longitud. De 39 hasta 14. grados y 20 minutos, se aparta por este rumbo onze grados.

De lo dicho hasta aqui, se puede entender, que la Demarcacion per teneciente a Castilla, llega desde la dicha linea de la Demarcacion, hasta los 180 grados derechos al Occidente, que es la mitad de la bola: y la Demarcación perteneciente a Portugal, desde la dicha linea de la Demar

cacion, hasta los otros 180. grados derechos al Oriente.

Porque la nauegación de la dicha linea de la Demarcación para el Occidere, no es ra fabida ni v fada hafta los dichos grados, ni della ay los dichos Itinerarios que se han de seguir, como los 14 házia el Oriente, se figuen los del Oriente, porque sabido donde llega el mojon, o limite de la vna Demarcacion, se sabra en consequencia cierra y necessaria la de la otra: como quando vn marco divide el termino de los lugares, sabido que en el tal marco acaba el termino del vn lugar, se sabe que de alli comiença el termino del otro lugar. Sabido pues donde fon los 180. grados de la dicha linea de la Demarcación hazia la parte de Oriente, se sabe también que alli son los otros 180. grados de la dicha linea de la Demarcacion hàzia el Occidente.

Por configuiente queda sabido, si tales, o tales islas estamen la Demarcacion perteneciente a Castilla, o si estan en la Demarcacion pertene-

ciente à Portugal,

Diximos pues, que la isla de San Anton está mas Oriental que la linea de la Demarcación, 22. grados y un tercio. Desta isla de San Anton al Cabo de Buena Esperança, se va al Sueste derecho, y queda el Cabo de Buena Esperança dos grados mas Oriental que el rumbo: el qual Cabo de Buena Esperança està en 34. grados, y 30. minutos de altura a la parte del Austro. De manera, que con estos dos grados reduzidos a so verdadero lugar en globo, por reglas de Geometria; y como se entiende de todos, està mas Oriental que la dicha isla de San Anton, 57. grados, y 50. minutos. Siguese de aqui, que dista Lisboa del Cabo de Buena Esperança, 44.grados.

El Cabo de las Agujas està alli cerca un grado y medio, mas Oriental, y en 35. grados y 30. minutos de altura: y assi dista el dicho Cabo de las Agujas de la linea de la Demarcacion, 81. grados, y 40. minutos,

Del Cabo de las Agujas al rio del Infante, se va al Leste quarra al Nondeste, y se baxan dos grados largos, porque esta el dicho rio en menos de 33.grados y 30.minutos de altura, que vienen de longitud, 12.grados y un tercio. Del rio del Infante al Cabo de las Corrientes, que esta en 23. grados de altura al Nordeste derecho, y està mas Oriental onze grados.

Deste Cabo de las Corrientes a Mozambique, que està en 15. grados de altura Austral, se va al Nordeste quarta al Norte, y se aparta 6. grados

de longitud al Oriente.

De Mozambique al Cabo de Guardafu, que está en 12. grados de altura a la parte del Norte, de suerte que disiere en latitud por 27 grados, fe va de Nordeste quarta al Norte: y segun esta derrota, vienca a apartarse por 18. grados de longitud. Esta cuera concuerda con la que se hizo Bb 3 por

por la otra via. De manera, que el Cabo de Guardafu dista de la linea de

la Demarcacion, 129. grados, y alli comiença el mar Bermejo.

Del Cabo de Guardafu al Monte Deli, van al Leste derechamente 25. grados, por cartas hechas en Indias por Portuguesses, y por relaciones verdaderas: y porque desde Melinde, que està en tres grados de altura Austral, y en la misma longitud que Mozambique, suelen engolfarse para Cananor, y Angediua; y se corre a Angediua a Les Nordeste. Está Angediua en 15. grados al Polo Artico.

De manera, que distan en latitud por 18. grados, y nauegando por este rumbo se vienen a apartar en longitud, 46. grados. Pues desta manera se verifica la longitud que se pone de Guardafu a Monte Deli, porque Mõ te Deli y Angediua estan casi en vna longitud. De manera que engolfan-

dose,no solo sale la longitud dicha, pero 3. grados mas.

El Cabo de Comoriestà dos grados mas Oriental que el Monte Deli, de manera, que el Cabo de Comori dista de la linea de la Demarcacion,

por lo menos 136. grados.

Del Cabo de Comori 2 Gamispola, que es vna isla al principio de la Zamatra, se va al Leste derecho, y ay 19. grados y medio: y de allí a Malaca, 8. grados de longitud: y esto se sabe por relaciones, y cartas de naue gar, hechas en la India, y de hombre que lo anduuo muchas vezes. I)e fuerte que Malaca dista de la linea de la Demarcacion para Oriente, 183. grados: y por configuiente está en la Demarcación perteneciente a Caf-

Bien concuerda la cuenta que Pedro Ruyz de Villegas ha hecho, con la que nosotros teniamos hecha, y siédo hechas por diferentes vias la vna de la otra: lo qual es señal de ser verdad, que Malaca cae en la Demarcacion perteneciéte a Castilla. Pues prosigue Pedro Ruyz de Villegas, y dize.

Desde Malaca a las islas Molucas, ay mas de 23. grados de longitud, y el vno y elotro estan casi en la Equinocial. Assi que distan las Molucas de la linea de la Demarcación, 206. grados y medio de longitud: y por el configuiente, entran en la Demarcacion perteneciente a Castilla, con

mas de 26. grados de longitud.

Para corroboracion de lo dicho, se trae la nauegacion de Iuan Sebas-

tian, con sus puntos.

Item, en confirmacion de lo dicho, y contradicion de lo que dizen las Cartas nueuas que se han hecho en Portugal, se trae, que ponen ellos a Alexandria menos Oriental, que en la verdad està mas de 16. grados, por traer el mar Bermejo que esta alli cerca, para que este menos Oriental que en la verdad està.

El Cabo de Guardafu ponen los Portuguesses, 65. grados de longitud de España, y es alli la entrada del mar Bermejo: y ponele Ptolomeo en 85, grados, y de las Canarias, 93. grados: afsi q aqui encogen mas de 20.

grados, y llamalo Ptolomeo, Aromata.

El Cabo de Comori ponen los Portuguesses, 20. grados de Guardasu, y ay por lo menos mas de 25. grados, en caso que suesse Similia, que pone Ptolomeo en 110. grados: y en caso que suesse Gomarium Promontorium, que pone Ptolomeo, que me parece mas cierto, encogen 17 grados, porque Ptolomeo le pone en 122. grados ; y con los 20. son 37. grados los que encogen.

Demas delto ponen los Portuguesses el rio Ganges, y el Sino Gangético mas Occidental que Malaca, y es assi la verdade de dónde se sigue necessariamente, que Malaca es en la Aurea Chersonesa, la qual dista de España, segun Ptolomeo, 160, grados, que casi viene a ser de la linea de la

Demarcación mas de 198 grados, por la mente de Ptolomeob si socios

Demas desto se corrobora, que la China es mas Oriental, y mas Septétrional que Malaca: de donde es manisses es la Sinarum Regio de que habla Ptolomeo, el fin de la qual pone en 180, grados de longitud de España: casi que es el Catigára, el qual manisses tamente es Gilolo, que es junto de las islas de Maluco, que vernia a ser más de 218. grados de la linea de la Demarcacion. Assi que Ptolomeo pone esto mas largo que nosotros lo ponemos, y los Portugues el ponen más corto que nosotros, mas de 55, grados, y mas corto que Ptolomeo, 65, grados y mas.

Corroborale fer assi de necessidad, por las nauegaciones hechas desde la isla de San Antonio, y de Cabo verde, al Cabo de Buena Esperança: y desde alli al Cabo de Guardasu, donde comiença el mar Bermejo, con

lo figuiente.

Primeramente, por que assi está en la Carta que muchos años ha que se hizo en Portugal, por el mas famoso de aquel tiempo, la qual ví en poder de Francisco de Lerma, vezino de Burgos, y hecha de las primeras quando se descubrio la India, y guardada la verdad simplemente, sin atécion de nada de lo de aora.

Està assi tambien en lo de Guispuche, que entonces huuo por padrones que se podian auer, y de vn hombre tan sabio, que se puede presu-

mir que huno padrones ciertos de Portugal.

Está assi en los padrones de rodas las Cartas hechas en Castilla, especialmente de Nuño Garcia, que sue muy grande oficial de hazerlas, y tra bajò de auer los mejores padrones que pudo, y quando las hizo y huuo los padrones, no auia esta question, ni el hazia sino segun que venían los padrones de Portugal, que aca nunca en esto pensaron, hasta el año de 1516. passado, que se començo a tratar desta diferencia entre Castilla y Portugal.

Está assi en la Carta que vi de Esteuan Gomez Portugues. Está assi en la Carta que vi en poder de Simon de Alcaçaba, hecha en Portugal.

Está assi en la Carta que hizo aquel Hector, creo que de Coimbra, hecha en la India en vn pergamino de puerco. Está assi en los padrones de fray Tomas:

Ay relaciones de todos estos Portuguesses, y otros muchos nauegantes que comunique, y me informe, y otras muchas Cartas y figuras que

vi al proposito deste negocio, de que se va tratando.

Está assi en el globillo que hizo en Portugal aquel gran Piloto que se Bb 4 embo-

emborrachaua, cuyo nombre no me acuerdo, pero por aquella seña, yser

muy famolo, fue muy conocido.

Está assi en las Pomas del Obispo de Burgos, Fonseca: y del Licenciado Vargas: y en otras infinitas , hechas gran tiempo antes que se sospe-

chasse cosa destas, ni huuiesse question dellas

Prueuase mas eito, porque las Cartas del mar Mediterraneo concuerdan con lo dicho del Occeano, segun parece por todas las Cartas viejas y nueuas de Leuante, hechas en Mayorca, Genoua, en Vizcaya, y en Venecia, de las quales he visto mas de 200. y tenido, y medido muchas : especialmente tres, vna Vizcayna, y la de Nuño, y la del Conde de Salamanca, la de Iuan de Bejar, la de fray Antonio de Logroño, y sobre todo, la que tengo vieja, y otra de molde, que es de presumir, que para imprimirla buscaron el mejor padron que se pudo auer.

Concuerdan tambien todas las Italianas de molde, y otras mil Cosmografias: las dos cartas Arabigas que eran del Arcediano de Toledo, y

otras inumerables que se han visto. og aleg seamh til eles i lead at donne

Sobre todo se prueua, con la irrefragable autoridad de Ptolomeo, en lo que el pudo saber, y morando en Alexandria lo pone a la letra, ni mas

ni menos que estas Cartas marinas.

Comprueuase tambien contodas las tablas de los Astrologos, que ponen a Alexandría en lo mismo que las Cartas, que son el Rey don Asoso, Ali Auen Ragel, Zacuto, los Almanaques de Alemaña, Juan de Sacro-

bosco, y todas las tablas del mundo.

Confirmale, y corroborale mas, porque Ptolomeo pone a Ormuz, ciudad muy conocida de Portuguesses, que no sepuede negar ser ella, porque es en la estrechura del mar Persico, passado luego alli al Oriente, junto al Estrecho, la qual pone formadamente, como las nanegaciones suso dichas: que es cosa, que quien lo notare se espantarà de la diligencia de Ptolomeo, que el solo en lo que su propinquo a el, es de mas autoridad y credito, que cien otros autores.

Confirmale mas lo dicho, con vn Mapa en globo, que fue del Rey de

Napoles don Alonfo, el qual està assi como està dicho.

Confirmate tambien con otro Mapa en plano, en figura redonda, liecha en Londres. Demas desto, con muchas nauegaciones a la tierra San-

สอบ และของปี กระบบ แกะเดิดส

ta, que seria prolixidad dezirlas.

Pues en cola tan clara como el Sol, subtraen 16. grados, que haran defde el principio del mar Bermejo hasta el Cabo de Comori, y de alli a Gamispola, y de alli a Malaca, y de Malaca a Maluco, y aun passando casi en todo esto con sus padrones, es Maluco con mas de 20. grados de la Demarcacion de Castilla: y enmendandolos por Cartas viejas de Portugal, y de los que de alla lo dizen, son mas de 30. grados dentro de la Demarcacion de Castilla.

Ay mas para lo del mar Mediterraneo, los Itinerarios, que todos ponen la milma cantidad que està dicha, y el de Antonio Pio es de gran autoridad.

Podrianse traer tambien para lo del mar Mediterraneo, en prucua de lo dicho, historias y adminiculos que hiziessen más autoridad, que de

COL

cola profana y semejante se podrian traer, pero es superfluo traer mas de lo dicho en cosa tao manifiesta.

Es de notar, que es muy cierto el tomar de las alturas y latitud, pero para el Cosmografo que haze por relaciones, mas cierto se estriba en la longitud: por que faber a que hora vieron començar tal Eclypse, todos lo saben, y de todos se pueden informar: pero tomar el altura, especial antiguamente, pocos lo hazian, porque los que nauegavan no tomavan altura como sora. Traese esto en savor de la longitud de Ptolomeo, al qual en lo que alcançó, y cercano a donde el vivia, se le deue de dar credito antes que a otro alguno.

Lo dicho se confirma, y queda sin duda ninguna, por los Itinerarios que algunos han escrito de algunos viajes que hazia el Occidente se han hecho, despues del año de 1519. especialmente el que traduxo Transiluano de vn Portugues, y el que escriuio Antonio Gaseta, que concuerdan con Ptolomeo, poniendo a Gilolo, que es el Catigara en los grados de España, por el Occidente, que le puso Ptolomeo por el Oriente, que es cosa bien notable.

Esto y otras cosas acerca desta materia, dize Pedro Ruyz de Villegas, que como esta dicho, sue vno de los seys juezes que se nombraron el año de 1524. para la aueriguacion desta Demarcacion, y cada vno dellos auia hecho en razon desto su discurso. Todos ellos se refoluieron en lo que dize Pedro Ruyz de Villegas, como parece por vna resolucion que esta en vn libro que estaua en la camara del Rey nuestro señor, el qual se me entrego para que viesse lo que entonces se decretò. La resolucion que entre todos se tomò, es como se sigue, y està sirmada de los propios juezes.

Or quanto a vuestras mercedes les ha parecido, por algunos buenos respetos, que cada vno trayga en escrito su parecer de la Demarcación que su Magestad nos encomendo, yo el Mastro fray Tomas duran, y Sebastian Caboro Capitan y Piloto mayor, y Juan Vespuchi Piloto, juntamente, acordamos de poner y manifestar nuestros pareceres, acerca delta Demarcación.

Primeramente tenemos de graduar las leguas, y dara cada grado del cielo las menos leguas que pudieremos, porque dando menos leguas, menos aura en la tierra, lo qual mucho cumple al feruicio de su Magestad. Empero como ya en otro escrito diximos, parecenos que tenemos de venir a lo que comunmente vsan los Marineros, assi de Portugal, como de Castilla, que dan en cada grado del cielo, 17. leguas y media por grado.

Ė1

El segundo fundamento es, que nos conformaremos con Ptolomeo Astrologo gravissimo, el qual escrivio despues de Pomponio Mela, y

Marino, y Estrabon, el qual pone 62. millas a cada grado.

Lo tercero dezimos, que ay dos maneras de proceder en esta Demarcacion: la vna segun las conjeturas y experiencias, tomadas por las nauegaciones, muchas vezes reyteradas por experimentados Pilotos, la qual manera siguieron todos los que en Cosmografia escriuieron.

Otra manera mas cierta es, por la altura del Norte, procediendo de Norte Sur,y Leste Oeste: o tomando la longitud de Oriente a Occidéte, lo qual es dificil, como estos señores saben, y todos tienen dicho, poniendo muchos modos que les han parecido. Pues primero diremos

desta primera, y despues de la segunda.

Quanto a lo primero, tenemos de fituar la linea de la Demarcacion, 370. leguas de la isla de San Antonio, a las quales leguas responden 22. grados, y casi 9. millas, computado grados de aquel paralelo: y de la isla de San Antonio a Cabo verde, son 180. leguas, que se montan 10 grados. De suerte, que desde Cabo verde a la linea de la Demarcacion, ay 32.

grados de longitud.

Estos assigraduados, dezimos, que en qualquiera manera que queramos, caen los Molucos en termino del Emperador nuestro señor: porque si queremos demarcar segun los padrones acostumbrados, y por donde hasta aora tienen nauegado: conuiene a saber, poniendo del Cabo de Guardasu hasta el Cabo de Comori 540, leguas, y del Cabo de Comori hasta Malaca, 560, leguas, y de Malaca hasta los Molucos ay 480. Le-

guas, como siempre se nauegò.

Desta manera, no solamente caen los Molucos en la Demarcación de fu Magestad, mas tambien cae Malaca, Zamatra: y si por ventura queremos demarcar por las cartas nueuamente hechas por los Portuguesses, los quales quitan mucha cantidad de leguas en los ya subredichos, es a faber, del Cabo de Guardafu hasta el Cabo de Comori, y de Comori has ta Malaca, y de Malaca hasta los Malucos; aun dezimos, que los Malucos caen en la Demarcacion del Emperador nuestro señor: porque segun es tas cartas assi nuevamente hechas, viene la linea de la Demarcacion junto con Gilolo, que es vna isla junto a los Malucos, y esto es en plano con fu carra: el qual reduzido al redondo, porque la mar por donde nauegan es redonda, y assi mismo van por paralelos, cuyos grados son menores que los de la Equinocial, en las leguas que ellos andan y taffan a los grados, son y guales. De suerte, que puesto de plano en el redondo, se acrecienta cinco grados, los quales tenemos medido y experimentado: y afsi por su misma carta caen los Malucos dentro del termino del Emperador nuestro señor.

Item pongamos por caso, que los Reyes Catolicos, y el Rey don Iuan de Portugal, quando mandaron demarcar los mares, diziendo, que echas sen vina linea desde el Polo Artico hasta el Antartico, 370, leguas de las islas de Cabo verde, que mandaran assi mismo demarcar por la parte de Leuante (lo qual a nosorros manda hazer aora su Magestad) en el qual tiempo aun no era descubierto Persia, ni Arabia, ni el Cabo de Buena Esperan-

Esperança, cierto es que esta linea de Norte a Sur, por la parte de Leuñte, que auia de cortar por la boca del Gange. La razon es, porque Ptolomeo con mucha diligencia escriuio y situò el Cabo del Catigara, con mucha experiencia de los que nauegauan por la especieria, como el trata en el libro primero, capitulo 14. de su Cosmogra sia; el qual pone desde las Canarias hasta el Catigara, o Metropolis de los Chinas, en 180. grados. Pues sacando 32. grados, que dista la linea de la Demarcación mas al Poniente, viene a cortar por la otra parte de la boca del Gange, que cae en 150. grados de longitud: y assi quedan en la Demarcación de su Magestad, Maluco, Malaca, Zamatra.

Item, no se puede negar que la isla de Gilolo, que está junto con las islas de Maluco, no sea el Cabo de Catigara, por quanto los que sucron co Magallanes, nauegaron al Poniente quando desembocaron el Estrecho, que hallaron en 54. grados de la otra parte de la Equinocial, y de ahi nauegaron tanto hazia el Noroeste, que vinieron a estar en 12. grados de altura a la parte del Septentrion, donde hallaro ciertas islas, y una entrada, y corrieron al Sur. 300. leguas, y passaron por las islas de Maluco, y por la costa de Gilolo, sin hallar cabo della. Despues tomaron házia el Cabo de Buena Esperança, y assi no pudo ser el Cabo del Catigara, sino la

isla de Gilolo, y los Malucos.

Item, este Cabo del Catigara, pone Ptolomeo a la punta del fino magno, despues del fino Gangetico, y de la Aurea Chersonesa, lo qual conforma todo con la descripcion aora descubierta. De suerte, que la descripcion y figura de Ptolomeo, y del padron nuevamere hallado, son conformes en la figura, y tambien en el nombre: llamase aora aquella region, la China. Ptolomeo la llamò, Regio Sinarum: y como los Barbaros aprietan mas la, s, por dezir, Sina, dizen China: y los Portuguesses ponen la China en este sitio.

Esto assi dicho, que la isla de Gilolo es el Catigara, como de hecho lo es, viene la linea de la Demarcación, 32. grados más al Poniente, y corta por la boca del Ganges, y assi cae Maluco, Malaca, y Zamatra, en la De-

marcacion de Castilla.

Item, en todo lo que los Portuguesses tienen descubierto, de que Ptolomeo tuuo noticia, son conformes en su nauegacion, y ponen la China al Norte de los Malucos, en el sino magno, como la pone Ptolomeo. Pues por estas razones, dezimos, que los Malucos, Malaca, y Zamatra, caen en la Demarcación de su Magestad, por 32, grados, como arriba auemos dicho: y este es el parecer de todos nosotros tres, y assi lo damos firmado de nuestros nombres, oy 15. dias del mes de Abril, de 1524, años.

Fray Tomas Duran. Sebastian Caboto. Iuan Vespuchi.

Si estos juezes sueran mas Matematicos de lo que muestran, fundaran el derecho de Castilla con otras demostraciones, que concluyeran con mas suerça, pues entonces tenian cartas de nauegar antiguas, de que pudieran

dieran sacar principios y fundamentos, en que estribaran las demostraciones Matematicas. Pero con alegar tan superficialmente por el derecho de Castilla, los juezes Portuguesses se hallaron tan conuencidos, que no tuuieron que alegaren contrario, sino todo sue poner dilaciones, y escusas para que no huuiesse determinacion, como consta por vna carta que los juezes de Castilla escriuieron al Emperador, la qual sirmaron todos de sus nombres, y es como se sigue.

S. C. C. M.

Uando el primero correo partio, no se auia ofrecido cosa de que particularmente deuiessemos hazer a U. Magestad relacion: Al presente, muy poderoso señor, demas de ser necessario dar cuenta de lo sucedido, es razon que V. Magestad sepa como recebimos su carta por la qual besamos sus Reales pies: y quanto a la culpa que por eilanos es atribuyda, tenemos por cierto, q es porfalta de verdadera relació, pues la obra y la verdad de lo que aca passa es al contrario: porque siempre nos tuuimos por dishos, que nos auiamos de juntar todos, y comunicar, as silos seys nombrados, como los demas que aqui U. Magestad mando venir, y nunca en esto huuo falta, ni la aura en cosa que alto servicio toque, en quato nuestras suerças bastare. Quanto a lo que nos otros con los Diputados del Rey de

Quanto a lo que nos otros con los Diputados del Rey de Portugal se ha platicado, y auemos comprehendido de su intencion, es, que no querrian venir en conclusion de haz er la marcacion para que suymos aqui embiados: y la dificultad y impedimento que para ello ponen, es no auer querido concertar se con nos otros, sobre el sitio y lugar donde deuen ser assentadas las islas de Cabo verde, desde las quales se han de començar a medir las 370. leguas, y como nos otros nos justificas semos,

ficassemos, en que se assentassen en el lugar donde comunmete por todos los que nauegan, y en todas las Cartas (uelen ser assentadas: de necessidad huuiero de venir a cotejar sus car tas de marear con las nuestras. I como entre ellas huniesse diez o doze leguas de diferencia, no solo no quisieron estar por lo q las nuestras demostrauan, pero conocediedo nosotros, que estauan bien las suyas, y que se situassen por aquella forma,no quisieron,diziendo,que todas eran falsas,y que no los embiauan sino a hazer lo mas justo y cierto que ser pudiesse, y que por tanto se deurian de assentar por instrumentos Matematicos, y Astrolabios, y Eclypses: y al fin de tres dias que porfiaron sobre este punto, viedo la poca color, y razon q tenian, sin querer tomar sobre ello conclusion, trauaro de otro en que de razon huuieran menos de dudar, y es q dizen, que las 370 lequas, se han de començar a medir de la mas Orietalisla, y no desde la postrera. I como tambien en esto vean lapoca justicia de su intento, dizen, que aqui son venidos a cumplir la primera capitulacion, y que aquella dispone, vayan nauios a situar la linea de las dichas 370. leguas, y que por tanto no sotros no lo auemos aqui de hazer, saluo dar orden como estos nauios vayan, y para instruyr las personas q en ellos huuieren de yr. A este efeto presentaron una prorto gacion de los Catolicos Reyes, que en gloria sean, en que mã dauan, que se juntassen en la raya de Castilla y Portugal, personas para dar orden en el despacho, y en la forma que se auia de tener sobre la yda de los dichos nauios.

Lo que en sustancia respondemos, es, que no ay obligació de embiar los nauios, porque ya espiro el termino assignado en la capitulación, y prorrogación, y que desta nueva capitulación de V. M. y del Rey de Portugal, y de sus comissiones a nosotros hechas, costa que auemos de determinar la propiedad, y no concertar nauios y getes quaya a ver el sitio de las tierras, y qual quotidianamete se va alas dichas istas de Cabo verqual quotidianamete se va alas dichas istas de Cabo verqual quotidianamete se va alas dichas istas de Cabo verqual quotidianametes.

de, y se sabe cierto su sitio y lugar.

Cc Quanto

Quanto alo del medir de la primera, y no de la postrera, es contra la capitulacion, que quiere y dispone, que entre las dichas islas y la linea, intermedien las 370. leguas, y que esto no se verisicaria poniendo algunas islas dentro de las dichas leguas: paralo qual se les traen otras razones, que alos del Consejo de V. Magestad, y al Abogado, y Fiscal, parecen ser y son concluyetes: pero como su sin se enderece ano tomar conclusion, no admiten razon por buena que sea.

La causa que pensamos que les mueue a desser que no aya efeto esta marcacion, es porque no sean por ella compelidos a dexar muchas tierras que tienen vsurpadas, y que no les pertenecen puesto que con ellos se huuiesse de haz, er particion del medio mundo, y por tanto les parece que se deuen asir a laposse sion, pues para ella no les han de faltar testigos ni escrituras, y que podran diserir la propiedad, con aueriquació de i ierras y distancias por provaciones Astrologicas,

que son cosa de gran dilacion.

Por to qual nosparecia, que V. Magestad deuria mandar, que se diesse forma con el Rey de Portugal, que fuessemos compelidos a haz er la dicha marcacion, segun la possibilidad que ay de hazerse por el presente, sin embiar nauios, niaguardar Eclypses: porque aun entre los que esto huniessen de hazer y executar, podrian nacer mil diferencias, y mayor error, y nunca venir en concordia. Si toda via pretendiessen que no puede aqui hazerse sin daño de alguna de las partes, podiase tomar por medio, que no embargante lo que aora se determinare, quede reservado el derecho a las partes, para que si en algun tiempo huuiere mas euidente forma de assentar la dicha linea, o si alguna de las partes prouare auer sido mal situada, que se aya de enmendar, haziendola mas al Oriente, o al Occidente, segun se hallare que deue estar. Pues que seria tan contra toda razon, que siendo la prueua que ellos piden tan indeterminable, no se aya de tomar paraentretanto, aquella que con mas razon y apariencia deue ser

aprouada.

Don Hernando Colon, en presencia de todas las personas que entienden en possession, y en propiedad, propuso cierta interpretacion que el da ala capitulacion, y marcacion, por la qual parece, toda la nauegacion Oriental pertenecer a U.Magestad: y por el consiguiente Calicut, Mataca, y los Malucos, y todo lo demas que tiene el Rey de Portugal, al qual solamente quedarian las 370. leguas, desde la linea hasta las islas de Cabo verde : y para confirmacion desto, leyo ciertos motiuos y razones, que nos parecieron tan bien, y que manifiesta tanto la justicia de U. Magestad, que se los embiamos con la presente, para que los mande ver a quien fuere seruido, y nos embie a mandar lo que sobre esto deuemos hazer, porque hasta ver su Real mandato, no osaremos determinarnos en este caso. Nuestro Senor la muy alta y felicissima persona de U. Magestad por muy largos dias, con aumento del vniuer sal imperio, a su seruicio prospere. Fecha en Badajoz, a 25. de Abril, de 1524.anos.

D. V. S. M.

Humildes vassallos, que sus Reales pies besañ.

Don Hernando Colon.

El Doctor Salaya. Sebastian Caboto.

El Bachiller Simon Ta- Martin Mendez.

rrago. Fray Tomas Duran. Nuno Garcia.

Pedro Ruyz de Villegas.

Juan Vespuchi.

El Maestro Salazar. Iuan Sebastian del Cano.

Pedro Ribeyro. Esteuan Gomez.

Cc 2 Por

Por dos razones me he mouido aponer lo que estos juezes determinaron en aquella junta de Badajoz, el año de 1524. acerca de poner las longitudines de la circunferencia de la tierra, dando a cada parte su verdadera longitud, contada de las Canarias, o del Meridiano de la Demarcacion. La primera es, porque se vea lo que aqui auemos demostrado acerca destas longitudines, ser assi como està dicho: porque auiendo procedido por diferente camino del que estos juezes tuuieron, viene a falir casi las mismas longitudines, alomenos con las que pone Pedro Ruyz de Villegas, que entre aquellos juezes fue el que en esta parte mas entendia, que noson de diferencia de dos grados y medio, en todos los 180. grados que ay del Meridiano de la Demarcacion, a la parte Oriental, o a la Occidental. En quanto a las longitudines que se determinan por la parte Oriental, assi estos juezes como nosotros, nos auemos fundado en las relaciones y principios de los mifmos Portuguesses, aunq diferentes los vnos de los otros. Y tambien el modo de proceder y demostrar, ha sido muy diferente el que aqui se ha tenido, del que los juezes tuuieron, como en el discurso se puede ver.

De donde se puede inferir, que las longitudines que aqui auemos aueriguado, assi por la parte Oriental, como por la Occidental, que son las verdaderas, y que no ay error que sea de consideracion en todo lo que se ha tratado, pues vasfundado con demostraciones tan claras; dellas sacadas de observaciones de Eclypses de Luna, y otras sundadas en las derrotas que comunmente nauegan todos: y lo que demuestran estas derrotas y distancias, que los Pilotos dizen que son bien observadas, es la conformidad y congruencia q ay de las que se hazen por la parte Oriental, con las que se hazen por la parte Occidental; y tambien conformar

la observacion de los Eclypses, o alomenos discrepar

poco de lo que por las derrotas se halla.

Pues deuriafe de aqui adelante, que todos los Mapas y carras de nauegar que se hiziessen, se descriuan segun esta enmienda y reformacion, y vedar que la que hasta aqui se vsa no la aya, sino desterralla por deprauada, y que puede traer configo muchos inconvenientes.

La otra razon es, que aunque Castilla y Portugal son debaxo del imperio y señorio del Rey de Castilla nuestro señor, y todos somos sus vasfallos, pero contodo esso es bien, que aya distinción de lo que pertenece a cada vno, y se le guarden sus fueros y derechos, para que cada Reyno contrate y goze de lo que le toca: y seria mal hecho, que nadie se introduzga en lo que de derecho

no le pertenece. de doo esta Elqu

Assi que fuera gran culpa mia, no auer puesto mucha diligencia y cuydado en aueriguar la verdad del sitio y lugar de las partes y puntos principales de las costas del mar Occeano, y hallada la verdad no la declarac y demostrar, con los mejores medios que supiesse, y hiziessen a este proposito: porque en esto aure cumplido con lo q fe me encomendò por parte del Rey nuestro señor, y lo que toca a mi obligacion de dezir verdad, de la que en esta parte se hallare, y se me mandò, como lo vera el que desapassionadamente entendiere lo q aqui se ha dicho, y adelante se dira, en la descripcion particular de algunas costas, assi del mar Occeano, como del Mediterraneo, y mar Bermejo, y partes Septentrionales.

CAP. IX. Que trata de la descripcion de la costa del Peru, y Brasil, y estrecho de Magallanes.



ARA Poder descriuir la costa del Peru, ay obseruaciones de Eclypses de la Luna, que enseñan la longitud. La latitud, y derrotas esta observadas

de las continuas nauegaciones que cada dia se hazen. Pues sepamos lo primero, la longitud de algunas partes, donde se hizieron las observaciones de los Eclypses.

El año de 1588.en 4. dias de Setiembre, acontecio vn Eclypse de la Luna, el qual se obseruò en Puerto viejo, que es en la costa del Peru, en la misma Equinocial, estando presentes la justicia y Regimiento, y otras muchas personas, vieron que començo a eclypsarse la Luna; y en este tiempo hizieron las diligençias que les estaua ordenado, por la instrucion que luan Lopez de Velasco les auia embiado, y lo mismo hizieron quando acabò el Eclypse: de todo lo qual dio testimonio el Escriuano que presente estaua, y se embiò assi a su Magestad. Parece pues por las dichas diligencias que se hizieron, que començo el Eclypse a las ocho horas, y 54. minutos despues de medio dia, y se acabó a las 12. horas despues de medio dia. Per per per puenta antes te suon

Este mismo Eclypse obserue yo en Lisboa, con mucha diligencia, y començò a los 4. de Setiembre, a las 13. horas y 49. minutos despues de medio dia. Tambien obseruò este Ecclypse el Doctor Sobrino Capellan del Rey nuestro señor, en la ciudad de Lisboa, y fue el principio y fin al mismo tiempo que yo le obserue. De suerte, que entre el principio del Eclypse de Lisboa, y el de Puerto viejo, huuo 4. horas, y 55. minutos de tiempo de diferencia, que reduzido a grados de Equinocial, fon 73.grados, 45.minutos: stanged Dog er los trio, and son :

Teniamos por las observaciones de los Eclypses passados, que Lisboa distaua de Mexico, por 95. grados de longitud, de los quales restados 73. grados, y 45. minutos que ay de longitud entre Lisboa y Puerto viejo, quedaran 21. grados y 15. minutos de longitud, entre Mexico y Puerto viejo. militat se potati de sent de nor

Este mismo Eclypse se obseruo en la ciudad de los Reyes,

Reyes, y en Arequipa, que està en 16. grados de altura de Polo, a la vanda del Austro, que por euitar prolixidad no pongo aqui las observaciones. Pero en resolució, toda la costa del Peru, desde Puerto viejo hasta el estrecho de Magallanes, que està la primera entrada en 52. grados de altura, va de Norte a Sur, de tal suerte, que el Meridiano que passa por Puerto viejo, passa por medio del Estrecho. Estó es cosa tan sabida de los que continuamé te nauegan aquella costa, que en esto no se pone duda: que aunque en algunas partes haze la costa algunas entradas, como por Lima, y Arequipa, pero otra vez torna por Chile a estar en el mismo Meridiano de Puerto viejo. De Chile al Estrecho va la costa Norte Sur, como lo dize Pedro Sarmiento, y Anton Pablo Corço, que lo hallaron quando passaron el Estrecho por la parte Occidental. De manera, que queda sabida la descripcion de la costa del Peru, que va de Norte Sur desde Puerto viejo hasta el Estrecho de Magallanes.


Boluamos a descriuir la costa del Brasil, de la qual no ay observacion de ningun Eclypse, pero tomaremos por principio y fundamento, la nauegacion que se haze de Cabo verde al Cabo de San Agustin, la qual estan sabida, assi de Castellanos como de Portuguesses, que no se pone duda, ni de los vnos, ni de los otros, en que la derrota que ay de Cabo verde al Cabo de San Agustin, tiene 500 deguas: y esto es cosa muy assentada entre to-

dos los que nauegan aquel viaje.

Pues segun este fundamento, sabremos la longitud entre Cabo verde y Cabo de San Agustin, porque estádo Cabo verde en 14. grados y 30. minutos de latitud, a la parte del Norte, y el Cabo de San Agustin en ocho grados y medio de latitud Austral, aura de diferencia de latitud entre el vno y el otro, 23. grados.

Sea el paralelo en que està Cabo de San Agustin, ab: y donde está el Cabo, el punto, a. Sea el punto, c, donde está Cabo verde: tirese, c b, que sea el Meridiano que passa por Cabo verde, que cortará al paralelo, a b,

en angulos rectos en, b: tirefe, ca, que ferà la derrota de Cabo verde a Cabo de San Agustin, la qual tiene 500 leguas. La linea, cb, es la diferencia de latitud que ay entre estos dos Cabos, que es 23, grados, que reduzidos a leguas hazen, 403, leguas. Pues en el triangulo rectangulo, a b c, estan conocidos dos lados, luego por la 47, del primero de Euchides, conocerte ha el tercero lado, a b, que se ra, 295, leguas, que reduzidas a grados son casi 17, grados, y tanta es la longitud que ay entre Cabo verde, y Cabo de San Agustin.



Pues si restaremos esta longitud de la que ay de Cabo verde a Puerto viejo, quedarán 51. grados de longitud, entre Cabo de San Agustin y Puerto viejo. Assi que enemos la longitud de los dos estremos de lo mas ancho del Peru, y tambié los puntos donde se han de situar. Tenemos sabien la longitud del Estrecho de Magallanes, con su latitud: luego de necessidad sabremos donde senece, y porque derrota; porque el Estrecho no tiene mas de 100. leguas de anchura. Esto se entiende con todos los rodeos, que de vna boca a la otra no ay sino 80. leguas: y assi el Peru se viene a cerrar en el Estrecho con las dos costas del Peru y Brasil.

La costa del Brasil, toda ella tomada junta, se corre Nordeste Sudueste, por esta demostració. Sea, a b, la Equinocial: sea, d c, el paralelo en que esta el Cabo de San Agustin. Sea, a d e g, el Meridiano que passa por Puer to viejo, y Estrecho de Magallanes. Sea, a e, 54. grados que tiene de latitud la mirad del Estrecho: sea, d c, 51. grados de longitud que tiene el Cabo de San Augustin desde Puerro viejo: sea, e f, el paralelo que passa por el Estrecho de Magallanes. Tirese, c g, de Nordeste Sudueste, y cortará el Meridiano, a e, en, g, y sera, d g, y gual de, d c. La linea, a d, es. 8. y medio, que es la latitud del Cabo de San Agustin, que quitada de, a e, que de, d e,

de 45 grados y medio, y, d g, 51 grados: A luego, e g, es 5, grados y medio: pues se g, e f, fon y guales, fer 3, e f, 5. grados y medio, pues la longitud del Eftrecho aŭ no es 6. grados. Luego el rumbo, c g, es la derrota que fe corre del Cabo de San Agustin al Estrecho. De suerre que por muchos modos se verifica, que toda la costa del Brasil tomada junta, se corre el Nordeste Sudueste: y lo mismo dizen

Pilotos que han nauegado aquel viaje, afsi los derroteros hechos de atras,como algunos Pilotos que aqui he vifto, que vno fe dize fuan Rod driguez de Aguilera, y otro Iuan Aluarez. Tambien otros dos Pilotos dizen, que estando tres leguas mas al Leste de la isla de los Baxos de Abre ojos, se han gouernado con Sur al Norte derecho, y se dio en Bacia barriles. De suerte que la costa desde la Bahia de rodos Santos, hasta Cabo Frio, está errada en las Cartas, y y a al Susudueste, y mas al Sudueste.

Tambien dize luan Aluarez Piloto, de nacion Portugues, que desde Cabo Frio a San Vicente, se camina de Lette Oeste, y que ay 110 leguas. Conforma esto con la Carta y descripcion del Peru, que truxo el Marques de Cañete Virrey del Peru,

Es de aduertir en esto de las longitudines, que si en las descripciones de la Carta general, o de las particulares, se hallare medio grado, o algo mas, o menos de lo que aqui se ha demostrado, no por esto se ha de entender que es error en la descripcion, en viajes tan largos; que este error puede venir, por causa que los pergaminos, y mesas, y reglas, en cosas tan grandes, no puede dexar de hazer alguna variacion, por donde no venga la medida tan puntual, que no salte alguna cosa de lo que se lleua por la cueta; pero como està dicho, no sera cosa sensible. En quanto las latitudines, se tiene cuenta con ponellas con precision, segun que comunmente se hallan, por que esto es de mucha importancia para los que nauegan.

Todas las Cartas que se hazen en Portugal, traé erradas estas dos costas del Peru y Brasil, la razon es, que por meter el rio de la Plata dentro de su Demarcació, acortan lo que ay de Cabo Frio a la Bahia de San Vicente: por lo qual, de necessidad han de traer el Estrecho de Magallanes mas al Oriente de lo que conuiene, y que pongan la costa del Peru mal puesta, y tăbien la del Brafil, porque la vna y la otra se junta en el Estrecho de Magallanes, que no tiene de la vna boca a la otramas de 80. leguas, como aŭemos dicho: y por juntarle con la costa del Brasil, sacan la costa del Peru de su sitio, que es Norte Sur, y ponenla desde la punta de Chile, que està en 32.grados de latitud, hasta la boca del Estrecho, de Noroeste Sueste, auiendo de estar Norte Sur y de aqui viene que pongan la costa del Brasil, Nornor deste Susudueste,

sudueste, auiendo de estar, segun toda ella, Nordeste Sudueste: de suerte, que de vn inconveniente se siguen otros muchos.

Assi mismo en algunas Cartas, se pone errada la distancia que ay de Puerto viejo al Cabo de San Agustin: pero en las Cartas que estan en el Almazen de Lisboa, està bien puesta esta distancia, que segun las observaciones que se han visto, es 51. grados de longitud; y assi lo tiene la Carta del Almaze, y algo mas como tres grados.

Todos estos errores que auemos dicho, cometen los Portuguesses, por meter el rio de la Plata en su Demarcacion, como acabamos de dezir, porque en todas las descripciones que hazen, van con esta intencion.

C A P. X. Que trata de la descripcion del mar Mediterraneo.

E Me de que

E DOS Maneras se halla descrito el mar Mediterraneo, porque en las Cartas por dode se nauega le descriuen diferentemente que en los Mapas generales, y en los globos.

La descripcion que se haze en los Mapas generales, y en los globos, es conforme a las longitudines verdaderas, como las que puso Ptolomeo, que son las qua aora se hallan. Pero la descripció que se haze en las Gartas de marear, es conforme la que hallan los nauegantes, la qual de necessidad ha de ser diferente de la otra, segu el modo que los que nauegan aquella mar tienen, en hazer sus derrotas y viajes. Bien sabida cosa es de todos, que en el mar Mediterraneo no se nauega por altura, sino por derrotas y distancias: las derrotas son las que les muestra la aguja: las distancias las miden a su fantasia; y esto esta ya tan aueriguado, por las muchas y continuas nauegaciones, que no es error notable lo que pueden

errar en las distancias. Pues de aqui viene, que el mar Mediterraneo sea mas corto en las cartas de marear, que no en los globos y Mapas vniuersales: porque nauegandole el mar Mediterraneo, todo el en general, por el paralelo de 40 grados, viene a ser cada grado deste pa ralelo menor que el grado de la Equinocial, 14.01111utos; y los que nauegan hazen el grado como de la Equinocial: y auiendo del estrecho de Gibraltar a lafa, que es del principio al fin del mar Mediterraneo, 65. grados de longitud, vendra a ser toda la longura, o cumplimiento de 46.grados de Equinocial; y assi los que nauegan le da 19. grados menos de longitud, de lo que el tiene. Esto se dexa bien entender, por lo que se dixo en el capitulo segundo y tercero, que nauegando los Marineros por paralelo, dan las mismas leguas a cada grado, como si nauegaffen por la Equinocial: y como los grados del paralelo no tienen tantas leguas, hazen mas corto el camino en el numero de los grados.

Pues descriuiendose el mar Mediterraneo en las cartas de nauegar, danle los grados que hallaron, segun las leguas que caminaron: y como estos grados los hazen como los de la Equinocial, viene a perder en la longitud en el numero de los grados, 19. grados, o mas; y desta suer te en las cartas de nauegar, se descriue mas corto que no en los globos y Mapas generales. Y con esto queda declarada esta diferencia que ay entre las dos maneras de descriuir el mar Mediterraneo, segun longitud. La diferencia de latitud que ay tambien en la descripcion que

se haze en las cartas de nauegar, se dira luego.

Resta de demostrar la otra diferencia, que es, que siédo la costa que ay del estrecho de Gibraltar hasta Tunez, de Leste Oeste en los globos, como ella lo es realmé te, porque todos los puertos desta costa se hallan casi en vna misma altura de Polo: pero en las cartas de nauegar

fe

se corre aquella costa, Leste quarta al Nordeste. La causa desto es bien clara, aunque hasta aora nadie lo ha aduertido.

Como los Marineros que nauegan este mar no lleuã Astrolabio, ni otro instrumento con que poder saber la altura, fino folo fe gouiernan por la aguja, y la derrota que les muestra, esta ponen en la Carta. Pues nauegando de Tunez por toda la costa, hasta el estrecho de Gibraltar, la aguja les muestra, que aquella costa se corre Leste quarta al Nordeste, y assi la ponen en su Carta.

Dixe que la aguja les muestra, que aquella costa se corre Leste quarta al Nordeste, esto se entiende, no dandole a la aguja el resguardo de la variacion que tiene : y como en esta parte Nordestea la aguja vna quarta de viento, otro tanto hazen los marineros de diferencia en poner la derrota en su Carta. Porque las agujas con que nauegan este mar Mediterraneo, lleuan los azeros debaxola flor de Lis; y los Marineros no tienen cuenta co la variacion de la aguja, fino fegun que ella les muestra las derrotas, las assientan en sus Cartas.

Sea en la figura figuiente, la linea, a b, Leste Oeste, y la linea, c d, Norte Sur: cortense en angulos rectos en el punto, e, por el qual se tire la linea h e K, que haga el angulo, c e h, de vna quarta de viento, que es lo que Nordestea la aguja en esta costa del mar Mediterraneo, desde el estrecho de Gibraltar, hasta Tunez. Tirese, f g, que corte en angulos rectos la

linea, h K, por el punto, e. Pues segun la aguja que lleuan los Marineros, fera,h K,de Norte Sur, y la linea,f g, de Leste Oeste: y todos los demas rumbos de la aguja, entienden que muestran sus verdaderos lugares, sin J hazerningun resguardo del angulo a ceh, que es lo que Nordestea la aguja. Haga el Marinero su nauegacion, desde Tunez hasta el estrecho de Gibraltar, que realmente sera por la linea, bea, que es el Leste verdadero: pero como segun su aguja, el Marinero piensa que, g f,es el Leste verdadero, tiene entendido que nauega por

el, y que la linea, ba, que dista vna quarta de viento de la linea, g f, que es el viento Leste quarta al Nordeste, y assi pone en su Carta, que la nauegación de Tunez a Gibraltar, que es de Leste quarta al Nordeste, no siendo sino de Leste Oeste, y toda la diferencia sue, lo que la aguja tuuo de variación, que en esta parte es vna quarta de viento, poco mas o menos.

Podria dudar alguno que esto fuesse assi, diziendo, que tambien la costa del mar Mediterraneo, que va del Cabo de Rifuto hasta Damiata, en los globos y Mapas va de Leste Oeste, y tambien en las Cartas de nauegar: pues porque aqui no se varia la derrota desta costa en las cartas de nauegar, de como està en los globos y Mapas generales? A esto se respode, q descriuir esta costa en las cartas de nauegar, como le pone en los globos y Mapas, es argumento, q lo que se ha dicho de la costa de Gibraltar a Tunez, qua corren segun y como se ha demostrado: porque del Cabo de Rifuto hasta Damiata no se fiente la variació de la aguja, por fe fixa como al medio desta costa; y assi el Leste Oeste de la aguja, es el verdade ro: y como los Marineros descriuen las derrotas segun que se las enseña la aguja, descriuen esta costa de Leste Oeste verdadero, porque assi se lo enseña la aguja.

Pues de lo que auemos dicho se puede entender, como estan descritas las derrotas del mar Mediterraneo, por las quales los marineros hazen sus nauegaciones. Estas derrotas, vnas vezes se apartan mas, otras menos del Leste verdadero, segun que la aguja varia mas o menos: porque como està dicho, los Marineros que nauegan este mar, no tienen cuenta con lo que la aguja tiene de variacion.

Ay otra cosa que aduertir en el mar Mediterraneo, que como no se nauega por altura, todas las que estan puestas en las cartas de nauegar son mayores de lo que

han deser. Esto no entendio el Doctor Pedro Nunez, segun que muestra en su libro de nauegacion, hablando

Dd desta

desta variacion de altura, atento que con ignorancia pufieron algunas mayores de lo que eran, y despues gouernandose por las derrotas, fueron pomendo las demas, segun que las mismas derrotas les mostrauan: y como estas suessen falsas, lo son todas las alturas del mar Mediterraneo, que estan en las cartas de nauegar, mas o menos, segun las derrotas se apartan de la verdad. Esto se demostrarà mas adelante.

Pues viendo que en el mar Mediterraneo està introduzida esta manera de nauegar, se determino de hazer Carta particular, segun este modo, imitando los padrones, que segun esta manera de nauegar se tiene por mejores. Pero en la Carta general se han descripto todas las costas del mar Mediterraneo, segú sus verdaderos sitios, siguiendo la opinió de Ptolomeo, que esta parte es la mejor de todas, en quato a lo general en las cosas particula res claro està que se ha de seguir lo que los mas modernos ponen, por que dada dia se van descubriendo cosas nuevas, como son baxos, arrecises, restingas, y otras menudencias de que es la figura y forma de Costas, y Cabos, y Puertos, se sigue la mas comun opinió de los modernos.

CAP. X 1. Quetrata del mar Bermejo.



OSA Es bien dificil, o por mejor dezir, impossible, descriuir las colas que estan en superficie redonda, en superficie plana, y q del todo guarden longitud, y latitud; y junto con esto,

la forma que tienen. Pero pues no se puede guardar todo, en lo que toca a las cosas principales, estas no pueden dexar de guardarse; en quanto a la figura y forma, como està dicho, viene a ser mas prolongada de como està en la superficie redonda, y algunas vezes mas ancha. Los que no entienden la causa desta variación, viendo algunas descripciones diferentes de las que en otras partes han visto, suelen poner defeto en ellas, sin dar mas razon, de que no les parece en la figura y talle, como las que ellos han visto, no sabiendo qual dellas esta hecha có arte, o qual sin ella.

Por tanto auemos procurado en la descripcion de todas las partes desta Carta general, dar razó con que fundamento se descriuieron, para que el que suere Matematico se fatisfaga, y elignorante no tenga que arguyr, sino es q sea tan sin entendimieto, que no quiera admitir razon, sino cerrar los ojos, y dar contra la pared, como lo suelen hazer algunos mal intencionados, que la embidia y malicia les ciega el poco entendimiento que tienen.


Pues viniendo a la descripcion del mar Bermejo, o sino Arabico, sucede aqui lo que se dixo del mar Mediterraneo, que tambien se nauega sin tomar altura, con sola la aguja, porque de tomar altura no ay necessidad, atento que se nauega por solo yn Canal. En quanto a la longitud no se le puede quitar nada, como estàdicho, por lo qual el fin del ha de venir a dar junto a Damiata, por que no ay mas de 18.ò 20. leguas del fin del mar Mediterraneo. Desta suerte, la nauegacion del Canal deste mar, se haze de Noroeste quarra al Oeste.

En algunos derroteros Portuguesses he visto que dizen, que se nauega de Noroeste Sueste, y algunas Cartas le ponen de Noroeste quarta al Norte: pero la verdad es, que se nauega de Noroeste Sueste; porque acontece aqui lo que se dixo de los que nauegan de Tunez a Gibraltar. Porque en esta parte Noroeste a la aguja casi vna quarta de vieto, como parece por las observaciones que hizo don Juan de Castro nauegando a la India, y los quauegan en esta Canal, no tienen cuenta con la variacion

de la aguja, fino lleuando los azeros debaxo la flor de Lis, camina por las derrotas que les enseña la aguja; y estas tienen por verdaderas, como fi la aguja no tuuiesse variacion. Pues Noroeste ado aqui la aguja casi vna quarta de viento, alomenos al principio del mar, el Noroeste quarta al Oeste, que es la derrota verdadera deste mar, la variacion de la aguja; que es Noroeste Sueste, y asi los marineros dizen, que se nauega Noroeste Suueste.

Hagamos la figura figuiente, pará que los que no fueren Marineros lo puedan entender mejor. Sea, a b, la linea de Norte Sur; y la linea, c d, Lefte Oeste, q se cortan en angulos rectos en el punto entrese, h K. que haga el angulo, a e h, de vna quarta de viento: tirese mas, f g, que corte en angulos rectos la linea, h K. y sera a los Marineros la linea, h K, Norte Sur, y la linea f g, Leste Oeste. Tomese el angulo, a e l, de 45. grados, y tirese l m, que sera Noroeste Sueste verdadero: tomese el angulo, h e n, de 45. grados, y tirese, n e o, y sera Noroeste Sueste a los Marineros, pero sera

Noroeste quarta al Oeste, segun la verdad. Pues como los marineros nauegan por la derrota, ne o, que la variación de la aguja le haze parecer que es Noroeste Sueste, dizen que la nauegacion de la canal deste mar, se haze de Noroeste Sueste, siendo Noroeste quarta al Oeste. La nauegacion deste mar, no se mudò de como el está en la verdad, como fe hizo en el mar Mediterraneo, porque como no tiene el que nauegare de apartarse del canal, que no es muy ancha, no huuo para que hazer nauegacion particular del, fino ponerle como



el está realmente. Assi en la Carta particular que se hizo de la India, se puso como está en la Carta general.

Los Portuguesses como procuran llegar toda aquella mar mas al Occidente, vienen a poner aquel mar Noroeste quarta al Norte, lo qual es falso, por lo que queda demostrado, assi de la costa de la India, como del mar

de la India, como del mar Mediterraneo.

(;)

159 (AP. XII. Que trata de la descripcion de la parte Sep-

tentrional, que cae en Europa.

N Todala nauegation que se haze en la parte Septentrional, que comiença del Cabo de Finisterræ para el Norte, acontece lo mismo que se dixo del mar Mediterraneo, que las Car

tas con que nauegan, son diferentes en la descripció de las costas, que lo que se halla en los globos y Mapas vniuersales: y la razon es, que en los globos y Mapas vniuersales, estan puestas todas las costas, segun su longitud verdadera; y si esta longitud se pusiesse en las Cartas con que se nauegan estas partes, estarian vnas cosas de otras muy distantes, por la razon que se dixo en el capitulo fegundo y tercero, y los Pilotos no se entenderian bien con sus nauegaciones. Por lo qual llegaria la nao al puerto, mucho antes que el Marinero co el punto en la Carta, atento que nauegan por partes muy remotas de la Equinocial, donde vn grado de paralelo, algunas vezes no vale mas de medio de la Equinocial, como es en el paralelo de 60. grados de eleuacion de Polo. Por tanto los Pilotos en estas partes, nauegan mas por derrotas y distancias, que no por alturas, aunque aqui siempre lleuan sus Astrolabios, porque en algunas ocasiones los ha menester: porque en estas partes, aunque no se guarda la longitud en la descripcion de la Carta, pero la latitud siempre se pone. Pues nauegando por sus derrotas, tienen cuenta con las distancias que hallan de vnas partes a otras, y estas ponen en las Cartas, no dexando de poner cada parte en su altura: y como en la Cartase pongan los grados, como los de la Equinocial, en vn grado se consumen dos del paralelo de 60. grados. Y desta suerte, en las cartas de nauegar, hechas para aquellas partes, viene a estar todo lo de aquel distrito muy apretado, Dd 3 imitan-

imitando a lo que se descriue en el globo, en la compresion, pero no en la longitud: porque si en la carta de nauegar se diesse a esta tierra la longitud verdadera que tiene, se estenderia doblada distancia de la que tiene: y en algunas partes mas, y en otras menos, segun que se

apartare cada parte de la Equinocial.

Pues viltas estas diferencias, determinè, que en la Car ta general se descriviesse esta parte Septentrional, segun su longitud verdadera, y hazer vna Garta particular, para los que nauegan : la qual fuesse hecha segun las distancias que ay de vnas partes a otras, porque assi se nauega por toda esta parte, guardando sus latitudines y derrotas, como las descriue aora en este tiempo, Ioanes Lucas Aurigario, el qual con mucha diligencia descriue la nauegacion de todas estas partes Septentrionales: y por ser natural Flamenco, y hombre curioso en este modo de escriuir, como lo muestra en el Speculum nauigationis, segui sus descripciones en esta parte, antes que la de otro ninguno, no dexando de ver si conformauan en lo general, con lo que comunmente se tiene. Assi que quando se viere la Carta general, y la particular, se entienda, que la diferencia que huuiere de la vna a la otra en la descripción de algunas partes, se hizo con arte, y que no fue inaduertencia, sino que sue assi necessario.

Podria dezir alguno, que como en los otros padrones particulares no huuo en ellos diferencia de lo que fe hizo en la Carta general, como la ay en el mar Mediterraneo, y en la parte Septentrional? A esto respondo, que los que nauegan cercanos a la Equinocial, no tienen necessidad desta separación de Carta, porque no es sensible la diferencia. Demas desto, como nauegan tan largos mares, y tienen las derrotas en sus Cartas, como si nauegassen por la Equinocial, sin hazer diferencia de grados

160

grados de paralelo a grados de Equinocial: y fuera muy grande inconueniente, reduzir a distancias las nauegaciones Occidentales, y Orientales, que allende que se mudaran las derrotas, fuera peruertir todo el Mapa. Por lo qual fue mejor poner las cosas como se han hallado, dandoles sus longitudines, y latitudines verdaderas, que aunque en las partes que estan muy apartadas de la Equinocial, se haze el viaje mas largo en la Carta, de lo que realmente es, esto es menos inconueniente que sacar las cosas de los sitios y lugares que se han hallado: porque como està dicho, los que nauegan por derrota y altura, ponen los lugares en sus longitudines.

CAP. XIII. Que trata de las enmiendas particulares que se han hecho en el padron ordinario de la carrera de las Indias.



ESPVES De auer hecho la vniuerfal defcripcion de la Carta general de nauegacion, y en ella auer enmendado lo que por las obferuaciones de Eclypfes de Luna, y relaciones de Pilotos, se ha visto ser necessario: ref-

ta aora tratar de las enmiendas particulares, principalmente lo que toca a la carrera de las Indias, donde tan continuamente se hazen las nauegaciones de las slotas que van de España. Para la qual enmienda se consultaron los mas expertos Pilotos que aqui en Seuilla se han hallado, tomando la relacion de cada vno, de las partes que mas continuamente ha nauegado, segun las quales relaciones se hizo la enmienda como se sigue.

PRIMERAMENTE, Se enmendò la canal de Bahama, segun y como la descriuieron el Capitan Pedro Bernal Cermeño, y el Piloto Iuan de Coy, los quates por or-Dd 4 den

den del Gouernador de la Habana, el año de 1595. fueron y costearon todos los Cayos que estan en la costa de la Florida, des de los Martires hasta el Cabo del Canaueral, y los descrivieron de la figura y forma que son: y lo mismo hizieron de la costa de la Florida. Del Cabo del (añaueral, fueron a los Mimeres, o Bimines, que estan a la parte Orien tal de la Canal, al fin della, y vinieron por el Canal arrimados a los baxos, y hallaron un canal que entrava del canal de Bahama a la canal vieja: y caminando arrimados a estos baxos, vinieron a dar a los Roques, y de alli se bolvieron a la Habana.

Hizieron una descripcion de toda esta Canal, poniendo en sus alturas verdaderas, todos los Cayos que toparo, dando cuenta y razon de como procedieron. La qual razon y discurso, junto con la descripcion, embiò et Gouernador de la Habana at Consejo Real de las Indias, y se me entregò, para que por ella se descrivir se toda aquella Canal.

Mostrè esta descripcion a muchos Pilotos, de los que entendi que eran mas diestros y antiguos, y dixeron que les parecia muy bien aquella descripcion. Demas desto, conforma con otra relacion de otro Piloto, que los años antes fue a ha-

zer la misma diligencia.

Enmendose la canal vieja, segun la relacion de dos Pilotos, que llaman los Acostas, los quales muchas vez es han passado esta canal, y segun ellos la pintaron se puso en la Carta, dando sustito a todos los Cayos, y principalmente al Cayo Romano, donde corren peligro los nauios, y se han perdido muchos.

Pusose et Isleo blanco en su lugar, porque en el padron

antiguo no lo estaua.

Enmendose la isla de Iamaica, en quanto a la figura, que

en lo demas se quedo en su lugar.

Enmendose la ensenada de Samanà, en la isla de Santo Domingo.

Enmen-

Enmendose la costa de Honduras, por la relacion de Pedro Sanchez. Arias Pitoto, que ha nauegado esta costa muchas vezes.

Enmendose el golfo de Manambique, por relació de Mateo Jorge Piloto antiguo, y que en su tiempo nauego aquella

parte muchas vezes.

Enmendose por relacion del mesmo Mateo forge, la isla de Mugeres, y la isla de Sal, y otras cosas en aquella costa.

Enmendose la costa de Tucatan, que mira al Septentrion, poniendola en su derrota, como ella se corre.

Enmendose la costa de Caracas, en quanto a la distancia

de algunos puertos y rios.

Algunas otras cosas se enmendaron en el padron ordina-

rio de las Indias, como son baxos, y figuras de islas.

Enmendose la costa del Peru, des de Puerto viejo hasta el Estrecho de Magallanes, assi en las derrotas de como se corre aquella costa, como en el sitio y lugar de algunos puertos.

Enmendose la costa de Bacallaos, segun la relacion de

algunos Pitotos, assi Espanoles como Franceses.

Pues con esta queda acabada la Hydrografia que se tenia mandado hazer, solo resta poner dotrina de como se sabra la hora quando començò, o acabò el Eclypse de la Luna, observado segun la instrucion que dio suan Lopez de Velasco.

3

Hydrografia.

INSTRUCCION PARALAOBservacion del Eclypse de la Luna, y cantidad de las sombras que su Magestad mando hazer el año de mil y quinientos y setenta y siete, y los que se siguen, en las ciudades y pueblos de Espanoles de las Indias: para verificar la longitud y altura dellos, que aunque pudiera auer otros medios Matematicos paraello, se han elegido por mas faciles los que se siguen.

RIMERAMENTE, El Eclypfe de la Luna del año de mil y quinientos y ochenta y vno, sera a quinze dias de Iulio, en España despues de media noche; y en las Indias, despues de anochecer, mas o menos, fegun la mayor o menor distancia y longitud de las provincias: pero porque en esto ay duda, y en la computación de la hora diferencia, lo q

se ha de hazer, es lo figuiente.

Vn dia, o dos antes del Eclypfe, en parte descubierta, y desembaraça. da, donde el Sol toque en saliendo, y al ponerse, sobre alguna cosa de barro duro, cal, o yeso, o de madera, se haga vn plano, o llanura de hasta vna vara en quadro, a regla y niuel, de manera que quede lifo, è ygual de todas partes, y no mas alto ni leuantado por vna que por otra: y en el medio del con vn compas, que se podra hazer de madera (en caso que no le aya de otra cosa) hazerse han dos circulos redondos, vno detro del otro. desde vn mismo centro, que es el punto de enmedio del circulo, donde para hazerse se assienta el vn pie del compas, que para vn circulo estara abierto vna tercia de vara de medir, de punta a punta, y para el otro tercia y media.

Ý hechos los dichos circulos, pondrafe hincado en el centro y punto de enmedio, vn clauo, o estilo de hierro, o de madera, derecho, lifo, ydelgado, de vna tercia de largo justa, sin lo que estuniere metido en el plano, y leuantado a niuel, fin que este mas trastornado, ni caydo a vna parte que a orra, que se podra hazer y entender que esta bien, y gualando co el compas lo que huniere por vna parte y otra, desde lo alto del estilo.

hasta la raya o circunferencia del vno de los circulos.

Y hecho esto, mirarse ha con atención despues de salido el Sol, la parte y punto de la raya del círculo mayor por donde la fombra del estilo vinière a meterfe toda en el, y al tiépo que la estremidad y fin de la sombra estuniere sobre la misma raya y circunferecia del circulo, sin que estè nada fuera, ni merida del todo dentro, sino sobre la misma linea redon. da, harase vna señal, o punto sobre ella, en el medio del fin de la sombra: y lo mismo se hara despues en el cerco del circulo menor, quando la sombra entrare en el, que bien podra fuceder en algun tiempo y region, que la fombra no fe acorte tanto, pero como quiera que fea, como la fombra

fuere

fuere descreciendo y haziendose menor, se se yra siempre arrimando en el fin y estremo della alguna cosa que sirua de se al para que se vea si siepre descrece: y en la parte donde llegare a ser menor, que sera al punto de medio dia, hazerse ha otra señal y punto, y desde el medirse ha con el compas lo que ay justamente hasta la rayz y principio del estylo, por la parte donde echa la sombra, y en vua hoja, no de pergamino sino de papelhazerse han dos rayas o lineas de tinta derechas, vna tan larga justamente como la sombra quando mas pequeña suere, y otra ygual con la largura del estylo, desde la rayz y nacimiento del hasta lo alto, fin lo que estuuiere hincado, declarando por escrito sobre cada vna de las dichas lineas, qual es la medida de la sombra, y qual la del estylo, y assi misso a que parte yua la sombra quando se midio, si era al Septentrion y Norte, o al Sur y Mediodia, y el dia, mes, y año quando la dicha observacion de la sombra se hizo.

Y despues que la dicha sombra boluiere a crecer por la tardé, mirarse ha assi mismo con atencion por donde sale del circulo menor (si en el huniere entrado) y echarse en la circunferencia vin punto, quando el sin y estremidad de la sombra estuniere justamente sobre la misma raya, como se hizo quando entrana e y lo mismo se hara despues en el circulo mayor de asuera, echando otro punto por donde la sombra llegare

Y autendose tomado los dichos dos puntos de la entrada y falida de la sombra en cada uno de los circulos, echarase orro ponto tercero en la circunferencia de cada vno dellos, en medio de los dos primeros, de manera, que desde el punto por donde la sombra entrô en el circulo may or, hasta el dicho tercero punto, ava vgual distancia, y pedaço de circunfe rencia, que desde el hasta el orro punto por do la sombra salio, y lo mismo en el otro circulo interior y mas pequeño: y quitando el estylo de su lugar, ponerse ha vna regla bien ajustada, desde el punto de enmy din del vn circulo, hasta el del otro, y tirarte ha vna linea larga que atraviesse les circulos, y el plano, que se llamarà Linea Meridiana, porque yrà derecha del Norte al Mediodia; y si estuniere bien echada, passará pon el punto donde la sombra llegò a ser menor, y por el centro y agujero donde el estylo estudo hincado, partiendo cada uno de los circulos en dos partes yguales, o medios circulos, que se bolueran despues a partir por medio, echando en el medio de la circunferencia de cada vno de los dichos medios circulos va punto, que diste por venal espacio de los puntos por donde la Linea Meridiana los divide, y fale fuera de los circulos y tomados estos puntos en la mitad de los medios circulos, echarse ha con la regla otra linea que paffe por rodos ellos, y atraviesfe el plano, cruzando derechamente la Meridiana en el centro fobredicho, y assiento del eftylo, la qual linea yra derechamente de Oriente al Poniente, con la qual los fobre dichos circulos quedarán divididos cada vno en quatro partes yguales.

Y antes del dia del Eclypse, hazerse ha vninstrumento de dos hazes

en la forma siguiente, que sera facil de hazer.

a falir del.

En vn tablero de vna tabla, o mas, que sea de largo y ancho como vna

vara de medir, derecho, y lifo; hazerse ha en cada vna de las dos hazes vn circulo, puesto el vn pie del compas como en el medio tablero, y el otro abierto de punta a punta vna tercia justa de vara de medir, y en el punto, o centro de cada parte donde se huuiere assentado el pie del compas que estuuo quedo para hazer el circulo, pondrase leuantado vn estylo delgado, de hierro, o de otra cosa, de hasta vna tercia de largo cada vno, derechos y a niuel, de manera que a ninguna parte acuesten mas que a otra, como para la sombra queda dicho: y en el nacimiento de los estylos, junto a la tabla, colgarseles con vna lazada sloxa, vn hilo delgado con alguna plomadilla al cabo, que llegue a salir toda suera de la circunferencia de los circulos, o raya redonda, pero que no llegue a y gualar el anchor de la tabla.

Y el dia del Eclypse pondrase con tiempo el sobre dicho instrumento, leuantado de canto sobre el plano do se tomo la sombra, lo largo del dicho instrumento a lo largo de la raya, o linea que va de Oriente a Poniente, ajustado con ella de manera, que no este por vina parte mas metido en ella, ni sue por otra, ni mas trastornado a la parte del Norte, que a la del Mediodia, si no leuantado derecho, como se podra ver si lo esta por medio de los niueles, o hilos que colgaran de los estylos.

Y fiendo puesto el dicho instrumento como dicho es, echaranse lues go dos puntos, vno en la vna haz, y otro en la otra sobre la raya, o circuferencia del circulo de cada parte, por la parte por donde la cortare el hilo del niuel que colgare del estylo de cada vna de las dos hazes.

Y en anocheciendo, que començara a falir la Luna llena por la parte del Oriente, ponerse han personas para ello, que miren si la Luna sale perfetamente redonda, como faldra fino faliere eclypfada : y fi al falir fe mostrare defalcada en alguna parte de la redondez, o toda ella escurecida, assientese luego por memoria que tal sale, y en que tanta parte diminuyda:y fi saliere perfetamente redonda, estese mirando, hasta ver que fe comiença a escurecer: y quando determinada y claramente se entendiere que se escurece, echarse ha en la haz en que la Luna diere, vn punto en la circunferencia del circulo por donde la fombra del estylo la cor tare: y despues de passada la duració de la tiniebla y obscuridad de la Luna, yrase mirando quando la Luna acabare de cobrar toda su luz, yen viè. dose que està ya limpia de tiniebla, y redonda, hazerse ha otra señal, o punto en la dicha haz y linea circular, por donde la sombra del estylo la cortare. Y si en alguna region la sombra no llegasse al cerco del circulo, echarle ha el punto en la parte donde la lombra llegare en el fin y estremidad della.

Y esto acabado, en vna hoja grande, no de pergamino, sino de papel, de quatro pliegos juntos por las orillas, que vendra a ser tan grande como el tablero, hazerse ha vn circulo del mismo tamaño y anchor q sue reel de la parte y haz del instrumeto, donde la Luna y sombra della dio, y señalarase en el puto donde el hilo del niuel cayò sobre la linea circular, y los putos de la sombra del estylo, cada vno a la parte del puto del niuel, y tan apartados justamente del, como en el tablero estunieren, declarando por escrito, junto de cada vno dellos, qual es el del niuel, y qual

eldel

el del principio del Eclypse, y qual el del fin; de manera, que en todo y por todo sea semejante la figura del papel a la del instrumeto, y vna misma con ella de lo qual se hara yn duplicado, y otro del papel de las cantidades y medidas del estylo, y sombra del Mediodía, y con los nombres de las personas que se huuieren hallado a todo, los embiarán cada duplicado por si a su Magestad, en su Consejo Real de las Indias.


Y aunque por ñublados, o otro impedimento, el Eclypse no se pueda obseruar el dia sobredicho, tomarase la cantidad de la sombra del Mediodia en otro qualquiera en que se pueda hazer, y embiarase la medida della, y del estylo, como queda dicho, con relacion del dia, mes, y año en que se huujere tomado, auisando de la causa de no se aues podido tomar

el dia del Eclypse.

Observacion de la cantidad de la sombra, hecha en Madrid, 26 . de Setiembre, de 1577. anos, cuyo estylo sue de vna tercia de vara de medir justamente . Fue la sombra mayor

que el estylo esta cantidad, -

Observacion del Eclypse de la Luna, del año 1577. en 26. de Hebrero, y en Madrid, hecha por mi sua Lopez, de Velas-co, cosorme a la instrució y instrumeto hecho para las Indias. Comienço del Eclypse, el punto, c. Fin del Eclypse, el punto, d. Lugar del estylo, el puto, a. (ayda del perpediculo, el punto, b.



Observacion del Eclypse dicho, hecho con un Astrolabio muy corregido, y de mas de vna tercia de diametro, hecha el dicho dia.

La Luna començo a escurecerse en 41 grados, aunque no muy conocidamente que se le perdiesse la figura: en 42. ya se le começana a desbaratar el redondo: en 43. de altura ya se vio defalcada una buena parte de su figura, de manera, que al principio se pudo bien conocer en 41. grados, ò 41. y medio.

Acabose el Eclypse en 39 grados de altura, aunque toda via con algun poco de color por la parte donde se acabô el Eclypse, de manera que en los 39. grados justos, estaua como en los 41. del principio, y algo mas.

Iuan Lopez de Velasco se engaño en tomar la altura de la Luna al principio y fin del Ectypse, porque al principio tuuo mas de 41 grados y medio, y al fin mas de 30. Por la observació del instrumeto tomo mas cierto el principio y fin del Eclypse, porque concuerda con las demas observaciones, como se ha visto.

CAP. XIIII. Que trata como se sabra la hora quando començo el Eclypse, y quando acabo, por la obseruacion que se hizo, segun la instrucion de Juan Lopez de Velasco.

VNQVE Iuan Lopez de Velasco embio la instrucion de la diligencia que auian de hazeren las Indias, en la observacion del Eclypse, pero no dio alli orden ni dotrina, como

por la tal observacion se supiesse la hora quando començò, ni quando acabò, como parece por la misma instrucion impressa, la qual va aqui puesta, junto con la obseruacion, que segun la dicha instrucion hizo el mismo Iuan Lopez de Velasco en Madrid, el año de 1577. en

la qual observacion tampoco està puesto el modo como se ha de saber la hora del principio, ni fin del Eclypse, ni en todos los papeles que se me han entregado se ha hallado tal dotrina.

Pues visto que todas las observaciones que se hizieron en las Indias, vienen por la orden y instrucion que se les dio, y teniendo necessidad de saber la hora del principio, ofin del Eclypse: y visto que en la instrucion, ni en otro papel no se hallaua el modo de saber la hora, segun aquellas observaciones, imagine dos modos, para que por qualquiera dellos se pueda saber la hora del principio y sin del Eclypse, segun las observaciones hechas por la instrucion: el vno dellos es por dotrina de triangulos Essericos; en el otro se procede por via de vn instrumento.


Pues pongamos el modo que se tiene en saber la hora por estas observaciones, segun la dotrina de triágulos Essericos. Por la observació me dan el circulo de posició en q estuvo la Luna al principio, o al fin del Eclypse. El lugar de la Luna se sabe por algunas tablas, o Esemerides. Pues con estas dos cosas sabidas, junto con la elevacion del Polo del pueblo donde se haze la observacion, se sabe la hora quando comiença, o acaba el Eclypse.

Pues sea en la figura siguiente, ab c d, el Orizonte: a e c, el Meridiano: b e d, el Vertical que va del Zenit al Oriente, y Poniente: b n d, la Equinocial: a g c, el circulo de posició en q estuuo la Luna al tiepo del principio, o sin del Eclypse, como se colige de la observacion hecha segun la instrucion. Sea, n h K, la Eclyptica: el punto, n, principio de Libra: sea fg h, el camino de la Luna, el qual se corta con la Eclyptica en, h, donde sera la cabeça, o cola del Dragon. Pues sera el punto, g, el lugar de la Luna, donde se cortan el circulo de posicion, y el camino de la Luna: pues ha de estar en entrambos, sera necessario que este en el punto, g. Tirese del Polo del mundo, m, y n Meridiano que passe por el centro de la Luna, que sera, m g, el qual corta a la Equinocial, en el punto, q. Pues para saber la hora, tenemos necessidad de saber que tan grande es el angulo, c m g, el qual se sabra desta manera.

Lo primero, tenemos necessidad de saber la declinación de la Luna, que es el arco, q, g. Esta se sabra por el primero Problema de las tablas

de Direccion de Iuan de Monterregio, o por nuestro Astrolabio, en el capitulo 22. de la segunda parte: y esta declinacion añadida, o quitada de vn quadrante, segun que suere Septentrional, o Meridional, quedarà el arco de Meridiano que ay de la Luna al Polo del mundo, que es el ar-

co,g m. Pues en el triangulo, a mg, estan conocidos los lados, a m, g m, porque el lado, mg, acabamos de dezir como se sabe. El lado a mies la altura del Polo, la qual se sabe por la obseruacion que se hizo antes del Eclypse, para tomar la b lineaMeridiana, por la fom bra mas corta que hizo el estylo recto. El angulo mag, se sabe por lo que el circulo de posicion se leuanto, quando la Luna llegò al tal circulo de posició, al principio del Eclypfe, o al fin, que pongamos




fe leuanto el arco de vertical, d p, el qual arco, d p, fe sabe por la sombra que el estylo q estaua en el cetro del vertical hizo en la circunferecia, co mo consta de la figura de la observació. Pues sabido el arco, d p, sabese el complemento, p el luego tambien en el angulo, m a g, estan conocidos los dos lados, g m, a m, con el angulo, m a g: y sabese, que la perpendicular que sale de la conjunción de los dos lados conocidos, cae dentro del triagulo luego por la 30. del libro 4, de los Triangulos de luan de Monterregio, conocerse han los demas angulos. Pues conocido el angulo a m g, quitandole de vn semicirculo, quedará conocido el angulo, c m g, luego tendremos conocida le distancia de la Luna al Meridiano.

Si entonces estuuiera el Sol en oposicion de la Luna, otro tanto estu-

uiera el Sol apartado del Meridiano opuesto, y quedaua puntualmente conocida la hora, pero faltara de tiempo para la hora que assi se hallare, lo que tardare el primero mobil en passar la hora de incidencia, que le faltan la Luna para llegar a la oposicion del Sol, o los que huuiere passado, si fuere al fin del Eclypse: y hecha esta ygualacion, quedarà fabida la hora.

En esta figura se vee claro lo que acabamos de dezir, confiderando el centro de la Luna, y el exe de la sombra de la tierra, que es lo q falta para la oposicio.



Es de aduertir, que vnas vezes tarda la Luna mas que otras, despues que se comiença a eclypsar, hastallegar a la oposicion del Sol, que quando el Eclypse es muy total, tarda mas en llegar a la oposició despues que comiença a eclypfarfe, que no quando es parcial, porque entonces fon mas los minutos de incidencia: pues segun sueren mas o menos estos minutos, se hara la ygualacion. Ha se dicho esto para el que quisiere adelgazar mucho las cosas, pero aunq se tomasse en esto que vamos tratando, por opolicion el punto que comiença, o acaba el Eclypse, no sera el error de dos,o tres minutos de tiempo; porque lo mas que pueden ser los minutos de incidencia, es la cantidad del femidiametro de la Luna, y el semidiametro de la sombra de la tierra, que entrambos juntos, lo mas que hazen es poco mas de vn grado, el qual passa el primero mobil en quatro minutos de tiempo. Pero pocas vezes sucede, que los minutos de incidencia sean entrambos semidiametros juntos, que para esto auía de fer el Eclypse estando el Sol en la cabeça, o cola del Dragon, y esto acontece raras vezes.


Todo esto podra considerar, el que segun ellas observaciones quisie-


re saber la hora del principio, y fin del Eclypse.

Ay mas que aduertir, que para faber la declinación de la Luna, es necessarios faber su lugar verdadero al tiempo que començo el Eclypse, para faber la latitud que tiene: y como no sabemos la hora de quando comiença el Eclypse, no podemos saber su lugar verdadero; luego tam poco sabremos su declinación? A esto digo, que por las Esemerides, o algunas tablas, se sepa quando sera el principio del Eclypse, y para esta hora se puede hazer la cuenta de la declinación, que aun se nel lugar de la Luna se errasse medio grado, o vno (lo qual no es possible) en la declinación aura poca diferencia, y no sera cosa sensible lo que el angulo c m g, sera mayor o menor: y assi no aura diferencia en la hora, que sea de consideración, principalmente en distancias tan remotas.

Esta operacion es muy laboriosa, principalmente para los que no fueren muy Matematicos, por lo qual haremos vn instrumento, que siendo de vn razonable tamaño, se sabra con el la hora, tan cierto como por los numeros, alomenos aura poca diferencia. Demas desto, seruirà este instrumento para otras muchas operaciones, y algunas muy necessarias a la nauegacion, como se verà en algunos vsos que del se pondran.

Siguese el instrumento que se puso en la primera parte, por el qual se sabra la hora quando començo, o acabo el Ectypse, segun las observaciones que se hizaeron por el instrumento que manda la instrucion.





CA P. XV. Que enseña como se sabra la latitud de la Luna, por este instrumento.

ABIDA La longitud de la Luna, por efemerides, o tablas, como esta dicho, por las mis mas se sepa el lugar de la cabeça del Dragon. Esta cabeça del Dragon, se ha de imaginar que està en el centro del instrumento: tambien se ha de imaginar que los puntos, a, c, son los Polos de la Eclyp-Ee 4 tica,

tica, y los circulos que van del punto, a, al punto, c, son circulos de longitud; y los que cortan a estos, son para-

lelos de latitud; y la linea, b d, es la Eclyptica.

Pues esto assi entendido, veremos en las Efemerides quanto està apartada la Luna del Caput Draconis: y otro tanto se contarà por los circulos de longitud, imaginando (como està dicho) el grado en que està el Caput Draconis, en el centro del instrumento. Esta cuenta se hara po la linea, e d, començando del punto, e, caminando para el punto, d, fegun la fucession de los fignos; y en llegando a lapostrera circunferecia, se boluera por la misma linea, de: y sino suere acabada la longitud que ay del Caput Draconis a la Luna, quando se llegue con la cuenta al punto, e, se passarà co la cuenta del punto, e, para el punto, b, y se boluerà del punto, b, para el punto e, siendo menester. Pues vease segun esta cuenta, donde fe acaba la longitud que ay entre el Caput Draconis y la Luna, y tener cuenta con el circulo de longitud que por alli passare.

Hecho esto, se tire vn hilo, o vna regla por el centro e, y por cinco grados apartada del punto, d, para el punto, a: vease entonces donde esta regla, o hilo corta al circulo de longitud que se acabò de hallar, y en el punto donde se cortaren, alli està la Luna; y el paralelo que por alli passare mostrarà la latitud que tiene la Luna. Verse ha si es Septentrional, o Meridional: si el paralelo que passa por el lugar de la Luna estuuiere de la linea

b d, al Polo, a, sera Septentrional; y si estuuiere a la otra parte, sera Meridional.

(...)

Hydrografia. 167 CAP. XVI. Que enseña como se sabra la declinacion de la Luna.

> ABIDA La latitud de la Luna, como està dicho, se sabra facilmente la declinació. En esta operación se ha de imaginar, que los puntos, a, c, son los Polos de la Eclyptica, y el Polo, a, es el Septentrional: y ha se de

imaginar principio de Aries, en el punto, e; y Cancer en d: y boluiendo de alli, segun la sucession de los signos, por la linea, d b, fera Capricorno en, b, y fin de Piscis en el punto, e. Pues segun esta imaginació, se vea en las Efemerides, el grado en que està la Luna al tiepo que quiero saber su declinacion, y este hallado, en la linea, b d, segun la orden de los fignos que auemos dicho, fe vea el circulo de longitud que passare por el tal grado; y por el preceto precedente se sabe la latitud. Pues vease el paralelo de latitud Septentrional, o Meridional, segun fuere, donde se corta con el circulo de longitud, y alli se haga vn punto. Esto alsi hecho, se rebuelua el planisferio, ABCD, hasta que el Polo, A, este apartado del Polo,a,por 23. grados, 28. minutós: y estando assi fixo el planisferio, ABCD, se vea, que paralelo de los del planisferio, ABCD, passa por el grado de la Luna, que este tal paralelo mostrarà la declinacion Meridional, o Septentrional, segun que estuuiere de la linea, BD, porque si està a la parte del Polo, A, sera Septentrional, y si a la parte del Polo, C, sera Meridional. En esta opera-

cion, los puntos, A, C, representan los Polos del mundo, y la linea, BD, la Equinocial.

(?)

CAP.XVII. En que se enseña por este instrumento, saber la hora del principio y sin del Eclypse, segun las obseruaciones de la instrucion.

OR Las observaciones de la instrucion que se fe hizieron antes del Eclypse, se sabe la altura del Polo del pueblo donde se hizo la observacion. Por el capitulo precedente se sabe la declinacion, y por la observacion el circulo

de posicion en que estuuo la Luna al principio, o fin del Eclypse. Pues aora tenemos de hazer otra imaginación, que los puntos, a, c, del planisferio inferior, auemos de imaginar que son las comunes seciones del Meridiano y Orizonte: y los circulos que van del punto, a, al punto c, son circulos de posicion: y la linea, b d, es el Vertical que va de Oriente a Poniente. En el planisferio superior, el punto, A, imaginaremos que es el Polo del mundo Septentrional: y el punto, c, el Meridional: y los circu los que van de Polo a Polo, son Meridianos, o circulos horarios: y los que cortan a estos, son paralelos de declinacion: la linea, B D, es la Equinocial. Esto assientendido, pongase el Indice del Polo, A, en la eleuación del polo del pueblo donde se hizo la observación, contandola del punto, a, para el punto, d: y estando fixo el planisferio superior, se vea el paralelo de la declinación de la Luna, donde corta el circulo de posicion que se hallò por la observacion. Este circulo de posicion se ha de contar de la linea, a c, para el punto, d. Pues visto donde se cortan el circulo de posicion, y el paralelo de la declinacion de la Luna, se vea el Meridiano, o circulo horario, que passa por la talsecion, que este mostrarà la distancia de la Luna al Meridiano que passa por el Zenit, que es el yltimo de los Meridianos: y estando el Sol en la parte opuesta de la Luna, saberse ha quanto dista el Sol del Meri-

Meridiano opuesto: luego saberse ha la hora, que es lo

que se pretendia hallar: Todas las cautelas que se aduirtieron quando se tratò esto mismo por la dotrina de triangulos, se han de entender aqui, que tampoco hazen error sensible.

(AP. XVIII. Que enseña como por este instrumento se hallarà la altura del Polo, a qualquiera hora del dia.

VCHOS Modos de saber la altura del Polo fuera del medio dia se hallaran escritos, y en nuestro libro de reloxes tengo puesto algunos preceptos acerca desso, y tambien en

el libro del Astrolabio: pero para en la mar, ninguno se puede hallar mejor que el que por este instrumento se

haze, que es de la manera que se sigue.

Para esta operacion se ha de imaginar, que los puntos,a,c,del planisferio inferior, son los Polos del mundo:y el punto,a, el artico: y los circulos que van de polo a polo son Meridianos, o circulos horarios: y los circulos que corta a estos, son paralelos de declinacion: y la linea,b d,la Equinocial. El punto, A, del planisferio superior, se ha de imaginar que es el Zenit: y los circulos que salen del Zenit son Verticales: y los que cortan a estos fon Almicantarades, o circulos de altura : la linea, B D, es el Orizonte. Esto assi entendido, queriendo saber la altura del Polo fuera del medio dia, se haran dos obseruaciones, tomando en cada vna la altura del Sol fobre el Orizonte. Quando se tomare la primera vez la altura del Sol, es necessario que se tenga vna caxa con vna aguja, y en el centro desta caxa se leuante vn estylo que haga angulos rectos con la superficie della; la qual caxa tendra al rededor del estylo vn circulo, partido en 360. partes, como se acostumbra. Pues al tiempo que se està tomando

mando la altura del Sol, luego subitamente se ponga la aguja en vna parte señalada de la caxa, y se vea la sombra del estylo en que parte corta de la circunferencia graduada, y hazer alli vna señal. De alli a vna hora, o mas, se torne a tomar la altura del Sol, y al mismo tiempo se ponga la aguja donde se puso la primera vez: y estando assi, se vea donde corta la sombra del estylo la circunferencia, y hazer alli vn punto, y contar los grados que ay entre los dos puntos que se han puesto en la circunferencia.

En estas dos observaciones tenemos tres cosas; las dosalturas del Sol, y la distancia que ay entre los dos Verticales donde se tomaron las alturas: la declinación del Sol, la fabremos por el dia que hazemos la obferuacion. Pues estas cosas conocidas, ordenaremos desta ma nera el instrumento: Si las observaciones sueren por la mañana, tomarè en el planisferio superior dos Verticales, que estè el vno del otro la distancia que hallè en la circunferencia de la caxa, entre las dos sombras del esrylo, que se hizieron en las dos observaciones: y en estos Verticales, en el mas llegado a la linea, A C, contare por los Almicantarades la altura del Sol, en la primera observacion, y en el otro Vertical, estare la altura del Sol de la fegunda observacion, haziedo en entrambos Verticales, señales donde fenecen las alturas. Estos Verticales (como està dicho) si fuere por la manana se tomaràn los mas llegados a la linea, A C. Hecho esto, se rebuelua el planisferio superior, y se ponga la vna señal de la altura del Sol que se puso en el Vertical, en el paralelo de la declinacion del Sol: y si entonces la otra señal que se pu so en el otro Vertical cayere en el mismo paralelo de la declinacion del Sol, el planisferio superior està puesto sobre el planisferio inferior, segun que nuestro Zenic fe aparta de la Equinocial: y assi el Indice que està en

el punto, A, mostrarà esta distancia, que es la altura del Polo.

Pero si puesta la vna señal de la altura del Sol, que està en el Vertical, en el paralelo de la declinacion del Sol, la otra señal de la altura del Sol que està en el otro Vertical, no cayesse en el mismo paralelo, es necessario tomar otros dos Verticales mas llegados al Meridiano, guardádo siempre entre los dos Verticales, la distancia que se hallò en la circunferencia de la caxa, entre las dos sombras del estylo. Pues assi se yrà atentado, hasta que las señales de la altura del Sol que se pusieron en los Verticales, caygan en el mismo paralelo de la declinació del Sol, y entonces (como està dicho) el Indice que se se al punto, A, mostrarà lo que el Zenit se aparta de la Equinocial, que es la altura del Polo. Quanto mas lexos del Mediodia se hizieren las observaciones, sera mas precisa la altura que se tomare del Polo.

Estas mismas observaciones se pueden hazer por la tarde, guardando en todo lo que se ha dicho de las observaciones que se hizieron por la mañana. Tambien se puede hazer vna observacion antes del medio dia, y otra despues: pero en esto puede auer algun inconveniente, y assistera mas acertado, hazer las observacio-

nes por la mañana, o por la tarde.

C A P. XIX. Que enseña saber la hora por este instrumento, dada la altura del Polo: y la declinacion del Sol, y su altura sobre el Orizonte.

N Esta operacion los puntos, a, c, del planisferio inferior, son los Polos del mundo: y los circulos que van del yn Polo al otro, son circulos horarios: y los que cortan a estos, son paralelos de declinacion: la linea, b d, es la Equinocial. En

Ff

el planisferio superior, el punto, A, es el Zenit; y los circulos que salen del Zenit son Verticales; y los que cortá a estos son Almicantarades; y la linea, B D, el Orizonte. Pues tomada la altura del Sol, se ponga el Zenit, A, en la eleuación de Polo, y la altura del Sol se cuete por los Almicantarades, y vease el Almicantarad donde senecio la altura del Sol, donde corta al paralelo de su declinación, que el circulo horario que por alli passare mostrara la hora que corre antes, o despues de medio dia.

(AP. XX. En que se pone vna aduertencia acerca de la longitud del mar Mediterraneo.



A Descripcion del mar Mediterraneo que hazen los que le nauegan, es diferente de la que el realmête tiene, como queda dicho en su lugar. La razon es (como auemos dicho) porque los que nauegan este mar no nauegan por alturas, sino por derrotas, y distancias y segun sus descripciones, tiene el

mar Mediterraneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta el puerto de lafa, que Ptolomeo llama Yope, que es en el fin del dicho mar, 700. leguas
Españolas. Pues hagamos la cuenta segun esta distancia, quantos grados
tiene de longitud el mar Mediterraneo, por el paralelo de 40. grados,
que es el que passa por medio del mar Mediterraneo, vale cada grado
45. minut. 57. segund. 46. terceros de Equinocial, que hecha la cuenta de
las leguas que cabe a cada grado del dicho paralelo, segun que 17. leguas
y media hazen vn grado de Equinocial, vienen a ser doze leguas. Pues
partamos 700. leguas que tiene de largo el mar Mediterraneo, por doze, y cabeles 58. grados, y tanto tiene de longitud el mar Mediterraneo
del estrecho de Gibraltar, hasta el fin del. Esta longitud concuerda con la
que pone Ptolomeo, que bien se puede creer, que pues el viuia en Alexandria, que tendria esto muy bien sabido. Demas desto, ponen esta misma longitud todos los Cosmograsos graues, sin quedar ninguno.


Los Portuguesses siguen en sus descripciones vniuersales, la descripcion que hallan hecha por distancias del mar Mediterraneo: la qual distancia la ponen en la Carta, como si el mar Mediterraneo estuuiera en la Equinocial. De donde se sigue, que las 700, leguas que tiene de largo el mar Mediterraneo, si no ocupen mas de 42 grados de longitud, lo qual euidentemente es salso. Pero como la intencion de los Portuguesses sue siempre llegar el Cabo de Buena Esperança al Occidente, acomodaron la descripcion que hazen los que nauegan el mar Mediterraneo a su intencion, comparando lo que se nauega por derrota y altura, con lo que se nauega por derrota y distacia: lo qual en Mapas vniuersales no se puede

hazer

hazer, y en esto se han engañado muchos de los que han escrito de Cosmograsia, por no entender como se escriue la Hydrograsia. Porque los que nauegación por derrotas y distancias, sin tener cuenta con altura, ni con la variación de la aguja: lo qual es causa de que las costas, ni puertos no se pongan en sus longitudines, ni latitudines: lo qual qualquiera que sucre algo Matematico lo entendera facilmente. Pero los Castellanos, y Portugues es, como nauegan por derrota y altura, y la derrota es la mesta que los Pisotos piensan que lleuan, porque dan el resguardo a su aguja, segun la variación que le hallan: y desta suerte ponen los puertos, y lo demas de la Carta en sus longitudines verdaderas. Todo lo qual quiero demostrar aqui, para satisfación de los que no sueren muy Matematicos.

Sea, a b, vn paralelo de 24. grados de latitud: y, fc d, sea otro paralelo de 20. grados de latitud; la diferencia son 4. grados. Tirense dos Meridianos, a c, b d, que sean paralelos, como lo demostramos en el segundo y tercero capitulo. Y pongamos, que del vn Meridiano al otro ay 4. grados de longitud: de manera que, a c, a b, son y guales. Pongamos que en el punto, b, està vn puerto, y en, c, está otro etirese, b c, claro está que nauegando del punto, b, al punto, c, que tengo de nauegar por el Nordeste. Luego si se diere el resguardo a la aguja que tiene de variación; y siguiere el rumbo del Nordeste, quando llegare a estar en 20. grados de altura, estar à en el punto, c, en el mesmo Meridiano que està el punto, a, lo qual no podre hazer si nauegare por otro qualquiera rumbo. Porque si

nauegare por el rumbo, b f, qua do estuniere en el punto, f, que tendre 20 grados de altura, no estarà en el Meridiano, a c. Y si nauegare por el rumbo, b e, quado estuniere en 20 grados de altura, no estará en el Meridiano a c. Pues siguese de aqui, que si nauegare por los rumbos, b f, b e, pensando que nauega por el Nordeste, quando llegasse a estar en 20 grados de altura, no estaria en el Meridiano, a c. Pues queda de aqui claro, que nauegando por el Nordeste, que nauegando por el Nordeste, que a segando por el Nordeste en el punto, se por el nordeste en el punto, se por el porte de segando por el Nordeste, que a segando por el Nordeste, que a segando por el Nordeste en el punto el



qualquiera altura que llegare, fera tanta la diferencia de longitud como de latitud: pero fi nauegare por rumbo mas llegado al Meridiano que el Nordeste, fera mayor la diferecia de latitud, que no la de longitud:

> y fi el rumbo por donde nauegare fuere mas apartado del Meridiano que el Nordeste, sera mayor la diferencia de longitud, que no la de latitud.

> > (?)

CAP. XXI. Que enseña el modo que se deue tener para hallar el numero de pies, o passos que tiene el arco de vin circulo mayor, que responden a vn grado del dicho circulo, descrito en la superficie de la tierra, segun que el tal circulo està dividido en 360 partes.



ORQVE Los grados de longitud que ay de vnas partes a otras, algunas vezes, quando no se hallaua otro mejor medio, se regulauan por las leguas que se hallauan de la vna parte a la otra, tomando por cada grado 17. leguas y media, como comunmente se toman en España: y porque esta suma de leguas aun no está bien aueriguada, he querido poner el modo como esto se

podria aueriguar. Son tan varias las opiniones que se hallan acerca de la medida de la circunferencia de la tierra, que no se sabe determinadaméte qual sea la mas cierta, porque hasta aora ninguno de los que tratan desta cantidad, pone que aya hecho observacion della. Teodosio, y Eratostenes autores antiguos, ponen que acada grado del circulo maximo de la tierra le responden, 700. estadios: y toda la circunferencia tiene 252000. estadios. El modo con que esto se halla, dizen, que en vulugar se tome la altura del Polo muy precisamente, y que despues se vaya caminando por vn circulo Meridiano, muy derechamente, hasta que el Polo se leuante vn grado mas de lo que se hallò lo primero; y que medida la distancia entre las dos observaciones, hallarán que contiene 700. estadios.

Este modo de hallar la cantidad de la circunferencia de la tierra, es bueno, si se hallara camino tan llano y derecho, por debaxo del circulo Meridiano, que no impidiera la observacion, pero dificultoso seria de hallar esta comodidad. Christoforo Clauio pone otro modo, que dize que es mas acomodado, que es hallar dos ciudades que esten debaxo de vn mismo Meridiano, y sabida la altura de Polo de cada vna dellas, se sabra la diferencia de las alturas: y por esta diferencia, y la distancia de camino que ay entre entrambos, se sabra la cantidad que responde a cada grado de la circunferencia de la tierra. El mismo inconveniente tiene efte modo que el de Eratostenes, porque allende de que es dificultoso de hallar dos ciudades que esten debaxo de vn mismo Meridiano, tambien feria dificultoso de saber la distancia de la vna a la otra, por auerse de me dir por el circulo Meridiano que va de la vna a la otra, y fera dificultofo de hallar el tal circulo, ran llano, y sin inconuenietes como para este eseto se requiere. Maurolico pone otro modo que refiere Clauio en su Esfera, que tiene mayores inconvenientes.

Pues dado caso que estos modos suessen faciles y ciertos, en la pratica ninguno pone que lo aya observado: y quando la opinion de Eratostenes suesse verdad, y que el lo huniesse observado, y hallasse que a cada grado de la tierra le respondian 700 estadios, ay en esto algo en q dudar, porque

porque no tenemos cierta noticia que tan grandes fuelsen estos estadios? fegun la medida de que aora fe v fa, como fon pies Castellanos, de los que la vara Castellana tiene tres pies : y lo mismo es de otra qualquiera medida que se vsa en otras partes: y assi no se pueden reduzir estos estadios a las medidas de leguas, o millas, o pies, o passos de que aora vsamos: de donde ha venido de dar mas y menos leguas al grado de la tierra, porque algunos dan 15. leguas Españolas, otros 16. y lo mas comun, 17. y media, y otros 18. y otros mas. Estas diferencias provienen de dos causas: La vna es (como auemos dicho) por no faber los estadios g contiene vna legua. La otra es, que vnos hazen las leguas mayores que otros: pero comunmente en España se tiene por lo mas cierro, que responden a cada grado de la tierra 17. leguas y media; aunque desto no se halla observacion, mas de la comun opinion. La legua Española, alomenos la que se pratica en toda Castilla, tiene 15000, pies, de los que tres hazen v na vara Castellana, como consta por las medidas que se han hecho, para aueriguar las juridiciones de las Audiencias Reales, como se ha medido de Madrid hasta Alcala de Henares, por saber si estana dentro de las cinco leguas que tienen juridicion los alguaziles, para hazer sus execuciones, y visitas. Lo mismo se ha medido de Valladolida Tordesillas, y la vna y la otra villa estan fuera de las cinco leguas, segun que cada legua tiene 15000. pies de los que auemos dicho.

Pues visto las opiniones diferentes, y que nadie dize que deste particular aya hecho observacion, por la dificultad que tienen qualquiera de
los modos que auemos dicho, he querido poner vn modo, que a mi parecer es mas facil y mas cierto, que los que hasta aqui se saben: y aunque
parezea que el discurso es largo, es facil de poner en pratica, y no está sujeto a tantos inconuenientes como los que se han dicho, si el observador
fuere tan diligente que guarde los precepros que aqui diremes. Muchos auria que provassen esta verdad, sino se les pusiera desante la discultad que tiene auer decaminar por vn mismo Meridiano, porque no
fe halla camino tan derecho que vaya doze, o quinze leguas por vn Meridiano: y si quisiessen caminar por debaxo de vn mismo Meridiano, no
auiendo camino, no faltan estoruos que lo impiden, como son rios, montes, barrancos, y otros muchos inconvenientes, y assi nadie se pone en
essos trabajos. Por lo qual auemos imaginado vn modo, que siguiendo el
camino ordinario, se podra conseguir lo que se pretende, el qual es co-


mo se sigue.

Lo primero que para hallar lo que se ha propuesto se deue hazer, es buscar en alguna prouincia vna parte de tierra que sea tan llana, que se halle los caminos ordinarios detal manera dispuestos, que de tres dellos se pueda hazer vn triangulo, ABC, que por lo menos el menor lado se ga diez leguas, que nuchas prouincias se hallará esta comodidad. Pues pongamos que los tres puntos, ABC, son tres ciudades, y que estan en tierra tan llana que se puede caminar de la vna a la otra muy derechamente, sin que se hallen inconvenientes que sea necessario de hazer rodeos: y quando el camino hiziesse alguna buelta, como no sue se de 20,0 à 30. passos adelate, no serà sensible el error que en esto se puede causar.

Ff 3

Pues sea el punto, B, el pueblo de donde se comiença la observacion, en donde se pondra vna tabla llana equidistante al Orizonte, en donde se descrinirà la linea Meridiana que pongo sea, BD. Hecho esto, se tome el angulo q haze esta linea Meridiana con el camino, B C, con instrumento que para este proposito se ha dispuesto. De la misma manera descrivirê otra linea Meridiana en el comienço del camino, BA, que tambien sera B D, por ser paralela della: y tomarse ha el angulo que , B D, haze con el camino, B A, y juntos los angulos, D B C, D B A, se conocerà el angulo, ABC, que hazen los dos caminos, BA, BC, que no son otra cosa sino dos arcos de circulos máyores descritos en la superficie de la tierra, que passan por los pueblos, ABC. Hecho esto, se comience a caminar por el camino, B C, si fuere el mas llano y derecho, y sino por el que lo fuere, midiendo todo el camino desta manera. Siendo dos personas, aora vayan a pie, o a cauallo, tendran vna cadena hecha de hilo de hierro delgado, que tenga de largo 50 pies, de los que tres hazen vna vara Castellana: y puesta la vna persona con el principio de la cadena en, B, la otra camine por el camino, B C, hasta que la cadena este estirada: y el que camino por, B C, hara vna feñal donde llegò la cadena, y luego caminarà para adelante, hasta que el quedô en, B, llegue a la señal que dexò el que va delante, y este hara otra señal donde llega la cadena, estando el principio della en la señal que dexò atras: y desta suerte se yra midiendo todo el camino, teniendo cuenta con el numero de cadenas que huniere en todo el, hasta llegar al punto, C. Llegado que sea al pueblo, C, se descriuirà la linea Meridiana, como fe hizo en el punto, B, y se sepa el angulo que haze con ella el camino, CB. Tambien se vea el angulo que con ella haze el camino, CA, y juntados los dos angulos que los dos caminos, CB, CA, hazen con la linea Meridiana, se tendra el angulo, BCA, que los di-

chos caminos, CB, CA, hazen vno con otro, que es el angulo BCA. Despues desto se vaya al pueblo, A, y se sepa el angulo que hazen los caminos, AC, AB, con la linea Meridiàna, como se ha hecho en los otros, y quedarà conocido el angulo, BAC, que



hazen los dos caminos, AB, AC. Pues en el triangulo, ABC, estan conocidos sus angulos, luego conoceremos sus lados en grados, segun que el circulo se diuide en 360. por la 33. del libro 4. de los triangulos de Iuan de Monterregio, y por la 62. de los triangulos Essericos de Clauio. Pues teniendo conocido el lado, BC, en pies, y en grados, partiremos los pies por los grados, y en el quociente tendremos los pies que caben a cada grado, y por el consiguiente las leguas, tomando 15000. pies por cada legua; y desta suerte quedará sabido las leguas que caben a vin grado de los guas y desta suerte quedará sabido las leguas que caben a vin grado de los

172

de la tierra. Si el que hiziere esta observacion obrare con destreza, y en lugar que tenga la disposicion que auemos dicho, es la que menos incouenientes tiene. Si la linea Meridiana que se tira de qualquier angulo cayere fuera de los lados que contienen el tal angulo, entonces se restarà el angulo que está entre el lado mas cercano a la Meridiana, del angulo que haze el lado mas remoto della, y que darà el angulo que ay entre los dos lados.

(AP. XXII. Que trata de los viajes y nauegaciones de las Indias Occidentales.

N Todos los mares de las Indias, islas, y tierra Firme del mar Oceano, de mas de los viajes particulares q fe hazen devnas a otras prouincias de que fe haze mención en las descripcio-

nes particulares, ay quatro nauegaciones generales. La primera y mas antigua, la que se haze delde España a las Indias, hasta el nombre de Dios y Tierrasirine, y Nueua España. La segunda, desde España al rio de la Plata, y estrecho de Magallanes, que es la menos frequentada. La tercera, desde Panama y costa de Guatimala y Nicaragua, a las provincias del Peru, y Chile. La quarta, començada de pocos años aca, de la Nueua España hasta las islas del Poniente, y contratació de la China.

Carrera de las Indias.

A Primera nauegacion y mas cursada, que llama Carrera de las Indias, es desde el puerto de Sanlucar de Barrameda en España, para el puerto de san Iuan de Vlua en la Nueua España, hasta donde se nauegan como mil y setecientas leguas de viase, en dos meses y medio, mas, o menos, segun los tiempos: y para el nombre de Dios en Tierra firme, hasta donde desde España se nauegan mil y quatrocientas leguas en dos meses largos. Para entrambas partes se va por las Canafis.

rias, y de alli por la isla Dominica, hasta baxar en 15. ò 15. grados y medio de altura en que està la dicha isla, de donde se aparta la derrota que va a Nueua España de la que va a Nombre de Dios, que desde esta isla es muy poco lo que se abaxa de altura hasta Cartagena, y desde alli al Nombre de Dios. La que va a Nueua España, torna de la isla sobre dicha a subir en altura, hasta 17. grados y mas, por donde va costeando por la parte del Mediodia las islas de San Iuan, y la Española; y por encima de Xamayca, y la isla de Cuba, hasta lo mas Oc-

cidental della, y de alli a San Iuan de Vlua.

A la buelta bueluen entrambas las flotas de Nombre de Dios, y la de Nueua España a juntarse en el puerto de la Habana, que esen la costa Septentrional de la isla de Cuba, de donde vienen a desembocar por la canal de Bahama, y vienen en conserua subiendo en 39. grados de altura, y passan por las islas de los Azores, donde suelen tomar refresco: aunque por no topar con las armadas de los cossarios estos años, vienen por mayor, o menor altura, hasta venir a reconocer el Cabo de San Vicente en España, en la costa de Portugal, y de alli al puerto de Sanlucar: auiendo nauegado de torna viaje de las Indias a España, las flotas que vienen del Nombre de Dios, como mil y seyscientas leguas: y la de la Nueua España, mil y quatrocientas: todo segun la estimacion de los Marineros.

Tiempos desta nauegacion.

O S Tiempos conuenientes para esta nauegació, y determinados con la experiencia, para huyr de los peligros que en esta carrera de las Indias suele auer. Para nauegar para la Nueua España, se deuen partir desde principio de Abril hasta passado Mayo, porque

no se passe el golfo de las Yeguas en inuierno, y se llegue a las islas del mar del Norte antes de Agosto, porque de alli adelante comiençan los Nortes, y tempestades de los Vracanes. Para yr al Nombre de Dios, se deue salir de España en todo Agosto, y Setiembre, porque no los tome el inuierno antes de llegar alas Canarias,y para que puedan llegar al Nombre de Dios, en principio de Nouiembre, quando comiença aquella tierra a fer menos enferma. Para la buelta de las Indias a Elpaña,es eltiempo mas conuiniente, del nombre de Dios por Hebrero, de Nueua España por Março; de manera que se juntan las flotas en la Habana por Abril, quando ya en aquella mar cessan las tempestades de los Nortes, y assi se viene a nauegar el golfo del Sagarço, y el de los Azores, en tiempo de verano, quando son menos tormentolos, y se llega a España por Iulio y Agosto, quando no ay peligro de vendabales, ni de otra cosa sino de cossarios.

De Seuilla a Sanlucar de Barrameda.

A Nauegacion y carrera de las Indias, se comiença des des Seuilla, donde en el puerto de las Muelas, que es en el rio de Guadalquiuir (que hasta alli, y mas arriba llega la creciente de la mar) los nauios se ponen a la carga, y son visitados de la primera visita por los Visitadores de nauios; y si son del porte que han de ser conforme a las ordenanças, y si estan estancos y salidos de carena, para poder nauegar y recebir carga, se les da licencia para hazer el viaje, y se manda la carga que den lleuar, y las armas, y municiones, bastimentos, y otras cosas de que se han de proueer: y despues de armados y proueydos, y començados a cargar, los nauios grádes que demandan mucha agua, se parten con hasta cincuenta

cuenta, o cien pipas no mas, porque puedan nauegar por el fondo del rio, q es de seys braças hasta ocho. Las Vrcas, y nauios medianos, a media carga se bueluen a visitar de la segunda visita, para ver si van conforme a lo que que se les manda en la primera, y se les da licencia para partirse, y alijar la ropa que suere menester para passar los baxos del rio, y abaxar al puerto de Sanlucar, hasta donde ay 15 leguas por mar y portierra, y para nauegarlas, es el viento Nordeste el que mas sirue.

Salidos del puerto de las Muelas, van al puerto de las Bandurrias, que es vn baxo de arena, como vn quarto de media legua de Seuilla, el qual es el peor que ay en todo el rio, porque no llega a fiete codos de agua con la plea mar, ni passa de quatro quando es baxa mar. Otro tanto mas adelante del ay otro baxo, que llaman los Pilares, que aunque tiene canales fondables para poder passar, son tan angostos, que por poco que vna nao se desuie da en ellos, y assi se han perdido alli algunos. Dos leguas masadelante està otro passo que llaman el Valle, de siete codos,o poco mas de agua, plea mar, y no mas detres quando es la menguante: y de alli a otras dos leguas està otro passo que llaman el Naranjal, del mismo fondo. Otras dos leguas mas abaxo està el Sauzejo, que espasso largo, y de mas fondo, de donde se va vna legua masadelante a furgir en las Horcadas, que estan ocho leguas de Seuilla, adonde las naos tienen ya mucha agua, y las medianas pueden cargar del todo: y desde alli hasta el puerto de Sanlucar no ay mas de otro passo que llaman el Aluina, como dos leguas de las Horcadas, de nueue codos de agua. No se pueden passar estos baxos del rio, sin esperar la marea quando es creciente, porque aya mas agua; y assise passa cada baxo en vn dia, sino es quando alguna nao va descargada, o es pequeña, que có buen viento puede passar dos baxos de vna marea: y tardan

tardan las naos en 15. leguas que ay de Seuilla a Sanlucar, fiete, o ocho dias:

Llegados al puerto de Sanlucar, se surge en Ganfanejos, que es vna legua del pueblo, donde se amarran los nauios contra los vientos y mareas, y se acaban de cargar las mercaderias que se han traydo de Seuilla en barcos por el rio, y se haze la segunda visita, por vno de los juezes oficiales de la casa de la Contratación, y visitadores de nauios, para ver si conforme a las ordenanças lleuan la gente de mar, y de seruicio que se les manda; y los bastimentos, armas, artilleria, municiones, xarcias, y otras cosas que han de lleuar en cada nauio: como tambien para que nolleuen mascarga de la que conforme a su porte les es permitida, y que tengan buen

soster, que es estar bien lastradas.

Para entrar y salir la Barra del puerto de Sanlucar, han de concurrir tres cofas juntas: Pilotos diestros, examinados para la Barra, que pocas vezes faltan: y viento como es menester: y marea con aguas viuas, con que fuele crecer el agua del puerto quatro codos, las quales cosas no suelen siempre concurrir, porque quando ay marea que es cada dia, faltan las aguas viuas: y quando las mareas destas vienen, falta el viento: y al contrario, quando ay viento faltan las mareas, y assi la salida desta Barra suele ser dificultosa; demas de que algunas vezes quando viene a ser todo junto, es antes del dia, y por no se poder verlas mareas y señales de la Barra, no se atreuen a salir, sino es con faroles alguna vez. El viento necessario para salir de la Barra, ha de ser desde el Norte hasta el Leste en inuierno, y en verano hasta el Sueste, y que sean vientos para poder romper el agua de la marea, que suelen ser mas ordinarios y continuos en inuierno, que en verano quando vientan poco, como rerrales, y no mas de hasta las diez, o las onze del dia, que comien-

comiençan las Virazones, que son vientos quellaman Mareros, porque vienen de la mar, a cuya causa, aunque siempre la salida deste puerto suele ser dificultosa, en los meses de Iunio, Iulio, y Agosto, se puede salir del dicho puerto, porque llegan juntos la marea con las Virazones por el Sudueste, o Sur. Por lo qual algunas vezes, quando ay viento y faltan aguas viuas, se suelen alijar las naos que demandan mucha agua, dos o tres barcos de ropa, para poder salir.

El puerto de Sanlucar està en 37 grados de altura, algo mas, es grande y capaz para treciétos nauios, porque tiene de ancho vin quarto de media legua, y de largo como dos leguas. El rio arriba es hondable, donde surgen las naos en ocho y diez braças, y el fondo limpio de lama y arena, aunque en tiempo de inuierno es algo desabrigado, por ser la tierra mas baxa que las naos: la boca tiene de ancho vna legua, y en ella vna canal de cien pas sos de ancho: corre de Nordeste Sudueste, y de alli buelue el puerto al Norte Nornoroeste, donde se quiebra la mar, y haze abrigo cerca de las casas de Sanlucar, que estan al Oriente del rio.

De Sanlucar para las Canarias.

E Sanlucar de Barrameda se va en demanda de las islas de las Canarias, por el golfo que dizen de las Yeguas, hasta donde ponen los Marineros como dozientas y cincuenta leguas, q comunméte se suelen nauegar en ocho, o diez dias, yendo las naos en slota, y de ahi a baxo si van solas: y assi la prouision de bastimentos para este golfo, suele ser para quinze dias.

Salidos de Sanlucar, en tiempo de verano, no se teme de peligro ninguno, sino de cossarios, porque aunque se buelua el vieto contrario, se puede entretener en

la mar, bolteando y surgiendo en la costa. En Inuierno fuelen ser peligrosos los vientos Sures, por poco que vienten, y assi se suelen boluer al puerto, o tomar la Bahia de Cadiz, que es vna Bahia entre la isla y la costa, casi Norte Sur, de ancho como dos leguas, y la canal como de media legua, en que tambien ay algunos baxos, y lo demas es fondable de diez o doze braças. Desde aqui, auiendo salido de Sanlucar, y doblado a Salmedina, vna isleta que està media legua de la Barra al Sueste, se manda gouernar al Sudueste en tiempo de Verano, que es derrota derecha con la punta de Naga en la isla de Tenerife, vna de las Canarias: y entiempo de Inuierno se manda gouernar al Sudueste quarta del Sur, hasta el Cabo de Cantin, que està en 42 grados y medio, por llegarfe mas a la costa de Berberia, que es costa mas caliente, y menos tormentosa, y donde se hallan mas presto las Brisas: desde alli se buelue al Sudueste quarta al Oeste, en demanda de la dicha punta de Naga, adonde vientan maslas Brisas, desde el Nordeste hasta el Leste, tanto, que quando se llegan a las islas, algunas vezes es demasiado.

Llegados a las islas de las Canarias, las flotas van a surgir al puerto de la gran Canaria, aunque antiguamente folian surgir en el puerto de la Gomera, por ser el mejor de todas las islas, que aunque todas tienen buenos puertos, y muchos surgideros, son para en tiempo de Verano, que en Inuierno son peligrosos, por estar todos los puertos a los Suestes, que son trauesia derecha en todos los que son de prouecho, y assi no se detienen mas de quanto se prouecho de bastimentos, y el refres-

co que han menester, procurando de salir luego a la mar con qualquier viento que sea.

De las Canarias a la Desseada, y Dominica.

E Las islas de las Canarias se va en demanda de la Desseada, o Dominica, por el golfo grande, que lla man del mar Oceano, que tédra de viaje desde las Canarias, segun la cuenta de los Marineros, mas de setecientas leguas, en cuya nauegacion se suele tardar veynte y cinco dias, o algo mas, y esto con buenos tiépos, nauegando con las nãos cargadas y en flota, q comunmete fuelen caminar veynte y cinco leguas, o treynta cada dia, quando mas. Vientan de ordinario en este golfo las Brisas, aunq en Verano suele hazer algunas calmas tres o quatro dias; y en Inuierno, desde Octubre hasta Diziembre, luelen correr algunos vendauales, aunque con pocafuerça, y por poco tiempo: y por Agosto, y Setiembre se han visto algunos Vracanes cié leguas antes de las islas.Intentose al principio, quando se descubrieron las Indias, la buelta para España por este golfo, y a causa de fer tan ordinarias las Brifas y viento contrario, tardaua dos y tres meles en la buelta: y alsi la experiécia mostrò, gera necessario subir en mayor altura, como se haze, para huyr de las Brifas, y hallar tiempos frescos del Norte.

En partiendo de las Islas de Canaria, se gouierna como treynta leguas al Sur, para desuiarse de las calmas, que echa la isla del Hierro, doze y quinze leguas al Oeste, y desde alli se prosigue el viase por dos derrotas, en demanda de la Desseada, que es la primera isla de las Indias. La vna que se siguio antiguamente, por tenerse por mas derecha, gouernando al Oeste quarta al Sudueste, hasta baxar en 13 grados y medio de altura, en que està la dicha isla Desseada. Y la otra nueva que aora se frequenta por el Oes Sudueste, en saliendo de las calmas de la isla del Hierro, hasta baxar en 20. grados de altura,

altura, porque quanto mas se meten a la Equinocial, se hallan mas prosperas las Brisas: y desde los 20. grados se gouierna al Oeste quarta al Sudueste, hasta ponerse en 15. grados y medio de altura, de la derrota antigua, desde donde caminado al Oeste, sin baxar ni subir por entrabas derrotas, se da en la isla Desse ada: y si se nauegare por 15. grados, se da en Marigalante, a vista de la Dominica, la qual se vee 15. leguas a la mar, por ser alta y montuosa.

La Desseada se vee ocho, odiez leguas antes de llegara ella, y Marigalante cinco, o seys leguas: y aunque no tienen baxos ningunos peligrosos quo se echen de ver, no se surge en ninguna destas islas, ni de las otras que estan cerca dellas, saluo en la Dominica, que tiene buenos surgideros a la parte del Noroeste, y en Matininò, que tiene agua y leña, para proueerse quando es menester: y aun en la Dominica conviene y rapercebidos, por los Indios Caribes que suele auer en ella. Desde estas islas se aparta la derrota de las slotas que van a la Nueva España, Tierra sirme, y Nombre de Dios, cada vna por su parte, como abaxo se dira.

De las Islas para la Nueua España, hasta el Cabo de San Anton en Cuba.

As Flotas que van para la Nueua España, desde la Dominica, y Desseada, van en demada del Cabo de san Anton, q es en la parte vltima y mas Occidental de la isla de Cuba, tocando en la isla de S. Iuan, y Española, a vista de santo Domingo, por el Sur, y costa de la isla de Cuba para el dicho Cabo d S. Antó, hasta dode de las islas Dominica, y Desseada, se nauega como 500. leguas, q se tardan en andar como 20. dias. De ordinario en esta nauegació vienta las Brisas, y quando faltan suele Gg 2 auer

auer algunas calmas, aunque de Mayo adelante vientan continuos vendauales. Desde fin de Agosto adelante, quando reynan mas los Nortes, suele ser peligrosa de los Vracanes, y assise procura hazer la nauegació antes deste tiempo. En partiendo de la Desfeada, o Dominica, dã do resguardo a los Santos, q son vnas isletas que estan juto a Guadalupe, se gouierna al Norveste nouéta leguas, hasta dar vista a Santa Cruz, q està en 17. grad.o mas de altura, por la parte del Sur, sin llegar a ella co dos leguas, de donde se gouierna al Oes Noroeste, como quaréta,o cincuenta leguas, en demanda de Cabo Roxo, q està en 17.grad.y medio de altura, en la parte Occidental de la isla de San Iuan de Puerto Rico, por el Sur, guardadose de llegar a el con quatro leguas, por vn baxo q està cerca del Cabo: de donde, dando vista a laisla de la Mona, en que si ay necessidad se puede surgir, se va diez, o doze leguas mas adelante, hasta la isla de la Saona, que està en la misma altura, cerca de la costa del medio dia. De la isla Española al principio della, a la qual no se llega con dos leguas, por algunos baxos: y de alli costeando la tierra de Santo Domingo, se va a reconocer la punta, o Cabo de Cayzedo, que està en la dicha isla, cinco leguas antes de llegar al puerto de Santo Domingo en la qual no entrã los que van a la Nueua España, por el peligro de la entrada, del qual con las demas calidades se haze mencion en la descripcion particular de la isla que ponemosen nues tro Islario: y auiendo passado el dicho puerto, se va corriendo la costa, hasta la punta de Nizao, que està diez leguas de Santo Domingo al Poniente, adonde si se llega antes de ser noche, de manera que no se pueda tomar el puerto de Ocoa, qestà mas adelante, se echan las naos de mar en traues, q es dexarlas sin velas ningunas, hasta la mañana. Desde alli se va al puerto de Ocoa en la colta de la isla Española, diez y ocho leguas de Santo Domingo,

Domingo, al Occidente, en el qual, y en la ensenada de Cepecepin, que está junto del como vn tiro de artille ria, surgen las floras, y se proueen de agua y leña, buen pefcado, y carne, cañas dulces, y palmitos. Defde el dicho puerto, auiendo salido como cinco, o seys leguas, a la buelta del Sur, por huyr de las calmas que suelé dar por aqui, a causa de boluer la costa al Sur, se nauega al Oeste, como treynta leguas, en demanda de la isla de la Beata, y Alto velo, que estan cerca de la costa: y aunque se puede passar por dentro, y no ay en ello ningun peligro, se passa por defuera vna legua a la mar dellas, desde las qua les se toma la derrota al Oeste Noroeste, guiñando de noche al Oeste, que es tenerse a la mar, por no dar en la costa: por lo qual se va en demanda del Cabo del Tiburon, que es en el Cabo mas Occidental de la isla, hasta donde ponen los Marineros como treynta y cinco, o quarenta leguas desde la Beata. En este Cabo ay agua dulce, que se puede traer en las Chalupas, de dode se gouierna al Noroeste por Barlouento, o parte del Norte de la Nauaza, o por el Gilouento, que es por la parte del Sur, como veynte leguas, hasta reconocer la tierra de Santiago de Cuba, la qualse va costeando hasta el Cabo de Cruz, que está en altura de 19. grados y medio; de donde se buelue a gouernar al Oes Noroeste, como quarenta, o quarenta y cinco leguas, hasta hazerse Norte Sur con la Bahia, o golfo de Xagua, y desde alli siendo de dia, la buelta del Oes Noroeste, como nouenta leguas, hasta dar vista a la isla de Pinos, que està en 20 grados de altura, como diez leguas al Sur, de los baxos que llamanlos Iardines, que estierra muy fuzia, y muy baxa, y donde se han perdido muchos naujos: y siendo de noche, auiendo caminado desde el dicho Cabo de Cruz, por la dicha derrota, como quarenta leguas, se gouierna al Oeste, vna singladura de veynte y cinco leguas, de Gg 3 donde

donde se buelue para la isla de Pinos; aunque alguno por huyr de los dichos lardines, desde el sobredicho Cabo de Cruz, van la buelta del Oeste, a reconocer los Caymanes, que estan del dicho Cabo como quarenta leguas el vno, y el otro cincuenta, entrambos en 18. grados y medio de altura, que son dos isletas, y en la postrera dellas que es el Caymã grande, se puede surgir en catorze braças, por la vanda del Norte: de donde se buelue a reconocer por la buelta del Noroeste la isla de Pinos, a la qual no fe llega con tres leguas, por algunos arrecifesque tiene, y desde ella se van a reconocer como veynte leguas, la buelta del Noroeste, las sierras de Guayanico; y despuesel Cabo de Corrientes, que està en 21.grados y medio, como treynta leguas de la dicha isla, al qual se pueden llegar y surgir en veynte braças, por la vanda del Oeste, y tomar agua de vn Xaguey grãde y vna fuente, que estan cerca. Desde el qual se van costeando doze leguas, hasta el Cabo de San Anton, que està en 22. grados, en la parte vltima y mas Occidental de la dicha isla de Cuba, que es la vltima de las q llaman de Barlouento, por quedan siempre a mano derecha.

Del Cabo de San Anton al puerto de la Veracruz.

Esde el dicho Cabo de S. Anton para el puerto de la Veracruz, se gouierna por dos derrotas; vna para entiempo de Inuierno, desde Setiembre hasta Mayo, y otra para Verano: la de Inuierno, que llaman la nauegacion por defuera, que segun cuenta de Marineros, sera de dozientas y ochenta leguas, suele durar de ocho a nueue dias, en la qual suelen ser muy ordinarios y peligrosos los Nortes, porque meten mucha torméta

y causan muchas auerias, por las echazones que se haze. Gouiernale desde el dicho Cabo de San Anton por el Oes Noroeste, como cincuenta leguas, por huyr de los baxos que sellaman los Alacranes, que estan en 22. grados Leite Oeste, con el Cabo de San Anton, a los quales no se llega desde treynta braças abaxo. Y desde este fondo sobredicho, se buelue a nauegar otras cincuenta leguas al Noroeste, hasta ponerse en altura de 24.grados por apartarse de los baxos que llaman los Negrillos, y isla Bermeja, que estan desde 23. grados hasta 23. y medio: y desde allise buelue a gouernar al Oeste, otras cincuenta, o sesenta leguas; y luego al Sudueste, en demanda de la punta de Villa Rica, que està en 20 grados menos vn quarto en la costa de la Nueua España, desde la qual punta quinze leguas casi al Sur, està el puerto de San luan de Vlua, para el qual se va có la costa en la mano tres leguas a la mar, por no dar en los baxos della: y por esta derrota se entra en el dicho puerto por la canal que llaman del Norte, de cuyas entradas y falidas fe da noticia en la descripcion de nuestras islas y puertos.

La otra nauegacion que dizen por dentro, paratiempo de Verano, desde Mayo hasta Setiembre que llaman
Inuierno en aquellas partes, porque es quando llueue.
Por esta derrota cuentan los Marineros, del Cabo de
San Anton hasta la Veracruz, dozientas y cincuenta y
cinco leguas, y assi se tarda en ella como ocho dias, vn
dia menos que por la de suera: porque en el Verano
quando se nauega, reynan siempre Brisas, y es la mar
blanda y suaue, sin auer ningú maltiempo: y en Inuierno seria peligroso por los muchos Nortes, que son trauesta por la punta en toda la costa de Yucatan, cerca de
la qual se passa: y de la costa de la Nueua España, desde
la sierra de San Martin, hasta el puerto de San Juan de
Vlua. Partiendo del dicho Cabo de San Anton por el

Gg4

Oes Sudueste, como quarenta leguas, hasta tomar sonda, que es fondo de la mar en treynta braças, desde donde se gouierna al Oeste cerca de cien leguas, por veynte braças de fondo, hasta passar por entre la isla del Triãgulo, y isla de Arenas, que està en 22. grados largos. Tambien se puede passar al Sur del Triangulo, por entre el y la isla de la Zarça, puesta en 20. grados: y siendo passadas estas islasse pierde el fondo, y se gouierna al Sudueste otrassesenta, o setenta leguas, hasta ver las sierras de San Martin en la costa de Nueua España, en 18: grados de altura, y dar vista a vna isla que està junto de ellas, que llaman Roca partida, desde la qual se va corrié do la costa al Oes Noroeste, por dar resguardo a vnas isletas que llaman las Cabeças; por la qual derrota, dexando al Sur las islas de Sacrificios, se entra en el puerto de san Iuan de Vlua, por la canal que llaman de las Brisas, adonde se descargan y desaparejan los nauios, quitandoles los mastiles y xarcias, y los amarran con buenos cables, por los Nortes, que suelen ser muy rezios en este puerto, donde estan hasta el mes de Março que se parten para España. Tong antibox

Desde la Dominica a Cartagena y Nombre de Dios.

A Nauegacion para el Nombre de Dios desde la Dominica y Matininò, donde se aparta la derrota para la Nueva España y Tierra sirme, sera como de quatrocientas leguas de viase, que se nauegan como en quinze, o diez y seys dias: y hasta Cartagena mas de trecientas, desde las dichas islas, en la qual aunque en Verano son muy continuos los vendauales; y en Inuierno acuden siempre los Nortes: las Brisas son casi siepre

perpetuas, y pocas vezes suelen faltar, y assi la nauegacion Leste Oeste, es siepre cierta, facil, y segura: y al cotrario casi impossible. Los vendauales son en esta costa suaues casi siempre, y poco peligrosos, al contrario de los Nortes, que son trauesia en toda ella, y malos.

En desembocando por entre la Dominica, y Matininò, se va en demanda del Cabo de la Vela, cincuenta leguas al Oes Sudueste, y despues al Oeste quarta del Sudueste, hasta ponerse en altura de doze grados, y llegar a reconocer la punta de Coquibacoa, o Bahia fonda, que es vna punta en la costa del Cabo la Vela, 25. leguas antes della, Lefte Oefte, hasta donde ponen los Marineros desde la isla Dominica, como dozientas y treynta leguas; desde el qual gouernando al Oeste quarta del Sudueste, se va en demanda del Cabo de la Aguja, costeando la tierra, hasta el rio de Palominos, a vista de las Sierras neuadas, y remate de los Ancones, y la sierra de Bonda, que esta sobre el puerto de santa Marta: y desde alli se corre la buelta del Oes Noroeste, hasta perder el Agua blanca, por descabeçar el rio grande, desde donde fe buelue a gouernar al Sudueste en demáda de Morro hermoso, y de alli al Buhio del Gato, y a la punta de la Canoa, prolongando la costa hasta Cartagena. Para el Nombre de Dios se gouierna, ocho, o nueve leguas la buelta de Nornoroeste, y desde alli la buelta del Oeste como cincuenta leguas, y despues la buelta del Sudueste otras treynta, hasta reconocer por el Sur la cabeça de Catiua, que aun si fuere en tiempo de vendauales, se puede yr derecho desde Cartagena hasta ella: y desde alli por la misma derrota, al puerto del Nombre de Dios, hasta donde delde Cartagena ay como nouenta leguas, que se suelen tardar en nauegar, tres o quatro dias. Llegados al Nombre de Dios, se descargan, y desaparejan los nauios. En este tiempo se va a puerto Velo, que està al

Hydrografia. al Occidente del Nombre de Dios, como cinco, o seys leguas. El vno y el otro son enfermos.

Buelta del Nombre de Dios a la Habana.

Araboluer a España de Tierra firme, es necessario subir en altura, por ser las Brisas contrarias para esta nauegacion por la costa de Tierra firme (como queda dicho) y assi se viene desde el Nombre de Dios a la Habana, hasta donde cuentan de camino los Marineros, como trecientas y cincuenta leguas, que se nauegan en diez y seys dias, y de Hebrero adelante, quando comiençan a faltar los Nortes: y assi en saliendo del puerto fe gouierna al Leste, hasta ponerse Norte Sur con la cabeça de Catiua; y desde alli al Leste Sueste, para dar en la isla de san Bernardo; y despues al Leste en demanda de Barù, haftallegar a Cartagena, a donde se buelue del Nó bre de Dios, por poder mejor tomar desde aqui la isla de Pinos, que desde el Nombre de Dios, a causa de ser los vientos Brisas, y correr con las aguas al Occidente, para la costa de Honduras, y desaguadero de Nicaragua, no pueden salir bien los nauios si se ensenan en ella, por atrauesarse en el camino el baxo grande del Cabo de Camaron, y los baxos de Quitasueño, el Roncador, y la Serranilla, por los quales seria la nauegacion peligrofa, y assi se buelue a Cartagena, desde donde se gouierna al Norte, hasta la puta de la Canoa, que està junto a Cartagena, y desde alli al Nornoroeste, hasta ponerse en altura de 13.grad.en la qual altura hasta 16.grad. y medio, estan los baxos de la Serrana, y Serranilla, Quita sueño debaxo del agua amenos de media braça, por los quales fe paffa có mucho cuydado: y de alli por la melma derro tase llega a reconocer la isla de Pinos, sin llegar a ella (co mo queda dicho en la nauegacion de Nueua España) y desde

desde ella al Cabo de san Anton, desde el qual se corré seys, o siete leguas al Noroeste, por dar resguardo a los baxos del dicho Cabo, de donde se buelue al Les Sudueste, en demanda de Zauana, o de las Tortugas, sino diere lugar el tiempo: y de alli a la Habana, adonde se bueluen a juntar las slotas que vienen del Nombre de Dios, y la Nueva España.

Desde San Iuan de Vlua a la Habana, para boluer a España.

Esde el puerto de la Veracruz para la Habana, hasta donde se nauegan de buelta, como trezientas leguas, en nueue o diez dias, parten las flotas por el mes de Março, porque aun entonces duran los Nortes, que firuen para venir a la Habana, y para falir de la canal del puerto que llaman de la Brisa, y los vientos terrales.En saliendo del puerto se gouierna al Nordeste hasta altura de 25.grados,có vientos Brisas,que en quatro,o cinco dias bastan para llegar a la dicha altura, desde la qual se va por la vanda del Leste, hasta tomar sonda enlas Tortugas,y a la Habana: y assi de Mayo adelante es malo salir del dicho puerto de Vlua, que por falta de los Nortes, si se ensenan en la costa de la Florida, no se puede salir della por los vientos Susueste, que como se va subiendo en altura, se van mudando las Brisas, por lo qual no se ha de passar de 26.grados arriba:y de las Tortugas se gouierna la buelta del Sur hasta la Habana, donde se juntan,o esperan las flotas de Tierra firme, y Nueua España.

De la Habana a los Azores.

DEsde el puerto de la Habana para España, auiendo desembocado la canal de Bahamà, se viene por el gosfo

golfo que dizen del Norte, o del Sagarço, en demanda de las islas que dizen de los Azores, por dos derrotas; vna para de Verano mas metida, en altura de noueciétas, o mil leguas, segun pratica de Marineros, que se nauegan en 28,030 dias con buen tiempo: y otra para de Inuierno, que aunq es algo mas corta, se tarda mas dias

en hazer, por no tener tan fauorable el viento.

Los vientos que sirué para entrambas estas derrotas, son los vendauales, que en este gosfo son mas ordinarios en Verano, y mas suaues, y con menos mar q en Inuierno, quando suese ser mas pesados, a causa de ventar muchas vezes Brisas, y los Ponientes tambien en Inuierno no son mas malos: y assi esta nauegación suese ser peligrosa. En aquel tiempo los Nortes, aunque siruen para esta nauegación, suesen durar poco, porque luego saltan en Brisas, que en Inuierno suesen durar ocho, y quinze dias, y hazer mucho daño en los nauios; y desde la Canal hasta la Bermuda, suese auer algunos Vracanes.

Del puerto de la Habana se sale por la mañana, con Terrales: en siendo suera del puerto como tres, o quatro leguas a la mar, da luego la Brifa, que aunque es viéto contrario para el viaje, las aguas que corren al Nordeste mas rezias quanto es mayor la Brisa, con andar bolteando, y barlouenteando, van metiendo los naujos por la canal, y assi con qualquiera viento se dexan yr por ella: y si fuere viento prospero, en saliendo de la Habana se gouierna al Nordeste hasta ver los Martires, y de allial Leste por la costa, teniendo cuenta de no llegar con vna legua a los Martires, que estan en la punta y tierra de la Florida, y en boluiendo la costa para el Leste se camina por aquel rumbo la costa en la mano, por ser colta sana, y aunque pintan baxos no los tiene, hasta 28. grados de altura, adonde se entiende auer desembocado la canal. Desde aqui se viene en demanda de las islas

de los Azores por dos derrotas, o caminos, vno para en tiempo de Verano, y otro para Inuierno: en Verano para buscar tiempos frescos de la parte del Norte, se gouierna la buelta del Nordeste, hasta subir en 32. grados; y de alli al Leste, que por el Nordeste del aguja viene aser Leste quarta al Nordeste, hasta subir en 38.0 39. grados de altura, y no mas, porque algunas vezes ha sido peligroso subir en mayor altura: y por esta derrota de 39.grados, se va a dar a las islas de los Azores. En Inuierno, en desembocando, se gouierna la buelta del Leste, hasta la isla de Bermuda, que está en 33. grados, en la qual altura se sube por la dicha razon de la variacion de la aguja, dexando la dicha isla de la vanda del Norte, muchas vezes sin llegar a reconocerla, aunq por los téporales de aguaceros co mar, que suele auer de ordinario en aquel parage, se entiende, que vienen a estarcerca della, desde la qual prosiguiendo la dicha derrota, se buelue a 37 grados de altura, que se llega a ver la isla de Santa Maria, que es vna de las de los Azores: y para yr a la Tercera se sube en 38. grados: y aunque esta nauegacion es, de mas derecho y corto camino que la de Verano, se tarda mas dias en nauegarse, porque en la otra que se va por mayor altura, son mas conocidos que en esta los aguages que van caminando, segun queda dicho, desde la Florida para el Nordeste, y assi ayudan masala nauegacion: y en la vna y otra nauegacion se tiene por señal, para entender que se llega a las islas, el ver que la aguja no tiene variacion de Noroestear, ni Nordestear.

Los nauios que vienen de las Indias en Verano, aora vengan en flota, aora folos, fiempre fuelen tocar en las islas de los Azores, y principalmente en la Tercera, que està en 39. grados, por el buen recaudo que ay en ella de agua y leña, y de otros bastimentos; y para tomar lengua H h

fi la costa de España està segura de cossarios, y entender si los juezes oficiales de la Contratacion de Seuilla, han embiado a la persona que alli tienen alguna orden de lo que tiené de hazer, para venir en España. Algunas vezes suelen las stotas tomar la isla de san Miguel, que està en 37. grados y tres quartos, quando no pueden tomar la Tercera por los vientos Sures, y Suestes, que suelen ser contrarios en el. En Inuierno son estas islas ventosas, y tormétosas; y por no ser los puertos buenos, tienen mádado, que desde Setiembre hasta Abril no se vega a surgir en ellas: y aun si se pudiere escusar, en ningú tiempo, ni saltar ninguno en ellas en tierra, porque no se pueda sacar el oro que se trae por registrar, y assi vienen a las naos barcas de todas las islas, con refresco de agua y bastimentos.

De las islas de los Azores para Sanlucar en España.

E Las islas de los Azores hasta Sanlucar de Barrameda, ponen los Marineros como trecientas leguas de nauegacion, que se nauegan desde quinze hasta treynta dias, muchas vezes, por reynar de ordinario en este golso muchas Brisas, que son contrarias

derechamente para venir a España. Ambehaban rugos

Partiendo de las dichas islas, fe gouierna la buelta del Leste, como quarenta, o cincuenta leguas, porque si vetaren los vietos Nordestes, pueda habitar y tomar tierra de España con ellos, lo qual no podria ser si baxando de los 39 grados de altura se viniessen camino derecho: y auiendo corrido las 40.0 50. leguas, se buelue a gouernar la buelta del Leste quarta del Sueste, en demada del Cabo de san Vicente, que està en 37. grados, en la costa de Portugal, Leste Oeste con Salmedina.

En doblando el dicho Cabo, se gouierna hasta Sanlucar Leste Oeste, a vista de la costa, guiñando para el Nor deste, por no desuiarse della hasta ver las arenas gordas, que son vnos medanos altos de arena, que bate la mar en ellos, y estan cinco leguas al Poniente de Sanlucar, donde se han ahogado muchas gentes en tiempo de Inuierno, y tormentas, por no auer donde se guarecer la gente que seecha a la mar: y assi en tiempo de fortuna se tienen al Estrecho, porque de Verano toda esta costa de España es segura, y muy fondable, que casi en toda ella se puede surgir. Llegados al puerto de Sanlucar, se fuben los naujos por el rio arriba, alijando lo que es menester: vnas vezes co viento, quando corre a proposito, aunque pocas vezes suele correr el que es menester, por los tornos del rio, y assi el mas ordinario y seguro, es fubir con la marea, lleuando los naujos con los bateles hasta Seuilla, donde en el puerto de las Muelas los oficiales de la Contratacion los bueluen a visitar, para hazer aueriguacion si han guardado lo que les està mandado por las ordenanças.

Nauegacion desde España para el rio de la Plata, y estrecho de Magallanes.

POR Ser tan poco frequentada esta nauegacion, ay poco que dezir della, mas de que de España al Estrecho ay cerca de dos mil leguas de nauegació; y hasta el rio de la Plata, cerca de mil y seyscientas, que aunque se podria nauegar con buenos tiempos, en dos meses hasta el rio de la Plata, y tres hasta el Estrecho, siepre han tardado mucho mas los que nauegan, porque a causa d'auer de partir para esta nauegació de España por Hh 2 Agosto,

Agosto, o antes, es porque se llegue aquellas partes al principio del Verano dellas, q es desde Setiembreadelante. Vienese a passar por la Equinocial, en tiempo que fe hallan debaxo della muchas calmas, y muy continuas, y assi se ha tardado hasta el rio de la Plata, tres meses y mas: y hasta el estrecho de Magallanes cinco, y dende arriba. Y porque demas de las calmas, por ser la nauegacion tan larga, y auer muchas tormentas y refriegas de vientos Sures y Suestes, y Brisas, que son trauesia entoda aquella costa, desde el Brasil hasta el Estrecho, siemprellegan los naujos necessitados de reparo, que pocas vezes de las que se han intentado passarle, y nauegar por el a las islas de Maluco, se ha podido llegar a passarle antes que el Verano de aquellas partes se acabe, que es muy breue y lleno detormentas, y grandes tempestades de vientos Sures, y aguas, y algunas vezes muy grades frios; y alsi liempre ha sido necessario inuernar antes de pasfar el Estrecho:por lo qual, y por las grandes corrientes que en el ay, y poco eparejo de repararse los naujos, aŭque no faltan buenos puertos dentro y fuera del, y principalmente por ser la distancia del Estrecho a los Malucos tan larga, que passa de dos mil y quinientas leguas. La nauegacion para ellos desde España por el Estrecho, viene a ser muy dificultofa, y peligrofa.

Auiendo partido de Sanlucar de Barrameda, para el rio de la Plata, y para el Estrecho: y auiendo tocado y tomado refresco en las islas de Canaria, siempre se ha gouernado Norte Sur, hasta passar la Equinocial, y ponerse en ocho, o nueue grados de altura a la parte Austral, Leste Oeste con el Cabo de San Agustin, desde donde algunos han nauegado al Oeste, hasta reconocer el dicho Cabo: y otros han ydo subiendo en altura, a reconocer la costa del Brasil, desde donde a vista de tierra há ydo caminando hasta el dicho rio de la Plata, que esta

en 34. o 35. grados de altura; y de alli han passado los que van al Estrecho, siempre a vista de tierra, y en la costa han hallado buenos puertos, y rios, donde se han reparado de algunas fortunas, y tambien donde se han visto en mucho trabajo. Otros ha auido, que desde los ocho grados de altura, han proseguido la derrota para el Estrecho, sin llegar a reconocer la tierra del Brasil, ni tierras del rio de la Plata.

Nauegaciones de la mar del Sur, de la Nue ua España, y Tierra firme, para el Piru, y Estrecho.

A Nauegacion del mar del Sur, que desde Tierra , firme, y Panama, hasta el Estrecho, viene a ser de mas de mil y dozientas leguas; y desde Nueua Eipaña y Guatimala, mil y quatrocientas, y mil y seyscientas, y dende arriba, le nauega con gran diferencia de tiépos de vnas partes a otras, por la que ay en los vientos y aguages, y corrientes de mares de aquellas partes. Forque desde Panama a la ciudad de los Reyes, hasta donde los Marineros ponen de viaje poco mas de quatrocientas leguas, suelese tardar en nauegar dos meses y mas, quando no son los vientos muy prosperos: y otro tanto, y mas las quinientas leguas que deue de auer de nauegacion delde los Reyes, hasta Chile: y a la buelta se sue le hazer cada vnade las dichas nauegaciones, en treynta dias, y menos: y assi para yr desde Panama a Chile, son menester mas de siete, o ocho meses; y para boluer menos de dos, porque a causa de ser los vendauales, y vientos Sures tan continuos gran parte del año en aquella mar, suelen siempre correr las aguas del Estrecho para la Equinocial, y prouincia de Tierrafirme, por la mar Hh 3

del Sur, y prouincias de la Nueua España: y assi la nauegacion del Norte para el Sur de aquellas partes, es siempre dificultosa quando vientan los Sures, y al contrario

muy facil y prefurofa. on the past out a manualin elicit

Para yr de la Nueua España, Panama, y Guatimala, al Piru, y desde alli a Chile, se tiene de partir por los meses de Enero, Abril, y Mayo, y por Agosto, y Setiembre, y parte de Otubre, que son los tiempos quando vientan mas Brisas, y algunos Nortes, que siruen para esta nauegacion: y porque auiendo tardado desde Panama a los Reyes, dos o tres meses de tiempo, quando se llega alli esacabado ya el que es menester para nauegar a Chile, es forçoso esperarle, de cuya causa la nauegacion a la yda, suele ser tan vagarosa, y a la buelta al contrario, por que como se haze con tanta breuedad, y en todos otros meses del año en que pocas vezes faltan vientos prosperos, puedese venir de Chile a Panama de vn viase, y passar a Nueva España en poco mas de dos meses, sin detenerse en el camino.

Hazese toda esta nauegacion costa a costa, sin apartarse de tierra sino poco, saluo los nauios que de Nueua España van al Piru, que desde Guatimala, o Nicaragua, hasta donde llegan costeando, atrauiessan el golso de Panama hasta Puerto vieso, o el de Guayaquil, que tendra de trauessa como quatrocientas, o quinientas leguas: y en lo demas hasta Chile, van tocando en muchos de los puertos, y desembarcaderos que ay por todas estas costas, como en las descripciones particulares dellas se dira, y haziendo escala en los que han menester proueerse de agua y bastimentos, que en todos se puede hazer con seguridad, por ser esta nauegacion la massimpia y segura de quantas oy se saben en lo que ay descubierto.

Nauegacion del Poniente, desde la Nueua España para las islas de Maluco, y Filipinas.

A Nauegacion de la mar del Sur, y golfo del Occidente, para la isla de Maluco, segun las derrotas de los que hasta aora las han podido nauegar, passa de quatro mil leguas de viaje, que aunque estas se podrian andar con buenos tiempos, segun el curso ordinario de los naujos, en cinco meses, o poco mas, por ser la nauegacion tan larga y prolixa, y auer de passar el Estrecho con tantas dificultades, ha se de inuernar en el viaje, y assi no se puede hazer esta nauegación en menos de vn año largo. Començo se primero desde España por el estrecho de Magallanes, y aunque de dos armadas que se hizieron para este viaje, parte dellas passaron, y partellegaron a los Malucos, llegaron tan mal tratadas, que se ha dexado esta nauegacion, y se va haziendo de la Nueua España del puerto de Acapulco en la costa del mar del Sur, de donde hasta las Filipinas, segun la mas comun opinion de los Pilotos que lo han nauegado, ponen mil y setecientas leguas, las quales se nauegan comunmente en dos meles, o dos y medio, començando por Nouiembre, que es tiempo que se tiene por mas conueniente para esta nauegacion, porque en estetiempo no ay tantas calmas como en otros, y las Brifas fon mas ciertas de alli adelante: y aunque corran Vendauales y Nortes no son malos para esta nauegación, que es apazible, y segura de tormentas peligrosas: y aunque se han hallado en ella algunas calmas y aguazeros, pero no de peligro ninguno hasta aora.

La buelta de aquellas islas para la Nueua España, es

de mas larga nauegacion que la yda, porque segun estimacion de Marineros, tiene de viaje dos mil leguas, a causa de subirse en mayor altura para buscar vientos frescos de la parte del Norte, y huyr de las Brisas, que son vientos contrarios para boluer por la derrota de la yda. Tienese por tiempo conueniente para partir de las islas, Mayo, y principio de lunio, porque en este tiépo son menos las Brisas, y mas ciertos los Nortes que son menester, que aunque siruen para la buelta, porque no son tan fauorables para ella, como las Brisas para la yda, se tarda en boluer de las dichas islas hasta la Nueua España, de quatro meses arriba, de las quales auiendo salido, ay muchos aguages y corrientes, y es necessario falir poco a poco, y subirse en altura por el Nordeste, o por otros rumbos, segun la ocurrencia de los vientos; halta ponerse en 40. grados de altura, de donde caminan al Leste, decayendo de alli hasta dar en la costa de

Nueua España: y viniendola costeando, se viene en veynte grados de altura, y de alli Leste
Oeste vienen al puerto de

Acapulco.

LAVS DEO.

EN MADRID, En casa de Iuan de la Cuesta.

Año M. DCVI.

of the state of th

B606 G2160 1-512E cop.3

